QL
690
A1R45
Birds

Synonymik

der

Europäischen Brutvögel und Gäste.

Systematisches Verzeichniss

nebst

Angaben über die geographische Verbreitung der Arten

unter besonderer

Berücksichtigung der Brutverhältnisse

von

Dr. Eugène Rey.

Halle,
G. Schwetschke'scher Verlag.
1872.

Cusp

Vorwort.

Sehen wir schon durch die bedeutende Productivität der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete der systematischen Ornithologie unseres Erdtheiles die Anzahl der Gattungen auf eine sonst nicht geahnte Höhe gesteigert, so kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn durch die verschiedenen Gesichtspunkte, welche die Systematiker bei der Namengebung leiteten, und durch die, namentlich seit Chr. L. Brehm in Aufnahme gekommene Spaltung bisher anerkannter Arten, die Gesammtsumme aller binären Namen, die für die Europaeischen Vögel in Anwendung kamen, zu einer so gewaltigen Menge anwuchs, dass die richtige Deutung aller vorhandenen Namen heut zu Tage selbst für den Ornithologen von Fach nur mit Benutzung umfangreicher literarischer Hilfsmittel und mühevoller, zeitraubender Arbeit möglich ist.

Der Sammler aber, der nicht zugleich Fachgelehrter ist, der Anfänger und Liebhaber der Ornithologie wird in vielen Fällen geradezu rathlos vor dem nach vielen Tausenden zählenden Namenchaos stehen, und um so leichter zu Irrthümern und Fehlern geleitet werden, als nicht allzuselten ein und derselbe Name von verschiedenen Autoren für verschiedene Vögel in Anwendung gebracht wurde. Dazu kommt noch der Umstand, dass man häufig zu einem binären Namen Autoren citirt findet, die entweder nur für einen Theil des Namen, oder selbst gar nicht gerechtfertigt werden können. So findet man zum Beispiele die Namen: Acanthis cannabina, Cannabina linota, Ligurinus cannabinus, Linaria cannabina und Linota cannabina mit „Linné“ als Autor aufgeführt, während Linné diesen Vogel Fringilla cannabina genan htat. Ja selbst zu Namen, bei denen Gattungs- und Artenname umgewandelt wurde, setzt man hier und da noch den ursprünglichen Autor: zu Ruticilla arborea findet man Gmelin oder Linné citirt, und doch

stammt weder der eine noch der andere Theil dieses Namens von diesen Autoren, die den Vogel Motacilla phoenicura genannt haben.

Um diese angedeuteten Schwierigkeiten, die sich besonders dem Sammler und Anfänger, bei der Deutung synonymer Namen entgegenstellen, zu beseitigen, entschloss sich der Verfasser, diese kleine Arbeit, welche ursprünglich nur zu seinem eigenen Gebrauch angefertigt wurde, der Oeffentlichkeit zu übergeben. Sollte es ihm gelungen sein, wenigstens seinen Collegen, den Sammlern Ornithologischer Objecte eine willkommene Gabe damit geschaffen zu haben, so würde er sich völlig entschädigt sehen, für eine so mühevolle und in vieler Beziehung undankbare Arbeit. Das ornithologische Publicum möge dieselbe mit Nachsicht aufnehmen und des Dankes im Voraus versichert sein für Nachweisung von Irrthümern und Berichtigungen.

Hinsichtlich der Anlage des Büchleins mögen hier noch einige Bemerkungen folgen.

Das beigefügte systematische Verzeichniss enthält unter den als Ueberschrift gewählten ältesten Speciesnamen, (bis 1766), zur leichteren und sicheren Feststellung der Identität, Citate der Abbildungen von Vogel und Ei, — wenn nöthig kurz kritisirt, — und giebt ferner die Nachweise der Beschreibungen in einigen der gebräuchlichsten ornithologischen Werke, die dem Verfasser zugänglich waren. Ausserdem sind bei jeder Art Angaben über die geographische Verbreitung beigefügt, die sich mit Ausnahme der in eckigen [ ] Klammern aufgeführten, ausschliesslich auf die Brutheimath beziehen, und zwar hat Verfasser dabei zunächst diejenigen Heimathsländer berücksichtigt, welche in seiner eigenen Sammlung durch direct bezogene oder selbst gefundene Eier vertreten sind. Wo Angaben Anderer aufgenommen sind, ist stets der Name des Gewährsmannes der geographischen Bezeichnung beigefügt worden. Blose Behauptungen oder Vermuthungen wurden nur ausnahmsweise, in Ermangelung bestimmter Thatsachen berücksichtigt, und stets ausdrücklich als solche bezeichnet.

Alle diese Angaben über die Brutheimath beanspruchen selbstverständlich nicht im Geringsten eine Vollständigkeit, da der Verfasser es für erspriesslicher hielt, unvollständige aber sichere Angaben zu machen, als falsche oder zweifelhafte mit hinein zu ziehen.

Die in [ ] gestellten Ortsbezeichnungen beziehen sich also nur auf das Vorkommen des Vogels als Zugvogel oder Irrling und

sind als nur von untergeordneter Bedeutung für die geographische Characterisirung der Arten, weniger ausführlich behandelt worden als die Angaben über die wirkliche Heimath, die für den Vogel jedenfalls nur da zu suchen ist, wo er ausgebrütet wurde und sich wieder fortpflanzt. —

Was das hier angewendete System anlangt, so glaubt der Verfasser es um so leichter für verzeihlich halten zu dürfen, wenn er hier den Versuch machte, die Abgrenzung und Aneinanderrechnung der Gattungen hauptsächlich nach biologischen und oologischen Gesichtspunkten zu bewerkstelligen, als es für den speciellen Zweck, dem das gegebene Verzeichniss hier dient, wohl ziemlich gleichgültig erschien, ob und welches der vielen bestehenden Systeme dafür gewählt würde. Verfasser glaubt damit weder etwas wesentlich Neues geschaffen, noch die Frage der Systematik ihrer Lösung näher gebracht zu haben, da er der Ansicht ist, dass sich ein natürliches ornithologisches System weder allein nach diesen, noch nach anderen einseitigen Gesichtspunkten aufbauen lassen wird, sondern dass nur die Vereinigung möglichst vieler und verschiedener Gesichtspunkte die ornithologische Systematik schliesslich endgültig feststellen könne.

Für die eigentliche „Synonymik" musste die alphabetische Anordnung gewählt werden. Eine Aufführung der Synonyme bei jeder Art im systematischen Verzeichnisse musste leider des vorgezeichneten Raumes wegen unterbleiben.

Viele, mindestens zweifelhafte Besucher Europas wurden, weil sie sich einmal, — wenn auch irrig — in Verzeichnissen Europäischer Vögel aufgeführt finden, mit eingereiht, und es ist deshalb vielleicht zur leichteren Orientirung von Nutzen, wenn auf den nächsten Seiten eine Zusammenstellung aller hier aufgenommenen, in Europa nicht heimathsberechtigten Vögel folgt, und auch die angeführten Varietäten und Aberrationen etc. eine Stelle finden.

Halle a/S., den 17. Februar 1872.

Der Verfasser.

Inhalt.

	Pag.
Vorwort	III
Allgemeine Uebersicht der nicht Europäischen Arten	VII
Berichtigungen und Zusätze	XI
Systematisches Verzeichniss	1—160
Synonymik	161—247
Verzeichniss der vorkommenden literarischen Abkürzungen	248—254
Autoren-Verzeichniss	255—257

Allgemeine Uebersicht

der nicht

Europäischen Arten, der Varietaeten, Aberrationen etc.

1) Die im systematischen Verzeichnisse aufgeführten, nicht Europa angehörenden Vögel, vertheilen sich in Bezug auf ihre Heimathsberechtigung, folgendermassen über die anderen Erdtheile:

I. Nord-Amerika.

1. Haliaëtos leucocephalus. Cuv.
2. Strix nebulosa. L.
3. Ephialtes asio. Gr.
4. Hirundo purpurea. L.
5. Picus villosus. L.
6. Coccystes americanus. K. u. Bl.
7. — erythrophthalmus. Glog.
8. Alcedo alcyon. L.
9. Parus bicolor. L.
10. Sylvicola virens. Sw.
11. Agelaïus phoeniceus. Vieill.
12. Toxostoma rufum. Cab.
13. Mimus polyglottus. Boie.
14. Galeoscoptes carolinensis. Cab
15. Turdus solitarius. Wils.
16. — minor. Gm.
17. — mustelinus. Wils.
18. — migratorius. L.
19. Anthus ludovicianus. Licht.
20. Nyphaea hyemalis. Audub.
21. Columba migratoria. L.
22. Aegialites semipalmatus. Bp.
23. Tringa pectoralis. Say.
24. — melanotus. Vieill.
25. — semipalmata. Wils.
26. Actitis Bartrami. Naum.
27. — rufescens. Bp.
28. — macularia. Boie.
29. Totanus flavipes. Vieill.
30. Catoptrophorus semipalmatus. Bp.
31. Macrorhamphus griseus. Leach.
32. Numenius borealis. Wils.
33. Botaurus lentiginosus. Steph.
34. Anser hyperboreus. Pall.
35. Anas discors. L.
36. — americana. L.
37. — sponsa. L.
38. Fuligula collaris. Bp.
39. Clangula albeola. Jennyns.
40. Oidemia perspicillata. Flemm.
41. Mergus cucullatus. L.
42. Sterna Dougalli. Mont.
43. Larus Rossi. Richards.
44. — Sabinei. Leach.
45. — atricilla. L.
46. Larus Bonapartei. Richards.
47. Procellaria diabolica. l'Herm.
48. Thalassidroma Bulweri. Gould.
49. Nectris major. Glog.
50. — fuliginosa. K. u. Bl.

II. Süd-Amerika.

1. Nauclerus furcatus. Vig.
2. Parra jacana. L.
3. Anas moschata. L. (In Europa verwildert.)
4. Anous fuliginosus. (Gm.) } (Mittel-Amerika.)
5. — stolidus. Leach. }

III. Afrika.

1. Gyps Rueppelli. Br.
2. Otogyps auricularis. Gr.
3. Neophron pileatus. Savig.
4. Falco peregrinoïdes. Temm.
5. — concolor. Temm.
6. Astur gabar. Kaup.
7. Aquila naevioïdes. Cuv.
8. Haliaëtos vocifer. Vieill.
9. Elanus coeruleus. Bp.
10. Milvus aegyptius. Gr.
11. Bubo ascalaphus. Savig.
12. Caprimulgus climacurus. Vieill.
13. Picus numidicus. Malh.
14. Alcedo rudis. L.
15. Merops persica. Pall. (Asien).
16. Parus ultramarinus. Bp.
17. Lanius cucullatus. Temm.
18. Ixos obscurus. Bp.
19. Turdus olivaceus. L.
20. Saxicola lugens. Licht.
21. — isabellina. Temm.
22. Ruticilla Moussieri. Tristr.
23. Alauda desertorum. Stanl.
24. Alauda Duponti. Vieill.
25. Alauda isabellina. Temm.
26. Emberiza striolata. Temm.
27. Fringilla spodiogena. Bp.
28. Pyrrhula githaginea. Temm.
29. Columba senegalensis. L.
30. Numida meleagris. L. (In Europa verwildert.)
31. Perdix petrosa. Lath.
32. Balearica pavonia. Briss.
33. Otis houbara. Gm.
34. Cursorius europaeus. Lath
35. Hyas aegyptiaca. Cab.
36. Hoplopterus spinosus. Bp.
37. Vanellus leucurus. Glog. (Asien).
38. Ibis religiosa. Cuv.
39. Ardea atricollis. Wagl.
40 Ardeola Sturmi. Degl.
41. Tantalus ibis. L.
42. Phoenicopterus erythraeus. Verr.
43. Anser aegyptiacus. Briss.
44. Anas angustirostris. Ménétr.
45. Sterna affinis. Rüpp.
46. — Bergei. Licht.
47. Larus leucophthalmus. Licht.
48. Larus gelastes. Licht.
49. Sula melanura. Temm.

IV. Asien.

1. Haliaëtos leucoryphus. Brandt.
2. Picus syriacus. Hempr. u. Ehr.
3. Alcedo smyrnensis. L.
4. Sitta Krueperi. v. Pelzeln.
5. Lanius phoenicurus. Pall.
6. Corvus dauricus. Pall.
7. Podoces Panderi. Fisch.
8. Ixos aurigaster. Gr.
9. Turdus sibiricus. Pall.
10. — varius. Pall.
11. — lunulatus. Lath.
12. Turdus atrigularis. Temm.
13. — ruficollis. Pall.
14. — Naumanni. Temm.
15. — fuscatus. Pall.
16. — pallidus. Gm.
17. Bessornis gutturalis. Gr.
18. Ruticilla erythrogaster. Br.
19. — erythronotus. Gr.
20. Accentor montanellus. Temm.
21. Melodes calliope. K. u. Bl.
22. Sylvia Rueppelli. Temm.

23. Phyllopseuste icterina. (Vieill.)
24. — javanica. (Horsf.)
25. Phyllobasileus proregulus. Cab.
26. Iduna salicaria Cab.
27. Salicaria certhiola. K. u. Bl.
28. Budytes citreolus. Bp.
29. Anthus Richardi. Vieill.
30. Alauda tatarica. Pall.
31. Emberiza chrysophrys. Pall.
32. — pityornis. Pall.
33. — fucata. Pall.
34. — cinerea. Strickl.
35. Oreospiza arctoa. Glog.
36. Fringilla orientalis. Eversm.
37. — pistacina. Eversm.
38. — pusilla. Gr.
39. Pyrrhula sibirica. K. u. Bl.
40. — rhodoptera. Temm.
41. — rosea. Temm.
42. — rhodochlamys. Brandt.
43. Coccothraustes caucasicus. Pall.
44. Columba rupicola. Pall.
45. Columba risoria. L. (In Europa verwildert.)
46. Syrrhaptes paradoxus. Ill. (1863 zufällig in Europa.)
47. Tetraogallus caucasicus. Gr.
48. Phasianus colchicus. L. (In Europa verwildert.)
49. Perdix chukar. Gr.
50. Grus Antigone. Pall.
51. — leucogeranus. Pall.
52. Otis Macqueeni. Gr.
53. Squatarola helvetica. K. u. Bl.
54. Charadrius asiaticus. Pall.
55. — mongolicus. Pall.
56. Eurinorhynchus griseus. Nils.
57. Tringa subarquata. Temm.
58 — minuta. Leisl.
59. Anser ruficollis. Pall.
60. Anas falcata Pall.
61. — formosa. Georgi.
62. Mormon corniculata. Naum.

V. Tropen beider Welten.

1. Diomedea exulans. L.
2. — chlororhynchus. L.
3. Ossifraga gigantea. Rchb.
4. Procellaria capensis. L.
5. Procellaria leucocephalus. Forst.
6. Phaëton aethereus. L.
7. Tachypetes aquilus. Vieill.

VI. Vaterland unbekannt.

1. Tringa canutus. L. (Wahrscheinlich in Nord-Asien.)
2. Numenius tenuirostris. Vieill. (Ob in Süd-Europa?)
3. Ardea Verranyi. Roux. (Afrika. — Ob in Süd-Europa?)
4. Larus Audouini. Payr. (Amerika?)
5. Thalassidroma leucorrhoa. Degl. (Nord-Amerika. — Ob in Europa?)

2) Berücksichtigen wir die als Varietaeten etc. aufgeführten, so wird die Zahl der wirklichen Arten, die unseren Erdtheil bewohnen, noch um folgende zu vermindern sein:

VII. Ausgestorbene Arten.

1. Alca impennis. L.

VIII. Aberrationen.

1. Tetrao medius. Meyer.
2. — lagopoïdes. Nils.
3. Fuligula Homeyeri. Bäd.
4. Mergus anatarius. Eimb.

IX. Varietaeten.

1. Strix meridionalis. Risso.
2. Hirundo cahirica. Licht. (N.-Afr.)
3. Sitta uralensis. Licht.
4. Parus borealis. Selys.
5. Garrulus melanocephalus. Glog.
6. Curvus spermologus. Vieill.
7. Cinclus Pallasi. Temm.
8. Motacilla Yarreli. Gould.
9. Budytes Rayi. Bp.
10. — campestris. Br.
11. — cinereocapillus. Br.
12. — melanocephalus. Br.
13. Emberiza palustris. Savi.
14. Fringilla canescens. Selys. (Nord) Amerika.)
15. Passer Italiae. Degl.
16. Lagopus islandorum. (Faber.)
17. Perdix graeca. Briss.
18. Charadrius virginianus Borkh. (Nord-America.)
19. — fulvus. Gm. (Asien, Afrika.)
20. Ardea melanorhynchus. Wagl. (Afrika.)
21. — orientalis. Gr. (Afrika.)
22. Anser arvensis. Br.
23. — intermedius. Naum.
24. Fuligula mariloïdes. Glog.
25. Larus capistratus. Temm.
26. Halieus Desmaresti. Glog.
27. Colymbus arcticus. Naum.
28. Cepphus Mandti. Bp.
29. Mormon glacialis. Leach.

X. Zweifelhafte Arten.

1. Alauda pennicillata. Gould. (Asien.)
2. Telmatias Sabinei. Leach. (Amerika?)
3. Larus leucophaeus. Licht. (Europa.)
4. Pelecanus minor. Rüpp. (Afrika.)
5. Uria hringvia. Brünn. (Europa.)

Es stellt sich danach die Zahl der Europäischen Brutvögel, wenn wir die die in Vorstehendem gegebene Aufstellungen berücksichtigen, und die hier erwähnten Arten etc. von den im systematischen Verzeichniss, unter 618 Nummern aufgeführten Vögeln, in Abrechnung bringen, auf nur 401 Arten:

			618
I.	Nord-Amerika	50	
II.	Süd-Amerika	5	
III.	Afrika	49	
IV.	Asien	62	
V.	Tropen beider Welten .	7	
VI.	Vaterland unbekannt . .	5	
VII.	Ausgestorbene Arten . .	1	
VIII.	Aberrationen	4	
IX.	Varietäten	29	
X.	Zweifelhafte Arten . .	5	
	In Summa 217		217
			401

Berichtigungen und Zusätze.

Auch hier beziehen sich die nicht in [ ] eingeklammerten geographischen Namen nur auf die Brutheimath.

19. Falco aesalon. Gm.
Lappland. Island. Faröer, selten: Theobald.

20. Falco vespertinus. L.
[Im Sommer einige Male in Dänemark beobachtet: Theobald.]

32. Haliaëtos albicilla. Boie.
Jütland. Seeland. Griechenland.

33. Haliaëtos leucocephalus. Cuv.
Abbild. Vogel: N. V. D. t. 344. u. t. 345.

36. Circaëtos gallicus. Vieill.
Früher auch in Dänemark: Theobald.

37. Pandion haliaëtos. Cuv.
Daenemark (Laaland): Theobald.

51. Circus Swainsoni. Smith.
Abbild. Vogel, Lies: N. V. D. t. 385. statt 384.

55. Strix noctua. Retz.
Griechenland: Krüper.

60. Strix lapponica. Retz.
Abbild. Vogel: N. V. D. t. 349.

91. Lies **Iynx** statt **Jijnx.**

96. Coracias garrula. L.
Daenemark: Theobald.

107. Var. Sitta uralensis. Licht.
Daenemark. (Seeland ziemlich häufig.)

127. Erythrosterna parva. Bp.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. 352. f. 2—3.

132. Lanius excubitor. L.
Lies: Gemässigtes Europa. Skandinavien bis zum 71° N. Br.

144. Garrulus infaustus. Vieill.
Abbild. 1) Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 350.

152. Corvus cornix. L.
Daenemark.

156. Oriolus galbula. L.
[Verfliegt sich nördlich bis Jütland: Theobald.]

158. Sturnus vulgaris. L.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 351. f. 2. Zu bunt.

159. Sturnus unicolor. La Marm.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 351. f. 1.

161. A. Ixos obscurus. Lies: **Temm.** statt **Bp.**
Abbild. Vogel: Dub. pl. col. 59. — Rev. Zool. 1840. t. 3. —

168. Turdus sibiricus. Pall.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 363. f. 5.

172. Turdus pilaris. L.
Nicht in Daenemark: Theobald.

176. Turdus fuscatus. Pall.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 359.

177. Turdus illacus. L.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 356 (Spielarten.)

180. Turdus minor. Gm.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 355. f. 4.

181. Turdus mustelinus. Wils.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 355. f. 3.

182. Turdus migratorius. L.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 362.

186. Monticola saxatilis. Lies: **Cab.** statt **Boie.**

202. Ruticilla tithys. Br.
Nicht in Dänemark: Theobald.

204. Accentor modularis. Cuv.
Daenemark: Theobald.

207. Luscicola suecica. K. u. Bl.
Abbild. Vogel, lies N. V. D. t. 366. f. 1—4, t. 364. f. 1—2, t. 365. f. 1—2 = L. leucocyanea. — t. 364. f. 3—4, t. 365. f. 3—4. = L. Wolfi. — Die angeführten t. 355. und t. 356 sind zu streichen.

208. Lusciola luscinia. K. u. Bl.
Fehlt in Daenemark: Theobald.

213. Sylvia atricapilla. Lath.
Nördlich bis Daenemark: Theobald.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 368. = S. ruficapilla. Naum.

223. Phyllopseuste rufa. Meyer.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 369. f. 2—3.

224. Phyllopseuste trochilus. Meyer.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 369. f. 1. = Ph. sylvestris. Meisn.

227. Phyllopseuste Bonellii. Bp.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 369. f. 4.

236. Cettia sericea. Bp.
Süd-Spanien.

242. Calamodyta melanopogon. Bp.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 370. f. 3.

246. Calamoherpe aruudinacea. Boie.
Abbild. Vogel, füge hinzu: N. V. D. t. 370. f. 1. = C. horticola. Naum.
— (?) f. 2. = C. fruticola. Naum.

247. Calamoherpe palustris. Boie.
Daenemark, selten: Theobald.

262. Anthus rupestris. Nils.
Faröer: Theobald.

284. Emberiza cirlus. L.
Süd-Russland (Kiew): Göbel.

299. Plectrophanes nivalis. Meyer.
Island. Faröer, sehr selten: Theobald.

317. Fringilla serinus. L.
Böhmen (seit 1851): Fritsch.

322. Pyrrhula rhodoptera. Temm.
Lies: Asien. Nord-Afrika.

327. Coccothraustes vulgaris. Pall.
Daenemark, ziemlich selten. Griechenland: Krüper.

339. Columba livia. Briss.
Faröer: Theobald.

350. Lagopus albus. Vieill.
Lagopus Reinhardti: Groenland, häufig.

352 (statt 252). Tetrao urogallus. L.
Böhmen: Fritsch.

353. Tetrao tetrix. L.
Jütland, immer seltener werdend: Theobald.

356. Tetrao bonasia. L.
Böhmen: Fritsch.

367. Coturnix communis. Bonn.
Daenemark, selten: Theobald.

370. Grus virgo. Pall.
Kiew: Goebel.

375. Otis tetrax. L.
[Einmal in Daenemark erlegt: Theobald.]

380. Glareola pratincola. L.
[Ganz Süd-Europa. Verfliegt sich bis Deutschland.]

382. Oedicnemus crepitans. Temm.
Griechenland: Krüper. Böhmen: Fritsch.

388. Charadrius pluvialis. L.
Faröer, Jütland, Bornholm: Theobald.

394. Aegialites cantianus. Boie.
Daenemark. Griechenland: Krüper.

397. Aegialites minor. Boie.
Böhmen: Fritsch.

398. Strepsilas interpres. Ill.
Groenland: Theobald.

400. Phalaropus cinereus. Briss.
Faröer: einzeln: Theobald.

403. Recurvirostra arocetta. L.
Jütland, zahlreich: Theobald.

404. Calidris arenaria. Temm.
[Auf Grönland wiederholt im Sommerkleide erlegt: Theobald.]

409. Tringa maritima. Temm
Faröer.

412. Tr. pectoralis. Lies: **Say.** statt **Bp.**

417. Machetes pugnax. Cuv.
Böhmen, einzeln: Fritsch.

418. Actitis rufescens lies **Schl.** statt **Bp.**

427. Totanus glareola. Temm.
Jütland, ziemlich zahlreich: Theobald.

431. Telmatias gallinago. Boie.
Island. Dänemark. Faröer. Böhmen: Fritsch.

433. Telmatias gallinula. Lies **Boie** statt **L.**

435. Scolapax rusticola. L.
Daenemark, selten: Theobald. Böhmen: Fritsch.

446. Ardea atricollis. Wagl. Das **Var. (?)** ist zu streichen.

449. Ardea melanorhynchus statt **melanorhyncha** zu lesen.

455. Botaurus stellaris. Scop.
Daenemark, selten: Theobald. Böhmen: Fritsch.

458. Ardeola minuta. Br.
Böhmen: Fritsch.

464. Crex pratensis. Bechst.
Böhmen: Fritsch.

465. Octygometra pusilla. Bp.
Böhmen: Fritsch.

468. Gallinula chloropus. Lath.
Daenemark, selten: Theobald.

474. Lies: **Phoenicopterus erythraeus** statt **erythacus. Verr.**

482. Anser albifrons. Bechst.
Groenland: Theobald.

484. Anser erythropus lies: **New. (L.)** statt **L.**

485. Anser bernicla. Ill.
Nord-Groenland, sehr zahlreich: Theobald.

498. Anas strepera. L.
Mecklenburg.

508 lies: **Abrr. Fuligula Homeyeri. Bäd.**

517. Harelda glacialis. Leach.
Zuweilen auf den Faröer: Theobald.

520. Somateria molissima. Leach.
Daenemark: Theobald.

523. Oidemia fusca. Flem.
Åland.

526. Lies: **Abrr. Mergus anatrius. Eimb.**

527. Mergus merganser. L.
Daenemark, selten: Theobald. Åland.

528. Mergus serrator. L.
Groenland. Daenemark, häufig: Theobald

530. Sterna caspia. Pall.
Fünen, einzeln: Theobald.

539. Sterna hybrida. Pall.
Krim.

542 Anous fuliginosus. (Gm.)
Lies: Süd- und Mittel-Amerika. Insel St. Thomas. Südsee-Inseln; — [Nord-Amerika.] statt Nord-Amerika.

543. Anous stolidus. Leach.
Lies: Süd- und Mittel-Amerika. Golf von Mexico: Audubon. Insel Barthelemy. Südsee-Inseln. Australien: Gilbert. — [Nord-Amerika.] statt Nord-Amerika.

544. Larus Rossi. Richards.
[Wurde in einzelnen Exemplaren in Grönland, sowie im Jahre 1867 auch auf den Faröer erlegt: Theobald.]

548. Larus ridibundus. L.
Lies: Nördlich bis Süd-Schweden, statt Süd Schweden.

568. Lestris Buffoni. Boie.
Groenland, sehr einzeln, Island: Theobald.

572. Procellaria glacialis. L.
Faröer, häufig: Theobald.

590. Halieus carbo. Ill.
Groenland: Theobald.

598. Colymbus rubricollis. Gm.
Daenemark, häufig: Theobald.

602. Colymbus minor. Gm.
Faröer, selten: Theobald.

603. Eudites septentrionalis. Ill.
Faröer, seltener werdend: Theobald.

609. Uria troile. Lath.
Bornholm: Theobald.

610. Uria bringvia. Brünn.
Faröer: Theobald.

612. Alca torda. L.
Faröer: Theobald.

Auf Seite 163 ist einzufügen:

Abrornis. Hodgs.		Acanthiza. Sundev.	
— chloronotus. Hodgs.	229	— trochiloïdes. Sundev.	229

Systematisches Verzeichniss.

I. ACCIPITRES.

1. Gyps fulvus. Gr.

Portugal. Spanien. Süd-Italien. Dalmatien. Ungarn. Siebenbürgen. Walachei. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Nord-Afrika. —

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 2. t. 338. — Gould t. 1. — Buff. pl. enl. 426.
2) Eier: Thien. t. 55. f. 2. a. b. — Bäd. t. 17. f. 1.

Briss. Orn. I. p. 462. n. 7. — p. 464. n. 8. — Pall. Zoogr. I. p. 377. — M. u. W. I. p. 7. — Schinz p. 106. Br. Lehrb. p. 8. — N. V. D. I. p. 162. — K. u. Bl. n. 2. n. 3. — Bp. Cosp. I. Gen. 49. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 12. — II. p. 37. — Schl. Mus. Vult. p. 6. — Rüpp. S. Ueb. n. 4. — Br. Thierl. III. p. 563. — Heugl. N. O. Afr. n. 3. — Degl. u. G. n. 3. —

Cab. J. 1854. p. 386. — 1862. p. 364. — 1865. p. 55. — 1866. p. 114.

2. Gyps Rueppelli. Br.

Mittel-Afrika.

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 32 als V. Kolbii. —
2) Eier: Bäd. t. 74. f. 1.

Bp. Consp. I. Gen. 49. n. 3. — Br. Thierl. III. p. 564. — Heugl. N. O. Afr. n. 2. — Schl. Mus. Vult. p. 7. n. 2.

N. 1852. H. I. p. 41. — H. III. p. 57. — Cab. Journ. 1854. p. 72. — p. 351. — p. 386. — 1861. p. 197. — p. 424. — 1862. p. 39. — 1866. p. 114.

3. Otogyps auricularis. Gray,

Süd- und West-Afrika. [Griechenland.] (?)

Abbild. 1) Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. t. 9. — Temm. pl. col. 407. (juv.) — 426. (ad). — Gray Gen. B. t. 2. —
2) Eier: Bäd. t. 73. f. 1.

Daud. Orn. II. p. 10. Bp. Consp. I. Gen. 50. n. 1. — n. 2. — Schl. Mus. Vult. p. 9. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 8. — Schl. Rev. I. p. 12. — II. p. 37. — Degl. u. G. n. 2. — Br. Thierl. III. p. 570. — Heugl. N. O. Afr. n. 4.

N. 1852. H. III. p. 45. — Cab. Journ. 1854. p. 71. — p. 387. — 1856. p. 471. — 1862. p. 370. — 1866. p. 118. —

4. Vultur monachus. L.

Portugal. Spanien, besonders in der Sierra da Guadarama. Donaumündungen. Griechenland, selten. — [Nord-Afrika. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 1. — Gould t. 2. — Buff. pl. enl. 425. — Schl. u. Susem. t. 3. — t. 2. = G. occidentalis. —

2) Eier: Thien. t. 54. f. 3. a—e. — Bäd. t. 25. f. 1. — t. 74. f. 2.

Gm. L. I. p. 246. n. 4. — p. 247. n. 6. (part.) — Tem. Man. I. p. 4. — M. u. W. I. p. 4. — Schinz p. 105. — Br. Lehrb. p. 6. — Bp. Consp. I. Gen. 50. n. 4. — Rüpp. S. Ueb. n. 7. — K. u. Bl. n. 4. — N. V. D. I. p. 155. — Schl. Rev. I. p. 12. — Schl. Mus. Vult. p. 9. n. 2. — Degl. u. G. n. 1. — Br. Thierl. III. p. 567. — Heugl. N. O. Afr. n. 5. —

Cab. Journ. 1854. p. 387. — 1861. p. 197. — 1865. p. 53. — 1866. p. 118. —

5. Neophron percnopterus. Savig.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Süd-Italien. Griechenland. Türkei. Klein-Asien. Egypten. Nubien.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 427. — Gould. t. 3. — N. V. D. t. 3. f. 1 (ad). — f. 2 (juv). —

2) Eier: Thien. t. 53. f. 2. — Bäd. t. 9. f. 2.

L. S. XII. p. 123. n. 7. — Temm. Man. I. p. 8. — Savig. Descr. XXIII. p. 239. — Pall. Zoogr. I. p. 377. n. 41. — Schinz p. 108. — Br. Lehrb. p. 4. — Bp. Consp. I. Gen. 51. n. 2. — K. u. Bl. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 11. — Schl. Mus. Vult. p. 5. n. 1. — N. V. D. I. p. 170. — Rüpp. S. Ueb. n. 2. — Degl. u. G. n. 4. — Br. Thierl. III. p. 573. — Heugl. N. O. Afr. n. 7. —

N. 1852. H. III. p. 39. — Cab. Journ. 1854. p. 385. — p. 448. — 1856. p. 17. —p. 464. — p. 468. — 1861. p. 425. — 1862. p. 361. —

6. Neophron pileatus. Savig.

Mittel- und West-Afrika. — [Wird von Einigen als in Europa vorgekommen aufgeführt.] (?).

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. coll. 222. (juv). —

2) Eier: Bäd. t. 9. f. 1. — Cab. Journ. 1853. t. 5. f. 1.

Hartl. W. Afr. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 3. — Bp. Consp. I. Gen. 51. n. 1. — Schl. Mus. Vult. p. 5. n. 2. — Br. Thierl. III. p. 579. — Heugl. N. O. Afr. n. 8. —

N. 1852. H. I. p. 46. — p. 236. — H. III. p. 39. — Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 116. — 1854. p. 71. — p. 386. — 1856. p. 464. — 1860. p. 236. — 1861. p. 193. — p. 425. —

7. Gypaëtos barbatus. Cuv.

Portugal. Spanien, besonders in den Pyrenäen. Schweiz, selten. Griechenland. Türkei. Klein-Asien. Nord-Afrika.

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 431. — Gould. t. 4. — N. V. D. t. 4. (ad). — t. 5. (juv). — Gray, Gen. B. III. t. 1. — Rüpp. S. Ueb. t. 1. = G. meridionalis. — Schl. u. Susem. t. 5. — t. 6. —

2) Eier: Thien. t. 53. f. 1 (gut). — Bäd. t. 9. f. 3. — t. 57. f. 1. —

Cuv. Règne an. I. p. 318. — L. S. XII. p. 123. n. 6. — Pall. Zoogr. I. p. 372. n. 38. — M. u. W. I. p. 9. — p. 10. — Schinz p. 109. — Br. Lehrb. p. 10. — Bp. Consp. I. Gen. 52. n. 1. — n. 2. — n. 3. — K. u. Bl. n. 5. — Schl. Rev. I. p. 13. — II. p. 37. — Schl. Mus. Vult. p. 10. — Rüpp. S. Ueb. n. 1. — N. V. D. I. p. 180. — Br. Thierl. III. p. 542. — Degl. u. G. n. 5. — Heugl. N. O. Afr. n. 9. —

N. 1852. p. 39. — Cab. Journ. 1854. p. 385. — 1861. p. 193. — p. 425. — 1862. p. 39. — p. 128. — 1865. p. 58. = G. occidentalis. — Zool. Garten. 1871. p. 241. —

8. Falco candicans. Gm. L.

Grönland. Island. Nördlichstes Amerika. — [England. Schweden. Sibirien. Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 22. f. 1. — f. 2. — t 390. f. 1. — f. 2. = F. arcticus. — Gould. t. 19. — Buff. pl. enl. 446. — 210. = F. islandicus. —

2) Eier: Bäd. t. 26. f. 2. — f. 3. = F. islandicus. —

Gm. L. S. p. 275. n. 101. — Pall. Zoogr. I. p. 324. n. 12. — M. u. W. p. 65. — Br. Lehrb. p. 44. — Bp. Consp. I. Gen. 85. n. 7. — n. 8. — K. u. Bl. n. 8. — Schl. Rev. I. p. 1. — II. p. 1. — Schl. Mus. Falc. p. 7. — N. V. D. I. p. 269. — XIII. p. 16. — p. 19 = F. arcticus. — Degl. u. G. n. 27. — Br. Thierl. III. p. 414. —

N. 1857. p. 230. — p. 261. — Cab. Journ. 1856. p. 197. — 1857. p. 196. —

9. Falco gyofalco. Schl.

Norwegen. Lappland.

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 391. f. 1. — f. 2. — Buff. pl. enl. 462. —

2) Eier: Bäd. t. 74. f. 5. — Thien. t. 51. f. 3. a. b. c. d. — f. a. weniger gut.

L. S. XII. p. 130. n. 27. — Briss. Orn. I. p. 373. — Bp. Consp. I. Gen. 85. n. 9. (part). — K. u. Bl. n. 9 (part). — Schl. Rev. I. p. 2. — II. p. 5. — Schl. Mus. Falc. p. 11. — Degl. u. G. n. 28. — Br. Thierl. III. p. 414. —

N. 1857. p. 230. — p. 261. —

10. Falco sacer. Briss.

Ungarn. Walachei. Türkei. — [Sardinien: Antinori. Dalmatien. Griechenland. Aegypten. Syrien.]

Abbild. 1) Vogel: Schl. Faucon. t. 5. — Gould. t. 20. —

2) Eier: Thien. t. 51. f. 2. a. b. d. — f. c. weniger gut Ibis. 1865. p. 14. —

Briss. Orn. I. 337. — Temm. Man. I. p. 20. — Kaup. Isis. 1847. — Bp. Consp. I. Gen. 85. n. 13. — N. V. D. I. p. 279. (part.) — Schl. Rev. I. p. 2. — II. p. 9. — Schl. Mus. Falc. p. 16. — Heugl. N. O. Afr. n. 13. — Degl. u. G. n. 29. —

N. 1857. p. 248.

11. Falco lanarius. Schl.

Im südlichen Russland, bei Kiew, in der Krim und bei Sarepta. — [Selten in Algerien: Heuglin. Tetuan: Drake.]

Abbild. 1) Vogel: Fritsch. t. 5. f. 2. — N. V. D. t. 23. f. 1. — 2.

2) Eier: Bäd. t. 26. f. 4. — t. 74. f. 6. = F. tanypterus. Licht.

L. Faun. Suec. p. 22. n. 62.. — Pall. Zoogr. I. p. 330. — Briss. Orn. I. p. 365. — Bechst. Nat. V. D. II. p. 752. — Schinz p. 112. n. 1. — N. V. D. I. p. 279. (part.) — K. u. Bl. n. 10. — Schl. Rev. I. p. 2. — II. p. 11. —

Schl. Mus. Falc. p. 16. — Bp. Consp. I. Gen. 85. n. 15. — 18. Hartl. W. Afr. n. 737. — Degl. u. G. n. 30.

N. 1857. p. 252. — Cab. Journ. 1865. p. 62. —

12. Falco peregrinus. Briss.

Ganz Europa. Algerien. Nord-Amerika. — [Asien. Australien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 421. (ad) — 430 (ad) — 469 (juv). — Gould. t. 21. — N. V. D. t. 24. — t. 25. — Schl. u. Susem. t. 8. —

2) Eier: Thien t. 51. f. 1. a—e. — Bäd. t. 26. f. 1.

Gm. L. I. p. 170. n. 14. — Briss. Orn. I. p. 341. n. 6. — M. u. W. I. p. 55. — Schinz. p. 112. n. 2. — Br. Lehrb. p. 49. — Rüpp. S. Ueb. n. 24. — K. u. Bl. n. 7. — Schl. Rev. I. p. 2. — II. p. 14. — Schl. Mus. Falc. p. 1. (part). — N. V. D. I. p. 285. — Degl. u. G. n. 31. — Br. Thierl. III. p. 416. — Bp. Consp. I. Gen. 85. n. 1—4. — Heugl. N. O. Afr. n. 10. —

N. 1854. p. 46. Subspecies. — 1857. p. 257.

13. Falco peregrinoïdes. Temm.

Afrika. — [Im August 1867 wurde ein Männchen in Holland gefangen: Heuglin.]

Abbild. Vogel: Temm. pl. col. 479. — Fr. V. E. t. 2. f. 3. — Schl. u. Susem. t. 9. f. 1.

L. S. XII. p. 125. — Bp. Consp. 1. Gen. 85. n. 6. — Rüpp. S. Ueb. n. 25.? — Heugl. N. O. Afr. n. 11. — Schl. Mus. Falc. p. 5. n. 2. — Degl. u. G. n. 32. —

N. 1856. p. 465. — p. 478. — 1857. p. 260. —

14. Falco subbuteo. L.

Europa, vielleicht mit Ausschluss des südöstlichen Theiles. Sibirien: Dybowski. Algerien. — [Süd-Afrika: Layard.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 26. f. 1. — f. 2. — Gould. t. 22. — Buff. pl. enl. 432. Schl. u. Susem. t. 10. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 52. f. 7. a—d. — Bäd. t. 33. f. 1. —

L. S. XII. p. 127. n. 14. — M. u. W. I. p. 59. — Br. Lehrb. p. 50. — Schinz p. 113. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 86. n. 3. — K. u. Bl. n. 6. — Schl. Rev. I. p. 3. — Schl. Mus. Falc. p. 22. — Degl. u. G. n. 33. — Br. Thierl. III. p. 421. — Heugl. N. O. Afr. n. 15. —

15. Falco Eleonorae. Géné.

Cycladen. — [Sardinien. Griechenland. Türkei. Syrien. Klein-Asien.] —

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier: Thien. t. 52. f. 8. ab. — Bäd. t. 33. f. 5. —

Géné. l'Institut. 1839. Nov. — Schinz p. 428. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 86. n. 1. — Schl. Mus. Falc. p. 25. n. 1. — Degl. u. G. n. 34. — Schl. Rev. I. p. 3. —, II. p. 15. —

Cab. Journ. 1862. p. 436. — 1864. p. 1. — 1865. p. 63. —

16. Falco concolor. Temm.

Afrika. Madagaskar: Hartlaub. — [Lindermayer will ihn in Griechenland beobachtet haben, doch liegt hier nach Hartlaub eine Verwechslung mit F. Eleonorae vor.]

Abbild. Vogel: Temm. pl. col. 330. — Gould. t. 25. — Fr. V. E. t. 3 f. 4. — N. 1856. t. 1. —

Temm. Man. IV. p. 589. — Schinz. p. 115. n. 2. — K. u. Bl. n. 12. — Rüpp. S. Ueb. n. 31. — Schl. Rev. II. p. 17. — Bp. Consp. I. Gen. 86. n. 2. — Schl. Mus. Falc. p. 21. — Degl. u. G. n. 35. — Heugl. N. O. Afr. n. 14. N. 1856. p. 234. — p. 475. —

Cab. Journ 1854. p. 392. — 1855. p. 226. — 1861. p. 426. —

17. Falco cenchris. Naum.

Spanien. Süd-Italien. Steiermark. Griechenland. Türkei. Klein-Asien. — [Afrika: Brehm].

Abbild. 1) Vogel: N. V, D. t. 29. f. 1. — f. 2. — Gould. t. 27. — Schl. u. Susem. t. 12. —

2) Eier: Thien. t. 52. f. 3 a—d. — Bäd. t. 10. f. 4. —

N. V. D. I. p. 318. — Br. Lehrb. p. 56. — Schinz p. 115. n. 1. — K. u. Bl. n. 14. Schl. Rev. I. p. 4. — II. p. 19. — Schl. Mus. Falc. p. 29. n. 3. — Bp. Consp. I. Gen. 89. n. 9. — Rüpp. Syst. Ueb. n. 28. — Degl. u. G. n. 39. — Br. Thierl. III. p. 425. — Heugl. N. O. Afr. n. 23.

Cab. Journ. 1862. p. 435. —

18. Falco tinnunculus. L.

Ganz Europa. Asien. Nordost-Afrika: Heugl. Algerien: Loche. Daurien.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 401. — 471. Gould t. 26. N. V. D. t. 30. f. 1. — f. 2. Schl. u. Susem. t. 11. —

2) Eier: Thien. t. 52. f. 2. a—c. — Bäd. t. 10. f. 2. — f. 3 = F. guttata Brehm.

L. S. XII. p. 127. n. 16. — M. u. W. I. p. 62. — Schinz p. 114. — Br. Lehrb. p. 54. — K. u. Bl. n. 15. — Schl. Rev. I. p. 4. — II. p. 19. — Schl. Mus. Falc. p. 25. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 27. — n. 33. — Hartl. W. Afr. n. 20. — N. V. D. I. p. 323. — Br. Thierl. III. p. 425. — Bp. Consp. I. Gen. 89. n. 1. — Degl. u. G. n. 38. — Heugl. N. O. Afr. n. 21. —

19. Falco aesalon. Gm.

Schweden und Norwegen. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 447. — 468. — Gould. t. 24. — N. V. D. t. 27. f. 1—3. — Schl. u. Susem. t. 10. f. 2. — f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 52. f. 4. a b c. — Bäd. t. 33. f. 2. —

Gm. L. S. I. p. 284. n. 118. — M. u. W. I. p. 60. — Schinz p. 113. — Br. Lehrb. p. 51. — Bp. Consp. I. Gen. 86. n. 10. — K. u. Bl. n. 11. — Schl. Rev. I. p. 3. — Schl. Mus. Falc. p. 19. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 29. — N. V. D. I. p. 303. — Degl. u. G. n. 37. — Heugl. N. O. Afr. n. 17. —

20. Falco vespertinus. L.

Polen. Russland. Ungarn. Klein-Asien. Algerien: Loche.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 421. — Gould. t. 23. — N. V. D. t. 28. f. 1—3. — Schl. u. Susem. t. 13. —

2) Eier: Thien t. 52. f. 1. a—d. — Bäd. t. 10. f. 1. —

L. S. XII. p. 129. n. 23. — Besecke, V. Kurl. p. 13. — M. u. W. I. p. 64. — Schinz p. 116. — Br. Lehrb. p. 52. — Bp. Consp. I. Gen. 28. n. 1. — K. u. Bl. n. 13. — Schl. Rev. I. p. 4. — Schl. Mus. Falc. p. 32. — Rüpp. Syst. Ueb. n. 32. — N. V. D. I. p. 311. — Degl. u. G. n. 36. — Br. Thierl. III. p. 428. — Heugl. N. O. Afr. n. 20. —

21. Astur palumbarius. Bechst.

Ganz Europa. Sibirien: Dybowski. Klein-Asien. — [Egypten: Rüppell.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 418. — 425. — 461. — Gould. t. 17. — N. V. D. t. 17. — t. 18. — Schl. u. Susem. t. 28. —

2) Eier: Thien. t. 44. f. 7. a b c. — Bäd. t. 33. f. 3. —

Cuv. Règne an. I. p. 33. — L. S. XII. p. 130. n. 30. — M. u. W. I. p. 49. — Br. Lehrb. p. 39. — Schinz p. 123. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 100. n. 6. — K. u. Bl. n. 24. — Schl. Rev. I. p. 4. — Schl. Mus. Ast. p. 16. — Rüpp. S. Ueb. n. 38. — Degl. u. G. n. 40. — Br. Thierl. III. p. 437. — N. V. D. I. p. 249. — Heugl. N. O. Afr. n. 37. —

Cab. Journ. 1854. p. 395. —

22. Astur brevipes. (Severtz.)

Serbien: Hodeck, 13. Mai 1869. Klein-Asien: Krüper, 22. Mai 1864. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. S. Ueb. t. 2. — Temm. pl. col. 308. — 336. —

2) Eier: Verhandl. d. K. K. zool.-bot. Gesellsch. in Wien. 1864. t. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 41. — Hartl. W. Afr. n. 33. — Bp. Consp. I. Gen. 102. n. 3. — n. 4. — Schl. Mus. Ast. p. 48. n. 1. — Heugl. N. O. Afr. n. 45. — Cab. Journ. 1861. p. 194. — p. 429. — p. 428. — 1862. p. 31. — 1864. p. 464. — 1866. p. 128. — 1869. p. 26. (Eier). — Zoolog. Gart. 1869. p. 374. —

23. Astur nisus. K. u. Bl.

Ganz Europa, im Süden seltener. Canaren: Bolle. Algerien: Loche. — [Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 412. — 467. — Gould. t. 18. — N. V. D. t. 19. — t. 20. — Schl. u. Susem. t. 29.

2) Eier: Thien. t. 45. f. 1. a—g. — Bäd. t. 33. f. 4. —

Cuv. Règne an. I. p. 333. — L. S. XII. p. 130. n. 31. — Pall. Zoogr. I. p. 370. n. 37. — M. u. W. I. p. 52. — Br. Lehrb. p. 40. — Schinz p. 12. n. 2. — K. u. Bl. n. 35. — Schl. Rev. I. p. 5. — Schl. Mus. Ast. p. 28. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 101. n. 4. — Rüpp. S. Ueb. n. 40. — N. V. D. I. p. 258. — Degl. u. G. n. 41. — n. 41 a. — Heugl. N. O. Afr. n. 41. — Cab. Journ. 1854. p. 393. — 1861. p. 428. — 1864. p. 386. —

24. Astur gabar. Kaup.

Afrika. — [Soll in Portugal brütend vorgekommen und Vogel und Eier dem Könige überbracht worden sein: Naumann 1856. p. 267. Diese Angabe scheint auf einem Irrthum zu beruhen, da ich weder bei dem Könige Don Luiz, noch auf dem Zoologischen Museum in Lissabon etwas darüber erfahren konnte. Griechenland (?).]

Abbild. Vogel: Temm. pl. col. 122., 240. — Levaill. Ois. d'Afr. t. 33. —

Cuv. Règne an. I. p. 133. — Däud. II. p. 87. — Levaill. Ois d'Afr. I. p. 136. — Bp. Consp. I. Gen. 102. n. 5. — Hartl. W. Afr. n. 31. n. 32. — Rüpp. S. Ueb. n. 44. — Schl. Rev. I. p. 5. — II. p. 21. — Schl. Mus. Ast. p. 48. n. 2. — Heugl. N. O. Afr. n. 46. n. 47. —

Cab. Journ. 1854. p. 394. — 1858. p. 405. — 1861. p. 74. — p. 194. — p. 429. — 1862. p. 31. — 1866. p. 193. —

25. Aquila fulva. M. u. W.

Spanien: A. Brehm. Schweiz. Tyrol. Pommern. Schweden: Mewes. Polen. Süd-Russland. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Algerien: Loche.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 409—410. — Gould. t. 6. — N. V. D. t. 8. — t. 9. — t. 339. — Schl. u. Susem. t. 16. — t. 17. —

2) Eier: Thien. t. 48. f. 1. ab. — f. 2. a—e. — Bäd. t. 17. f. 2. —

L. S. XII. p. 125. n. 5. n. 6. — Pall. Zoogr. I. p. 338. n. 19. — M. u. W. I. p. 14, — p. 15. — Br. Lehrb. p. 13. — Schinz p. 117. — Bp. Consp. I. Gen. 60. n. 1. — K. u. Bl. n. 27. — Schl. Rev. I. p. 6. — II. p. 23. — Schl. Mus. Aq. p. 1. — N. V. D. I. p. 208. — Degl. u. G. n. 6. — Br. Thierl. III. p. 447. — Heugl. N. O, Afr. n. 24. —

Cab. Journ. 1853. p. 58. — 1862. p. 443. — 1863. Beil. XI. p. 78. — p. 80. —

26. Aquila imperialis. K. u. Bl.

Ungarn. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Süd-Russland. Daurien: Dybowski.

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 151. — 152. — Gould. t. 5. — N. V. D. t. 6. — t. 7. — t. 340. — Schl. u. Susem. t. 14. (ad) t. 15 (juv). —

2) Eier: Thien. t. 45. f. 5. abc. — Bäd. t. 25. f. 2.

Cuv. Règne an. I. p. 325. — Bechst. Orn. Tasch. III. p. 55. n. 3. — Pall. Zoogr. I. p. 341. — Br. Lehrb. p. 14. — Bp. Consp. I. Gen. 60. n. 2. — K. u. Bl. n. 28. — Schl. Rev. I. p. 7. — II. p. 23. — Schl. Mus. Aq. p. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 12. — N. V. D. I. p. 201. — Degl. u. G. n. 7. — Br. Thierl. III. p. 449. — Heugl. N. O. Afr. n. 25. —

27. Aquila naevioïdes. Cuv.

Afrika. — [Syrien. Persien. Süd- und West-Indien. Süd-Europa: Heuglin.]

Abbild. Vogel: Temm. pl. col. 455. — Rüpp. N. W. t. 13. —

Cuv. Règne an. I. p. 326. — Proceed. Zool. Soc. 1831. p. 11. — Bp.

Consp. I. Gen. 60. n. 5. — Rüpp. S. Ueb. n. 15. — Hartl. W. Afr. n. 5. — Schl. Mus. Aq. p. 3. — Degl. u. G. n. 9. —

N. 1852. H. I. p. 37. — 1855. p. 12. Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 94. — 1854. p. 389. — 1858. p. 328. — 1860. Bericht. d. Orn. Vers. in Stuttg. p. 55. — 1861. p. 426. — 1863. Beil. XI. p. 93. — 1866. p. 120. —

28. Aquila naevia. Briss.

Süd-Schweden: Mewes. Pommern. Polen. Braunschweig. Hannover. Anhalt. Ober-Schlesien. Ungarn. Griechenland. Türkei. Süd-Russland. [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 10. — t. 11. — Gould. t. 8. — Schl. u. Susem. t. 20. (ad) t. 21. (juv.) — Cab. Journ. 1853. t. 4. Var. pallida. —

2) Eier: Thien. t. 49. f. 5. a b c. — Bäd. t. 1. f. 2.

Briss. Orn. I. p. 423. — Gm. L. S. p. 258. — Vieill. Nouv. Dict. I. p. 235. — M. u. W. p. 19. (part). — Br. Lehrb. p. 19. — p. 974. — Bp. Consp. I. Gen. 60. n. 4. (part.) — K. u. Bl. n. 26. (part.) — Schl. Rev. I. p. 7. (part.) — II. p. 24. — Schl. Mus. Aq. p. 6. — Rüpp. S. Ueb. n. 13. — N. V. D. I. p. 217. — Degl. u. G. n. 8. — Br. Thierl. III. p. 454. — Heugl. N. O. Afr. n. 27. —

Cab. Journ. 1853. p. 60. — Extrh. p. 69. — 1862. p. 447. — 1863. Beil. XI. p. 96. —

29. Aquila clanga. Pall.

Süd-Russland. Krim.

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 342., t. 346. —

2) Eier: Bäd. t. 1. f. 1.

Pall. Zoogr. I. p. 351. n. 25. — Br. Lehrb. p. 16. — N. V. D. XIII. p. 10. — K. u. Bl. n. 26. (part). — Bp. Consp. I. Gen. 60. n. 4. (part.) — Schl. Rev. I. p. 7. (part.) II. p. 24. — Degl. u. G. n. 8. A. —

Cab. Journ. 1853. p. 61. — 1863. Beil. XI. p. 86. —

30. Aquila fasciata. Vieill.

Portugal. Spanien Griechenland. Cykladen. Nord-Afrika. [Asien.] —

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 288. — Gould. t. 7. — N. V. D. t. 341. — Schl. u. Susem. t. 18 (ad) t. 19 (juv.) —

2) Eier: Thien. t. 49. f. 4. — Bäd. t. 17. f. 3. —

Vieill, Mem. Soc. Linn. II. p. 152. — Temm. Man. III. p. 19. — Schinz. p. 122. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 60 n. 8. — K. u. Bl. n. 25. — Schl. Rev. I. p. 7. — II. p. 23. — Schl. Mus. Aq. p. 9. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 6. — N. V. D. XIII. p. 9. — Br. Thierl. III. p. 460. — Heugl. N. O. Afr. n. 29. — Degl. u. G. n. 10. —

N. 1855. p. 24. — Cab. Journ. 1853. p. 204. — 1855. p. 25. — 1859. p. 439, p. 441. — 1863. Beil. X. p. 100. — 1865. p. 60. —

31. Aquila pennata. Br.

Spanien. Süd-Frankreich. Türkei. Griechenland. Egypten: Heuglin. — [Palästina. Asien. Australien: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 33. — Gould. t. 9. — N. V. D. t. 343. — Schl. u. Susem. t. 22. (ad). t. 23. (juv.) —

2) Eier: Thien. t. 49. f. 2. a. (Nicht wie auf der Tafel steht: f. 3. abc; wenigstens stimmt von den abgebildeten Eiern nur f. 2. a. annähernd mit denen von A. pennata überein). — Bäd. t. 1. f. 3. —

Briss. Orn. VI. p. 22. — Gm. L. S. p. 272. n. 90. — Bp. Consp. Gen. 60. n. 9. — Br. Lehrb. p. 20. p. 21. p. 976. — K. u. Bl. n. 24. — Schl. Rev. I. p. 7. — II. p. 25. — Schl. Mus. Aq. p. 8. — Schinz. p. 121. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 8. — Rüpp. S. Ueb. n. 14. — Degl. u. G. n. 11. — Br. Thierl. III. p. 456. — Heugl. N. O. Afr. n. 28. —

N. 1851. H. I. p. 36. — H. II. p. 24., 27. — 1852. H. II. p. 65. — 1855. p. 22. — Cab. Journ. 1853. p. 202. — 1854. p. 388. — 1864. p. 384. —

32. Haliaëtos albicilla. Boie.

Grönland. Norwegen. Pommern. Süd-Russland. Krim. Asien. Nord-Afrika.

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 112. — Gould. t. 10. — N. V. D. t. 12., t. 14., t. 15. — Schl. u. Susem. t. 25., t. 26. —

2) Eier: Thien. t. 47. f. 5. ab. — Bäd. t. 57. f. 2. —

Briss. Orn. I. p. 427. n. 5. — L. S. p. 124. n. 4. — M. u. W. I. p. 16. — Br. Lehrb. p. 22. — Schinz. p. 119. n. 1. — K. u. Bl. n. 29. — Schl. Rev. I. p. 8. — II. p. 28. — Schl. Mus. Aq. p. 11. n. 2. — Bp. Consp. I Gen. 61. n. 1. — N. V. D. I. p. 224. — Degl. u. G. n. 12. — Br. Thierl. III. p. 472. —

33. Haliaëtos leucocephalus. Cuv.

Nord-Amerika. — [Soll einige Male in Europa vorgekommen sein. (?)]

Abbild. Vogel: Audub, B. Am. t. 31., t. 126. — Wils. Am. Orn. IV. t. 36. — VII. t. 55. — Buff. pl. enl. 411. —

Briss. Orn. I. p. 422. n. 2. — L. S. XII. p. 124. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 22. — K. u. Bl. n. 30. — Schinz. p. 119. n. 2. — Schl. Mus. Aq. p. 12. — Degl. u. G. n. 13. — Br. Thierl. III. p. 473. —

Cab. Journ. 1858. p. 3. —

34. Haliaëtos leucoryphus. Brandt.

Asien. [Das Vorkommen in Europa ist sehr zweifelhaft.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 8. — 223. —

2) Eier: Thien. t. 50. f. 2. —

Gm. L. S. p. 259. — Cuv. Règne an. I. p. 327. Anmerk. — Pall. Zoogr. I. p. 352. n. 26. — Bp. Consp. I. Gen. 61. n. 4. — K. u. Bl. n. 31. — Schl. Rev. I. p. 8. — II. p. 28. — Schl. Mus. Aq. p. 15. — Degl. u. G. n. 14. — Cab. Journ. 1854. p. 355.

35. Haliaëtos vocifer. Vieill.

Afrika. [Wohl nur irrthümlich als in Europa vorgekommen aufgeführt.]

Abbild. Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. t. 4. —

Cuv. Règne an. I. p. 326. — Bp. Consp. I. Gen. 61. n. 5. — Schl. Rev. I. p. 8. — II. p. 31. — Schl. Mus. Aq. p. 16. — Hartl. W. Afr. n. 17. — Rüpp. S. Ueb. n. 21. — Br. Thierl. III. p. 479. — Heugl. N. O. Afr. n. 32. — N. 1852. H. I. p. 35. — 1856. p. 207. — Cab. Journ. 1853. p. 199. — 1863. p. 8. — 1864. p. 234. — 1866. p. 122. —

36. Circaëtos gallicus. Vieill.

Spanien. Süd-Frankreich. Pommern. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Nord-West-Afrika. [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 413. — Gould. t. 13. — N. V. D. t. 15. — Schl. u. Susem. t. 35. —

2) Eier: Thien. t. 47. f. 1. a—c. — Bäd. t. 25. f. 3. —

Gm. L. S. I. p. 259. n. 52. — Pall. Zoogr. I. p. 354. n. 27. — Cuv. Règne an. I. p. 328. — Temm. Man. I. p. 46. Bechst. Orn. Tasch. p. 460. n. 3. — M. u. W. I. p. 21. — Schinz. p. 121. n. 2. — Br. Lehrb. p. 26. — Bp. Consp. I. Gen. 66. n. 1. — N. V. D. I. p. 236. — Rüpp. S. Ueb. n. 18. — Hartl. W. Afr. n. 12. — K. u. Bl. n. 19. — n. 20. — Schl. Mus. But. p. 23. n. 2. — Br. Thierl. III. p. 504. — Degl. u. G. n. 16. — Heugl. N. O. Afr. n. 51. — N. 1851. p. 24. — 1856. p. 202. — Cab. Journ. 1853. p. 206. — 1854. p. 390. — 1862. p. 39. — 1866. p. 123. —

37. Pandion haliaëtos. Cuv.

Schweden. Pommern. Archangel. Sarepta. — [Ganz Europa. Afrika. Sunda-Inseln. Asien. Nord-Amerika. Australien: Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 414. — Gould. t. 12. — N. V. D. t. 16. — Schl. u. Susem. t. 24. —

2) Eier: Thien. t. 49. f. 3. a—d. (Nicht wie auf der Tafel angegeben: f. 2. a—d.) — Bäd. t. 2. f. 1. (Sehr gut.) —

L. S. XII. p. 129. n. 26. — Schinz. p. 122. n. 1. — Br. Lehrb. p. 27. — M. u. W. I. p. 23. — N. V. D. I. p. 241. — K. u. Bl. n. 18. — Schl. Mus. Aq. p. 22. — Rüpp. S. Ueb. n. 22. — Hartl. W. Afr. n. 16. — Bp. Consp. I. Gen. 64. n. 1. — Degl. u. G. n. 15. — Br. Thierl. III. p. 481. — Heugl. N. O. Afr. n. 53. —

38. Pernis apivorus. Cuv.

Ganz Europa, mit Ausschluss des höchsten Nordens. In Mittel-Schweden: (Wärmeland) noch brütend. — [Nord-Afrika. Asien.]

Abbild.: 1) Vogel: Willugb. Orn. t. 3. — Buff. pl. enl. 420. — Gould. t. 16. — N. V. D. t. 35., t. 36. — Schl. u. Susem. t. 35. —

2) Eier: Thien t. 50. f. 7. a—e. — Bäd. t. 57. f. 3. —

L. S. XII. p. 130. n. 28. — Cuv. Règne an. I. p. 325. — Pall. Zoogr. I. p. 359. n. 31. — M. u. W. I. p. 39. — Br. Lehrb. p. 36. — Schinz. p. 127. n. 2. — K. u. Bl. n. 21. — Schl. Rev. I. p. 9. — Schl. Mus. Pern. p. 1. —

Rüpp. S. Ueb. n. 34. — Hartl. W. Afr. n. 22. — Bp. Consp. I. Gen. 75. n. 1. — N. V. D. I. p. 367. — Degl. u. G. n. 71. — Br. Thierl. III. p, 508. — Heugl. N. O. Afr. n. 62. —

39. Buteo vulgaris. Bechst.

Ganz Europa; im Süden seltener. Sibirien: Dybowski. Klein-Asien, einzeln. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 419. — Gould. t. 14. — N. V. D. t. 32., t. 33. — Schl. u. Susem. t. 33. —

2) Eier: Thien. t. 46. f. 2. a—d. — Bäd. t. 41. f. 1. —

Gessn. Av. 46. — Willugb. Orn. p. 38. n. 2. — L. S. XII. p. 127. n. 15. — Bechst. Nat. Deutsch. II. p. 623., p. 639. — M. u. W. I. p. 34. — Br. Lehrb. p. 33. — Schinz. p. 126. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 72. n. 1. — K. u. Bl. n. 22. — Schl. Rev. I. p. 9. — II. p. 31. — Schl. Mus. But. p. 3. n. 2. — N. V. D. I. p. 346. — Rüpp. S. Ueb. n. 9. — Degl. u. G. n. 17. — Br. Thierl. III. p. 512. — Heugl. N. O. Afr. n. 58. —

40. Buteo lagopus. Vieill.

Lappland. Labrador. — [Ganz Europa. Nord-Amerika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 34. — Gould. t. 15. — Schl. u. Susem. t. 34. —

2) Eier: Thien t. 46. f. 3. a—d. — Bäd. t. 41. f. 2.

Cuv. Règne an. I. p. 336. — Brünn. Orn. bor. p. 4. n. 15. — Lath. Ind. Orn. I. p. 26. — M. u. W. I. p. 37. — Schinz. p. 127. — Br. Lehrb. p. 34. — Bp. Consp. I. Gen. 70. n. 1. — K. u. Bl. n. 23. — Schl. Rev. I. p. 9. — II. p. 32. — Schl. Mus. But. p. 1. — N. V. D. I. p. 359. — Degl. u. G. n. 20. — Br. Thierl. III. p. 512. —

41. Buteo desertorum. Daud.

Sarepta: 1851 von Möchler bekannt gemacht. Süd-Afrika: Layard. [Hat sich schon öfter bis nach Deutschland verflogen. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 17. —

2) Eier: Bäd. t. 73. f. 3. —

Daud. Orn. II. p. 102. — Bp. Consp. I. Gen. 72. n. 3. — Hartl. W. Afr. n. 3. — Schl. Mus. But. p. 5. — Degl. u. Gerbe. n. 18. —

Cab. Journ. 1855. p. 94. — 1870. p. 176.

42. Buteo ferox. Thien.

Süd-Russland. Asien. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 27. — N. 1853. t. 5. —

2) Eier: Bäd. t. 2. f. 2. — N. 1853. t. 6. f. 1—5. —

Gm. Nov. Com. Petrop. XV. p. 442. — Thien. Rhea. 1846. p. 104. — Bp. Consp. I. Gen. 72. n. 4. — Schl. Mus. But. p. 9. — Rüpp. S. Ueb. n. 11. — Degl. u. G. n. 19. — Heugl. N. O. Afr. n. 56.

N. 1853. p. 24. — p. 256. — 1855. p. 3. — Cab. Journ. 1853. p. 105. Extrah. — 1854. p. 260. — p. 387. — 1864. p. 348. — 1866. p. 123. — 1869. p. 29. —

43. Elanus coeruleus. Bp.

Egypten. — [Asien. Soll sich nach Süd-Europa, und nach Naumann einmal nach Mecklenburg verflogen haben.]

Abbild. 1) Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. t. 36., t. 37. — Gould. t. 31. — N. V. D. t. 347. —

2) Eier: Thien. t. 44. f. 6. ab. (Falsch.) — Bäd. t. 18. f. 4. — t. 49. f. 3. —

Desf., Mem. de l'Ac. R. des S. p. 503. — Daud. Orn. II. p. 152. — Bp. Consp. I. Gen. 82. n. 1. n. 2. — K. u. Bl. n. 16. — Schl. Rev. I. p. 11. — II. p. 35. — Schl. Mus. Milv. p. 6 — Hartl. W. Afr. n. 24. — Rüpp. S. Ueb. n. 35. — Schinz. p. 125. n. 2. — Degl. u. G. n. 25. — Br. Thierl. III. p. 487. — Heugl. N. O. Afr. n. 66. —

Cab. Journ. 1853. p. 265. — Extrh. p. 94. — 1854. p. 393. — 1861. p. 100. — p. 426. — 1863. p. 306. — 1864. p. 235. — 1866. p. 124. —

44. Milvus regalis. Briss.

Europa, besonders in der Ebene. Nur im höchsten Norden fehlend. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 422. — Gould. t. 28. — N. V. D. t. 31. f. 1. — Schl. u. Susem. t. 30. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 45. — f. 4. a—d. — Bäd. t. 18. f. 1. —

L. S. XII. p. 126. n. 12. — Briss. Orn. I. p. 414. n. 35. — Pall. Zoogr. I. p. 258. n. 20. — M. u. W. I. p. 25. — Br. Lehrb. p. 30. — Schinz. p. 124. — K. u. Bl. n. 2. Schl. Rev. I. p. 10. — Schl. Mus. Milv. p. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 80. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 36. — Degl. u. G. n. 22. — N. V. D. I. p. 333. — Br. Thierl. III. p. 492. — Heugl. N. O. Afr. No. 62. —

Cab. Journ. 1854. p. 449. —

45. Milvus ater. Daud.

Ebene Gegenden besonders Ost-Europa's. In Russland gemein. Deutschland. Asien. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 472. — Gould. t. 29. — N. V. D. t. 31. f. 2. — Schl. u. Susem. t. 30. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 45. f. 6. a—d. — Bäd. t. 18. f. 2. —

Briss. Orn. I. p. 413. n. 34. — Gm. L. S. p. 262. n. 62. — M. u. W. I. p. 27. — Schinz. p. 125 (part.). — Br. Lehrb. p. 31. — K. u. Bl. n. 33. — Schl. Rev. I. p. 10. — Schl. Mus. Milv. p. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 80. n. 3. — Degl. u. G. n. 23. — Br. Thierl. III. p. 491. — N. V. D. I. p. 340. — Heugl. N. O. Afr. n. 64. —

Cab. Journ. 1854. p. 393. — 1864. p. 152. — p. 384.

46. Milvus aegyptius. Gray.

Afrika, — [Dalmatien. Griechenland. Klein-Asien: Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. I. pl. 22. — Schl. u. Susem. t. 31.

2) Eier: Thien. t. 45. f. 5. a b c. — Bäd. t. 18. f. 3. —

Lath. Ind. Suppl. p. 4. Levaill. Ois. d'Afr. I. p. 88. — Gm. L. S. p. 261. n. 61. — p. 263. — Bp. Consp. I. Gen. 80. n. 5. — Schl. Rev. I. p. 10.

— II. p. 34. — Schl. Mus. Milv. p. 3. — Hartl. W. Afr. n. 23. — Rüpp. S. Ueb. n. 37.? — Degl. u. G. n. 24. — Br. Thierl. III. p. 492. — Heugl. N. O. Afr. n. 65. —

N. 1852. H. I. p. 45. — Cab. Journ. 1853. p. 265. — Extrh. p. 94. — 1854. p. 393. — 1861. p. 426. — 1863. p. 237. — 1864. — p. 385. — 1866. p. 124. —

47 Nauclerus furcatus. Vig.

Süd-Amerika. — [Soll in England erlegt worden sein.]

Abbild. Vogel: Wils. Am. Orn. t. 51. f. 2. — Audub. B. Am. t. 72. — Gould. t. 30. — Schl. u. Susem. t. 32. f. 1.

Vig. Zool. Journ. II, p. 386. — L. S. XII. p. 129. n. 25. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 75. — Schinz p. 126. n. 1. — p. 428. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 81. n. 1. — K. u. Bl. n. 17. — Schl. Rev. I. p. 11. — Schl. Mus. Milv. p. 5. — Degl. u. G. n. 26. — Br. Thierl. III. p. 495. —

48. Circus aeruginosus. Sav.

Ganz Europa. Egypten: Brehm. [Asien. Nord-Afrika. Canaren.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 423. — 424. — 460. — Gould. t. 32. — N. V. D. t. 37. — t. 38. — Schl. u. Susem. t. 36. —

2) Eier: Thien. t. 44. f. 5. a b c. — Bäd. t. 49. f. 1. —

Briss. Orn. I. p. 404. n. 30. — 401. n. 29. — L. S. XII. p. 130. n. 29. — M. u. W. I. p. 43. — Schinz. p. 128. — Br. Lehrb. p. 58. — Bp. Consp. I. Gen. 105. n. 1. — K. u. Bl. n. 39. — Schl. Rev. I. p. 5. — Schl. Mus. Circ. p. 10. — Degl. u. G. n. 42. — N. V. D. I. p. 378. — Rüpp. S. Ueb. n. 45. — Br. Thierl. III. p. 500. — Heugl. N. O. Afr. n. 68. —

N. 1857. p. 308. —

49. Circus cyaneus. Bechst.

Scheint auf Mittel-Europa beschränkt zu sein. Daurien: Dybowski. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 443. — 459. — 480. — Gould. t. 33. — N. V. D. t. 38. — t. 39. — Schl. u. Susem. t. 37. —

2) Eier: Thien. t. 44. f. 1. a b. — Bäd. t. 49. f. 2. —

L. S. XII. p. 126. n. 10. — Pall. Zoogr. I. p. 364. n. 35. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 25. n. 20. — M. u. W. I. p. 45. — Schinz p. 129. — Br. Lehrb. p. 59. — Bp. Consp. I. Gen. 106. n. 6. — K. u. Bl. n. 36. — Schl. Rev. I. p. 6. — II. p. 22. — Schl. Mus. Circ. p. 1. — p. 2. — Degl. u. G. n. 43. — Rüpp. S. Ueb. n. 46. — Br. Thierl. III. p. 498. — Heugl. N. O. Afr. n. 69. —

N. 1857. p. 311.

50. Circus cineraceus. Naum.

Gemässigtes Europa. — [Asien. Nord-Ost-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 35. — N. V. D. t. 40. f. 1—3. — Schl. u. Susem. t. 38. —

2) Eier: Thien. t. 44. f. 3. a b. — Bäd. t. 74. f. 4. —

Montag. Trans. Linn. Soc. IX. p. 188. — L. S. XII. p. 126. n. 11. — Schinz p. 131. — Br. Lehrb. p. 60. — Bp. Consp. I. Gen. 106. n. 7. — K. u.

Bl. n. 38. — Schl. Rev. I. p. 6. — II. p. 22. — Schl. Mus. Circ. p. 3. — Degl. u. G. n. 44. — N. V. D. I. p. 402. — Br. Thierl. III. p. 498. — Heugl. N. O. Afr. n. 70. —

N. 1857. p. 318. —

51. Circus Swainsoni. Smith.

Ungarn. An der Wolga häufig. Egypten:(?) Heuglin. — [Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 34. — N. V. D. t. 384. — Schl. u. Susem. t. 39. —

2) Eier: Thien t. 44. f. 2 a b. — Bäd. t. 74. f. 3. —

Smith, South. Afr. Quart. p. 384. — Sykes. Proceed. Zool. Soc. 1832. April. — Schinz p. 130. — Bp. Consp. I. Gen. 106. n. 8. — K. u. Bl. n. 37. — Schl. Rev. I. p. 6. — II. p. 22. — Schl. Mus. Circ. p. 4. — Hartl. W. Afr. n. 39. — Degl. u. G. n. 45. — Br. Thierl. III. p. 498. — Heugl. N. O. Afr. n. 71. —

N. 1857. p. 314. —

52. Strix funerea. L.

Schweden. Norwegen. Nord-Russland. Sibirien. Labrador. — [Schlesien: A. v. Homeyer.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 45. — N. V. D. t. 42. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 12. — Bäd. t. 42. f. 1. —

L. S. XII. p. 133. n. 11. — Briss. Orn. I. p. 518. p. 520. — Gm. L. S. p. 295. — Lath. Ind. Orn. I. p. 86. — Pall. Zoogr. I. p. 316. n. 6. — M. u. W. I. p. 84. — Schinz p. 134. n. 2. — Br. Lehrb. p. 68. — Bp. Consp. I. Gen. 107. — K. u. Bl. n. 50. — Schl. Rev. I. p. 17. — Schl. Mus. Strig. p. 42. — N. V. D. I. p. 427. — Degl. u. G. n. 46. — Br. Thierl. III. p. 591. —

53. Strix nyctea. L.

Norden Europa's und Amerika's. — [Oefter in (Nord-) Deutschland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 4. — t. 32. f. 1. — Gould. t. 43. — N. V. D. t. 41. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 11. a b c. — Bäd. t. 42. f. 2. —

L. S. XII. p. 132. n. 6. — Faun. Suec. p. 25. n. 76. — M. u. W. I. p. 75. — Schinz p. 133. n. 1. — Br. Lehrb. p. 65. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 108. — K. u. Bl. n. 51. — Schl. Rev. I. p. 17. — Schl. Mus. Strig. p. 43. — Degl. u. G. n. 47. — N. V. D. I. p. 417. — Br. Thierl. III. p. 595. —

54. Strix passerina. L.

Schweden. — [Schweiz. Schlesien. Russland.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 50. — N. V. D. t. 43. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 4. — Bäd. t. 42. f. 3. —

Faun. Suec. p. 26. n. 79. — L. S. XII. p. 133. n. 12. — Temm. Man. I. p. 96. — Bechst. Nat.D. II. p. 978. — M. u. W. I. p. 83. — Schinz. p. 138. n. 1. — Br. Lehrb. p. 75. — Bp. Consp. I. Gen. 109. n. 1. — K. u. Bl. n. 49. — Schl. Rev. I. p. 16. — Schl. Mus. Strig. p. 41. — N. V. D. I. p. 434. Degl. u. G. n. 48. — Br. Thierl. III. p. 603. —

55. Strix noctua. Retz.

Gemässigtes Europa. — [Griechenland. Türkei. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 48. — N. V. D. t. 48. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 2. abc. — Bäd. t. 42. f. 4. —

Retz, Faun. Suec. p. 84. n. 35. (part.) — Bechst. Nat. D. II. p. 963. — Nils. Orn. Suec. I. p. 68. — M. u. W. I. p. 80. — Br. Lehrb. p. 73. — Schinz p. 137. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 110. n. 12. (part.) — K. u. Bl. n. 48. — Schl. Rev. I. p. 15. — Schl. Mus. Strig. p. 28. N. V. D. I. p. 493. — Rüpp. S. Ueb. u. 50. — Degl. u. G. n. 49. — Br. Thierl. III. p. 598. — Heugl. N. O. Afr. n. 83. —

56. Var. Strix meridionalis. Risso.

Portugal. Spanien. Italien. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Algerien: Loche. —

Abbild. Vogel: Buff. pl. enl. 439. —

Forsk. Descr. p. 8. n. 2. — Savig. Descr. de l'Eg. XXIII. p. 287. — Vieill, Nouv. Dict. VII. p. 26. — Schinz p. 133. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 15. — II. p. 39. — Schl. Mus. Strig. p. 29. n. 1. — Bp. Consp. 1. Gen. 110. n. 12. (part.). — Rüpp. N. W. p. 45. — Degl. u. G. n. 49. A.

57. Strix Tengmalmi. Gm.

Schweden und Norwegen. Süd-Frankreich. Galizien. Riesen- und Isergebirge: A. v. Homeyer. — [Asien und Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 49. — N. V. D. t. 48. f. 2. — f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 3. ab. — Bäd. t. 42. f. 6. —

Gm. L. S. p. 291. n. 44. — Faun. Suec. n. 75. — Pall. Zoogr. I. p. 323. n. 11. — Bechst. Nat. D. II. p. 972. n. 13. — M. u. W. I. p. 82. — Br. Lehrb. p. 74. — Schinz p. 137. n. 1. — N. V. D. I. p. 500. — K. u. Bl. n. 47. — Schl. Rev. I. p. 15. — Schl. Mus. Strig. p. 8. — Bp. Consp. I. Gen. 124. n. 1. — Degl. u. G. n. 50. — Br. Thierl. III. p. 619. — Heugl. N. O. Afr. n. 88. —

58. Strix aluco. L.

Mittel-Europa. Nördlich bis Skandinavien. Griechenland. Macedonien. Algerien: Loche. — [Syrien. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 437. — 441. — Gould. t. 47. — N. V. D. t. 46. — t. 47. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 5. abc. — Bäd. t. 42. f. 5. —

L. S. XII. p. 132. n. 7. — p. 133. n. 9. — M. u. W. I. p. 76. — Schinz p. 136. n. 1. — Br. Lehrb. p. 70. — p. 71. — Bp. Consp. I. Gen. 121. n. 1. — K. u. Bl. n. 44. — Schl. Rev. I. p. 16. — Schl. Mus. Strig. d. 12. — Degl. u. G. n. 51. — N. V. D. I. p. 473. — Br. Thierl. III. p. 616. — Heugl. N. O. Afr. n. 86. —

59. Strix uralensis. Pall.

Schweden. Norwegen. Polen. Böhmen: Fritsch. Karpathen: Wodczicki. Sibirien. Steiermark.

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 27. — Gould. t. 44. — N. V. D. t. 42. f. 1. (fem juv.) —

2) Eier:

Pall. It. I. app. n. 25. — Pall. Zoogr. I. p. 319. n. 8. — Faun. Suec. p. 79. n. 29. — M. u. W. I. p. 84. — Schinz p. 134. n. 1. — Br. Lehrb. p. 67. — Bp. Consp. I. Gen. 122. n. 1. — K. u. Bl. n. 43. — Schl. Rev. I. p. 16. — Schl. Mus. Strig. p. 10. — Degl. u. G. n. 25. — N. V. D. I. p. 422. —

60. Strix lapponica. Retz.

Skandinavien. Sibirien. Nördlichstes Amerika.

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 351. — Gould. t. 42. — Sparrm. Mus. Carlson. V.

2) Eier: Bäd. t. 73. f. 4. —

Retz. Faun. Suec. p. 79. — Pall. Zoogr. I. p. 318. n. 7. — Bp. List. p. 6. — Schinz p. 132. — Br. Lehrb. p. 65. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 123. n. 1. — K. u. Bl. n. 42. — Schl. Rev. I. p. 16. — Schl. Mus. Strig. p. 9. n. 2. — Degl. u. G. n. 53.

61. Strix nebulosa. L.

Nord-Amerika. — [Nach Ch. L. Brehm in Schweden und Norwegen vorkommend (?).]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 46. — Vieill. Ois. d'Am. t. 17. — Wils Am. Orn. t. 33. f. 2. — Gould. t. 46. —

2) Eier: Bäd. t. 73. f. 6. —

Br. Lehrb. p. 69. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 107. — IV. p. 280. — Bp. Consp. I. Gen. 123. n. 2. — Schl. Rev. II. p. 40. — Schl. Mus. Strig. p. 11. n. 2. —

Cab. J. 1858. p. 27. —

62. Strix flammea. L.

Ganz Europa. Algerien: Loche. — [Canaren.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 36. — N. V. D. t. 47. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 1. a b. — Bäd. t. 42. f. 7. —

L. S. XII. p. 133. n. 8. — M. u. W. I. p. 79. — Schinz p. 136. n. 2. — Br. Lehrb. p. 72. — Bp. Consp. I. Gen. 125. n. 11. — K. u. Bl. n. 40. — Schl. Rev. I. p. 15. — II. p. 39. — Schl. Mus. Strig. p. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 59. — N. V. D. I. p. 483. — Hartl. W. Afr. n. 52. — Degl. u. G. n. 54. Br. Thierl. III. p. 621. — Heugl. N. O. Afr. n. 89. —

63. Otus vulgaris. Flem.

Ganz Europa. — [Egypten. Algerien. Canaren. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 29. — Gould. t. 39. — N. V. D. t. 45. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 8. a b. — Bäd. t. 49. f. 6. —

L. S. XII. p. 132. n. 4. — Cuv. Règne an. I. p. 341. — Flem. Phil. Zool. II. p. 236. — Pall. Zoogr. I. p. 307. n. 2. — M. u. W. I. p. 72. — Schinz p. 140. n. 1. — Br. Lehrb. p. 78. — Bp. Consp. I. Gen. 119. n. 1. — K. u. Bl. n. 45. — Schl. Rev. I. p. 14. — II. p. 38. — Schl. Mus. Oti. p. 1. — N. V. D. I. p. 451. — Degl. u. G. n. 56. — Br. Thierl. III. p. 612. — Heugl. N. O. Afr. n. 72. —

64. Otus brachyotus. Boie.

Ganz Europa. — [Asien. Nord-Afrika. Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 40. — N. V. D. t. 45. f. 2. —

2) Eier; Thien. t. 43. f. 7. a b. — Bäd. t. 42. f. 8. —

Gm. L. S. p. 289. — Cuv. Règne an. I. p. 341. — Pall. Zoogr. I. p. 309. n. 3. — p. 322. n. 10. — M. u. W. I. p. 73. — Schinz p. 139. — Br. Lehrb. p. 79. — Bp. Consp. I. Gen. 120. n. 1. — K. u. Bl. n. 46. — Schl. Rev. I. p. 14. — Schl. Mus. Oti. p. 3. — Rüpp. S. Ueb. n. 56. — N. V. D. I. p. 459. — Degl. G. n. 55. — Brl. Thierl. III. p. 613. — Heugl. N. O. Afr. n. 74. —

65. Bubo maximus. Sibb.

Gebirge ganz Europa's. Sibirien. Klein-Asien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 37. — N. V. D. t. 44. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 9. a—d. — Bäd. t. 49. f. 4. — f. 5. = B. sibiricus. —

L. S. XII. p. 131. n. 1. — M. u. W. I. p. 70. — Schinz p. 139. — Br. Lehrb. p. 76. — Bp. Consp. I. Gen. 118. n. 3. — K. u. Bl. n. 52. — Schl. Rev. I. p. 13. — II. p. 37. — Schl. Mus. Oti. p. 7. — N. V. D. I. p. 440. — Degl. u. G. n. 58. — Br. Thierl. III. p. 606. — Heugl. N. O. Afr. n. 76. —

66. Bubo ascalaphus. Savig.

Nord-Ost-Afrika. — [Soll öfter in Süd-Europa vorgekommen sein. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 57. — Gould. t. 38. — Savig. Descr. de l'Eg. t. 3. f. 2. —

2) Eier:

Temm Man. III. p. 52. — Cuv. Règne an. I. p. 341. — Savig. Descr. de l'Eg. XXIII. p. 295. — Schinz p. 138. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 117. — K. u. Bl. n. 53. — Schl. Rev. I. p. 13. — Schl. Mus. Oti. p. 8. n. 1. — Degl. u. G. n. 57. — Br. Thierl. III. p. 606. — Heugl. N. O. Afr. n. 78. — Cab. Journ. 1863. p. 265. — 1864. p. 328. —

67. Ephialtes scops. K. u. Bl.

Süd-Europa. Nördlich bis Steiermark. Algerien: (Loche). —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 436. — Gould. t. 41. — N. V. D. t. 43. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 43. f. 6. a b. — Bäd. t. 49. f. 7.

L. S. XII. p. 132. n. 5. — Ray. Av. p. 25. n. 3. — Savig. Descr. de l'Eg. XXIII. p. 291. — M. u. W. I. p. 74. — Schinz p. 140. n. 2. — Br. Lehrb. p. 80. — Bp. Consp. I. Gen. 116. n. 15. — Rüpp. S. Ueb. n. 52. — K. u. Bl. n. 54. — Schl. Rev. I. p. 14. — II. p. 38. — Schl. Mus. Oti. p. 19. n. 2. — N. V. D. I. p. 466. — Degl. u. G. n. 59. — Br. Thierl. III. p. 615. — Heugl. N. O. Afr. n. 82. —

68. Ephialtes asio. Gray.

Nord-Amerika. — [Soll in England geschossen worden sein.] —

Abbild. Vogel: Audub. B. Am. t. 97. — Temm. pl. col. 80. — Wils. Am. Orn. t. 19. f. 1. — t. 42. f. 1.

Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 99. — Bp. Consp. I. Gen. 116. n. 1. — Schl. Mus. Ot. p. 26. —

II. HIANTES.

69. Caprimulgus europaeus. L.

Mittel-Europa. — Nördlich bis Skandinavien. Maroko: Drake. — [Sibirien. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 193. — Gould. t. 51. — N. V. D. t. 148.
2) Eier: Thien. t. 42. f. 15. a b c. — Bäd. t. 50. f. 8.

L. S. XII. p. 346. n. 1. — M. u. W. I. p. 284. — Schinz p. 256. n. 1. Br. Lehrb. p. 401. — Bp. Consp. I. Gen. 134. n. 1. — K. u. Bl. n. 57. — Schl. Rev. I. p. 20. — Mus. Hein. III. n. 200. — N. V. D. VI. p. 141. — Rüpp. S. Ueb. n. 60. — Degl. u. G. n. 283. — Br. Thierl. III. p. 665. — Heugl. N. O. Afr. n. 90. —

70. Caprimulgus ruficollis. Temm.

Spanien. Portugal. Nord-Amerika. In Europa zuerst von Natterer entdeckt. — [Süd-Frankreich.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 52. —
2) Eier: Thien. t. 42. f. 16. — Bäd. t. 50. f. 9. —

Temm. Man. I. p. 438. — Schinz p. 256. n. 2. — Br. Lehrb. p. 406. — Bp. Consp. I. Gen. 134. n. 2. — K. u. Bl. n. 58. — Mus. Hein. III. n. 201. Schl. Rev. I. p. 20. — Degl. u. G. n. 284. —

Cab. Journ. 1855. p. 1. 1868. p. 365. —

71. Caprimulgus climacurus. Vieill.

Nord-Ost- und West-Afrika. — [Soll sich nach Schinz und Roux nach Süd-Frankreich verflogen haben.]

Abbild. 1) Vogel: Vieill. Gal. t. 122. —
2) Eier: Thien. t. 42. f. 19. —

Vieill. Gall. des Ois. I. p. 194. — Roux. Orn. prov. I. p. 239. — Schinz p. 257. — Bp. Consp. I. Gen. 140. n. 1. — K. u. Bl. n. 59. — Schl. Rev. II. p. 43. — Mus. Hein. III. n. 206. — Rüpp. S. Ueb. n. 66. — Hartl. W. Afr. n. 58. — Br. Thierl. III. p. 666. — Heugl. N. O. Afr. n. 98. —

N. 1857. p. 111. — Cab. Journ. 1853. p. 452. — Extrh. p. 95. — 1855. p. 2. — 1864. p. 245. — 1866. p. 195. — 1867. p. 297. — 1868. p. 377. —

72. Cypselus melba. Ill.

Ganz Süd-Europa und die Schweiz. Nord-Afrika. West-Asien.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 53. f. 2. — N. V. D. t. 147. f. 1. —
2) Eier: Thien. t. 42. f. 10. a b c. — Bäd. t. 50. f. 1.

L. S. XII. p. 345. n. 11. — Illig. Prodr. p. 320. — M. u. W. I. p. 282. — Schinz p. 254. — Br. Lehrb. p. 399. — Bp. Consp. I. Gen. 145. n. 1. —

K. u. Bl. n. 55. — Schl. Rev. I. p. 20. — Mus. Hein. III. n. 190. — N. V. D. VI. p. 115. — Degl. u. G. n. 282. — Br. Thierl. III. p. 658. — Heugl. N. O. Afr. n. 101. —

Cab. Journ. 1867. p. 116. —

73. Cypselus apus. Ill.

Ganz Europa mit Ausschluss des äussersten Nordens. Algerien: Loche. — [Canaren. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 542. f. 1. — Gould. t. 53. f. 1. — N. V. D. t. 147. f. 2. —

2) Eier: Thien t. 42. f. 9. ab. — Bäd. t. 50. f. 2.

L. S. XII. p. 344. n. 6. — Ill. Prodr. p. 230. — M. u. W. I. p. 281. — Schinz p. 255. — Br. Lehrb. p. 400. — Bp. Consp. I. Gen. 145. n. 2. — K. u. Bl. n. 56. — Schl. Rev. I. p. 19. — Rüpp. S. Ueb. n. 68. — Mus. Hein. III. n. 191. — N. V. D. IV. p. 123. — Degl. u. G. n. 281. — Br. Thierl. III. p. 655. — Heugl. N. O. Afr. n. 103. —

74. Hirundo riparia. L.

Ganz Europa. Nord-Afrika. — [Nord-Amerika: Heuglin. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 345. f. 2. — Gould. t. 58. — N. V. D. t. 146. f. 1. — f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 42. f. 2. abc. — Bäd. t. 52. f. 15.

L. S. XII. p. 344. n. 4. — M. u. W. I. p. 278. — Schinz p. 253. n. 1. — Br. Lehrb. p. 394. — Bp. Consp. I. Gen. 732. n. 8. — K. u. Bl. n. 263. — Schl. Rev. I. p. 19. — Mus. Hein. I. p. 304. — Rüpp. S. Ueb. n. 78. — N. V. D. VI. p. 100. — Degl. u. G. n. 279. — Br. Thierl. III. p. 639. — Heugl. N. O. Afr. n. 126. —

75. Hirundo rufula. Temm.

Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. — [Nord-Afrika.]

Zuerst von Schrader (im Juli 1853 in Griechenland) brütend beobachtet.

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 383. f. 3. — f. 4. = H. alpestris Pall.

2) Eier: Bäd. t. 52. f. 18. — Cab. Journ. 1857. t. 1. = Nest. —

Temm. Man. III. p. 298. — Pall. Zoogr. I. p. 534. n. 155. — Schinz p. 252. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 730. n. 12. — N. V. D. XIII. p. 209. — K. u. Bl. n. 261. — Schl. Rev. I. p. 18. — II. p. 41. — Degl. u. G. n. 276. — Heugl. N. O. Afr. n. 117. —

N. 1855. p. 472. — Cab. Journ. 1853. p. 451. — 1854. p. 174. — 1857. p. 116. — 1860. p. 271. —

76. Hirundo purpurea. L.

Nord-Amerika. — [Soll sich einige Male nach Europa (England) verirrt haben.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 722. — Wils. Am. Orn. t. 39. f. 1. — f. 2. — Gray. Gen. B. det. t. 19. — t. 20. f. 8. —

2) Eier: Bäd. t. 52. f. 19. —

Bp. Consp. I. Gen. 728. n. 1. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 32. — Mus. Hein. I. n. 312. — Degl. u. G. n. 278. — Br. Thierl. III. p. 642. —

77. Hirundo urbica. L.

Ganz Europa. Algerien: Loche. Daurien: Dybowski. — [Canaren.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 542. f. 2. — Gould. t. 57. — N. V. D. t. 145. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 42. f. 3. abc. — Bäd. t. 52. f. 14.

L. S. XII. p. 344. n. 3. — Pall. Zoogr. I. p. 532. n. 156. — M. u. W. I. p. 277. — Schinz p. 252. n. 2. — Br. Lehrb. p. 393. — Bp. Consp. I. Gen. 773. n. 2. — K. u. Bl. n. 259. — Schl. Rev. I. p. 19. — Mus. Hein. I. n. 318. — N. V. D. VI. p. 75. — Rüpp. S. Ueb. n. 80. — Degl. u. G. n. 277. — Br. Thierl. III. p. 635. — Heugl. N. O. Afr. n. 129. —

78. Hirundo rustica. L.

Europa, mit Ausschluss des höchsten Nordens. Algerien: Loche. Sahara: Tristram. — [Asien. Nord-Amerika. Canaren.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 543. f. 1. — Gould. t. 54. — N. V. D. t. 145. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 42. f. 11. a—e. — Bäd. t. 52. f. 17. —

L. S. XII. p. 343. n. 1. — Pall. Zoogr. I. p. 528. n. 155. — M. u. W. I. p. 276. — Schinz p. 252. n. 1. — Br. Lehrb. p. 392. — Bp. Consp. I. Gen. 730. n. 1. — K. u. Bl. n. 260. — Schl. Rev. I. p. 18. — N. V. D. VI. p. 49. — Hartl. W. Afr. n. 68. — Rüpp. S. Ueb. n. 70. — Mus. Hein. I. n. 285. — Degl. u. G. n. 275. — Br. Thierl. III. p. 629. — Heugl. N. O. Afr. n. 111. —

Cab. Journ. 1856. p. 366. —

79. Var. Hirundo cahirica. Licht.

Nord-Afrika, besonders Egypten. — [Soll in der Schweiz erlegt worden sein: Gaillard.]

Abbild. Vogel: N. V. D. t. 383. f. 1. —

Licht. Cat. 1823. p. 58. — Temm. Man. III. p. 652. — Pall. Zoogr. I. p. 329. — p. 531.? — Schinz p. 434. — Bp. Consp. I. Gen. 730. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 18. — II. p. 41. — Hartl. W. Afr. n. 70. — Rüpp. S. Ueb. n. 71. — Mus. Hein. I. n. 287. — N. V. D. XIII. p. 207. — Degl. u. G. n. 275. A. — Br. Thierl. III. p. 629. — Heugl. N. O. Afr. n. 112. —

N. 1858. p. 254. — Cab. Journ. 1853. p. 452. — Extrh. p. 96. — 1855. p. 4. — 1859. p. 200. — 1860. p. 281. — 1861. p. 103. — p. 420. — 1866. p. 199.

80. Hirundo rupestris. Scop.

Portugal. Spanien. Italien. Süd-Frankreich. Griechenland. Nördlich bis zur Schweiz. Nord-Afrika. — [Türkei.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. 56. — N. V. D. t. 146. f. 1. — f. 2. —
2) Eier: Bäd. t. 52. f. 16. —

Scopoli Ann. I. p. 167. n. 253. — Gm. L. S. p. 1019. n. 20. — p. 1020. n. 21. M. u. W. I. p. 279. — Schinz p. 253. n. 2. — Br. Lehrb. p. 395. — Bp. Consp. I. Gen. 732. n. 1. — K. u. Bl. n. 262. — Schl. Rev. I. p. 19. — Mus. Hein. I. n. 310. — N. V. D. VI. p. 91. — XIII. p. 214. — Degl. u. G. n. 280. Br. Thierl. III. p. 658. — Heugl. N. O. Afr. n. 122. —

N. 1857. H. I. p. 77. — Cab. Journ. 1853. p. 452. — 1860. p. 282. —

III. SCANSORES.

81. Picus viridis. L.

Europa. Nördlich bis Lappland. — [Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 226. — N. V. D. t. 132. — f. 1. f. 2. — Ribb. n. 4131. — 33. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 14. ab. — Bäd. t. 11. f. 1. —

L. S. XII. p. 175. n. 12. — M. u. W. I. p. 118. — Schinz p. 260. n. 2. — Br. Lehrb. p. 134. — Bp. Consp. I. Gen. 261. n. 1. — K. u. Bl. n. 64. — Schl. Rev. I. p. 49. — N. V. D. V. p. 270. — Degl. u. G. n. 86. — Br. Thierl. IV. p. 77. —

82. Picus canus. Gm.

Mittel-Europa. Häufig in Steiermark. Galizien. Kiew.

Abbild. 1) Vogel: Gould t. 227. — N. V. D. t. 133. f. 1. — f. 2. — Rchb. n. 4135. — 36. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 15. — Bäd. t. 11. f. 2. —

Gm. L. S. p. 434. n. 45. — Pall. Zoogr. I. p. 408. n. 63. — M. u. W. I. p. 120. — Schinz p. 261. n. 1. — Br. Lehrb. p. 135. — N. V. D. V. p. 286. — K. u. Bl. n. 65. — Schl. Rev. I. p. 49. — Bp. Consp. I. Gen. 261. n. 2. — Degl. u. G. n. 67. —

83. Picus martius. L.

Schweden. Pommern, häufig. Anhalt. Steiermark. Schweiz. Böhmen: Fritsch. Galizien. Daurien: Dybowski.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 225. — N. V. D. t. 131. f. 1—2. — Rchb. n. 4309—11. —

2) Eier: Thien. t. 13 f. 13. — Bäd. t. 11. f. 3. —

L. S. XII. p. 173. n. 1. — M. u. W. I. p. 117. — Schinz p. 260. n. 1. — Briss. Orn. IV. p. 21. n. 6. — Lath. Ind. Orn. I. p. 224. n. 1. — Temm. Man. I. p. 236. — Cuv. Règne an. I. p. 422. — Br. Lehrb. p. 133. — Bp. Consp. I. Gen. 267. n. 1. — K. u. Bl. n. 66. — Malh. Picid. I. p. 32. — Schl. Rev. I. p. 49. — Mus. Hein. IV. n. 230. — N. V. D. V. p. 253. — Degl. u. G. n. 60. — Br. Thierl. IV. p. 60. —

84. Picus leuconotus. Bechst.

Schweden. Norwegen. Sibirien. — [Schlesien, häufig. Böhmen. Mähren. Galizien. Macedonien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 228. — N. V. D. t. 135. f. 1—2. — Rchb. n. 4217—18. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 8. — Bäd. t. 11. f. 7. —

Bechst. Orn. Tasch. I. p. 66. n. 6. — Bechst. N. V. D. II. p. 1034. — Malh. Picid. I. p. 89. — M. u. W. I. p. 123. — Schinz p. 262. n. 1. — Br. Lehrb. p. 138. — N. V. D. V. p. 313. — Bp. Consp. I. Gen. 268. n. 4. — K. u. Bl. n. 67. — Schl. Rev. I. p. 49. — Mus. Hein. IV. n. 197. — Degl. u. G. n. 62.

85. Picus major. L.

Ganz Europa. Sibirien.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 229. — N. V. D. t. 134. f. 1—2. — Rchb. n. 4210—11. — n. 4222 (juv.). — n. 4212. = P. brevirostris Rchb.

2) Eier: Thien. t. 13. f. 4. — Bäd. t. 13. f. 9. —

L. S. XII. p. 176. n. 17. — Lath. Ind. Orn. I. p. 228. n. 13. — Temm. Man. I. p. 240. — Cuv. Règne an. I. p. 240. — Pall. Zoogr. I. p. 412. n. 65. — M. u. W. I. p. 121. — Schinz p. 261. n. 2. — Br. Lehrb. p. 137. — Bp. Consp. I. Gen. 268. n. 1. — N. V. D. V. p. 298. — K. u. Bl. n. 68. — Schl. Rev. I. p. 50. — Mus. Hein. IV. n. 192. — Degl. u. G. n. 61. — Br. Thierl. IV. p. 72. —

86. A. Picus numidicus. Malh.

Afrika. — [Soll in Spanien vorkommen. — Im Jahre 1861 im Münsterlande erlegt: Altum.]

Abbild. Vogel: Malh. Picid. t. 18. f. 1—4. — Rchb. n. 4213—14. —

Malh. Picid. I. p. 65. — Bp. Consp. I. Gen. 268. n. 5. — Mus. Hein. IV. n. 194. — Gray Gen. B. II. p. 435. n. 5. — Malh. Rev. Zool. 1845. p. 375. — Cab. Journ. 1857. p. 320. — 1862. p. 383. —

86. B. Picus syriacus. Hempr. u. Ehr.

Klein-Asien. Palästina. — [Das Vorkommen in Europa ist noch zweifelhaft.]

Abbild. Vogel: Rchb. f. 4269—70. — Malh. Picid. I. t. 20. f. 4—5. — N. 1856. t. 4. f. 1—3.

Hempr. u. Ehr. Symb. Phys. Av. I. Decemb. — Malh. Picid. I. p. 95. — Bp. Consp. I. Gen. 268. Anmerk. nach n. 5. — Mus. Hein. IV. b. p. 42. Anmerk. 3. — Gray. Gen. B. III. append. p. 21. —

N. 1856. p. 411. —

87. Picus medius. L.

Gemässigtes Europa. Am häufigsten in Steiermark. — [Im Winter auch in Macedonien. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 230. — N. V. D. t. 136. f. 1—2. — Rchb. n. 4221. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 10. — Bäd. t. 11. f. 5. —

L. S. XII. p. 176. n. 18. — Cuv. Règne an. I. p. 422. — Lath. Ind. Orn. I. p. 229. n. 14. — Malh. Picid. I. p. 93. — Pall. Zoogr. I. p. 412. n. 65. — M. u. W. I. p. 122. — Br. Lehrb. p. 139. — Schinz. p. 262. n. 2. —

N. V. D. V. p. 320. — Bp. Consp. I. Gen. 228. n. 2. — K. u. Bl. n. 69. — Schl. Rev. I. p. 50. — Mus. Hein. IV. n. 198. — Degl. u. G. n. 63. — Br. Thierl. IV. p. 74. —

88. Picus minor. L.

Ganz Europa. Häufig in Mähren. Daurien: Dybowski.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 231. — N. V. D. t. 136. f. 3—4. — Rchb. n. 4231—35. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 12. ab. — Bäd. t. 11. f. 6. —

L. S. XII. p. 176. n. 19. — Lath. Ind. Orn. I. p. 229. n. 15. — Temm. Man. I. p. 243. — Cuv. Règne an. I. p. 422. — Pall. Zoogr. I. p. 414. n. 67. — M. u. W. I. p. 124. — Schinz p. 263. n. 1. — Malh. Picid. I. p. 113. — Briss. Orn. IV. p. 41. — Koch Baier. Zool. I. p. 73. n. 6. — Br. Lehrb. p. 141. — Bp. Consp. I. Gen. 268. n. 3. — K. u. Bl. n. 70. — Schl. Rev. I. p. 50. — N. V. D. V. p. 334. — Mus. Hein. IV. n. 205. — Degl. u. G. n. 64. — Br. Thierl. IV. p. 74. —

89. Picus villosus. L.

Nord-Amerika. — [Soll in England geschossen worden sein.]

Abbild. Vogel: Vieill. Ois. Am. t. 120. — Audub. B. Am. t. 416. f. 1—2. — Buff. pl. enl. 754. — Wils Am. Orn. t. 9. f. 1. — Malh. Picid. I. t. 21. — Rchb. n. 4203. —

L. S. XII. p. 175. n. 16. — Lath. Ind. Orn. I. p. 232. n. 19. — Wils. Am. Orn. I. p. 150. — Briss. Orn. IV. p. 48. n. 17. — Gray. Gen. B. II. 435. n. 25. — Temm. Man. I. p. 685. — Bp. Consp. I. Gen. 268. n. 24. — Malh. Picid. I. p. 75. — Mus. Hein. IV. n. 209. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 159. Cab. Journ. 1858. p. 353. —

90. Picus tridactylus. L.

Schweden. Norwegen. Mähren. — [Schweiz. Böhmen. Galizien. Sibirien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 232. — N. V. D. t. 137. f. 1—2. — Rchb. n. 4195—96 = P. septentrionalis. — n. 4199—4200 = P. alpinus. — n. 4201—2 = P. montanus. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 11. — Bäd. t. 11. f. 8. —

L. S. XII. p. 177. n. 21. — M. u. W. I. p. 125. — Schinz p. 263. n. 2. — Lath. Ind. Orn. I. p. 243. n. 56. = Temm. Man. I. p. 246. — Cuv. Règne an. I. p. 423. — Malh. Picid. I. p. 170. — Br. Lehrb. p. 142. — N. V. D. V. p. 346. — Bp. Consp. I. Gen. 270. n. 1. — Koch. Baier. Zool. I. p. 74. n. 7. — K. u. Bl. n. 71. — Schl. Rev. I. p. 50. — Mus. Hein. IV. n. 190. — Degl. u. G. n. 65. — Br. Thierl. IV. p. 76. —

91. Iijnx torquilla. L.

Ganz Europa. Im Süden selten. — [Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 233. — N. V. D. t. 138. f. 1—2. — Rchb. n. 4125—26. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 6. — Bäd. t. 50. f. 7. —

L. S. XII. p. 172. n. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 223. n. 1. — M. u. W. I.

p. 127. — Schinz p. 264. — Temm. Man. I. p. 403. — Br. Lehrb. p. 145. — N. V. D. V. p. 336. — Bp. Consp. I. Gen. 248. n. 1. — K. u. Bl. n. 63. — Schl. Rev. I. p. 50. — Rüpp. S. Ueb. n. 347. — Mus. Hein. IV. n. 176. — Degl. u. G. n. 68. — Br. Thierl. IV. p. 89. —

92. Cuculus canorus. L.

Ganz Europa. — [Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 811. — Gould. t. 240. — N. V. D. t. 127. — t. 128. — t. 129. —

2) Eier: Thien. t. 15. f. 1. a—e. Unkenntlich. — Bäd. t. 50. f. 5. Gut. — N. 1854. t. V. Gut. —

L. S. XII. p. 168. n. 1. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 84. = C. rufus. — Briss. Orn. IV. p. 105. n. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 207. n. 1. — Cuv. Règne an. I. p. 424. — Temm. Man. I. p. 381. — Pall. Zoogr. I. p. 442. n. 84. — M. u. W. I. p. 110. — Schinz. p. 258. n. 1. — Br. Lehrb. p. 124. — N. V. D. V. p. 196. — Bp. Consp. I. Gen. 237. n. 1. — K. u. Bl. n. 60. — Schl. Rev. I. p. 51. — Hartl. W. Afr. n. 752. — Rüpp. S. Ueb. n. 356. — Schl. Mus. Cuc. p. 4. — Mus. Hein. IV. n. 25. — Degl. u. G. n. 69. — Br. Thierl. IV. p. 194. —

N. 1853. p. 307. — Cab. Journ. 1858. p. 205. — p. 285. — 1866. p. 165. — p. 172. — 1871. p. 225. —

93. Cuculus glandarius. L.

Portugal. Spanien. Klein-Asien. Egypten. Nubien. Arabien. — [Sicilien. Bis Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 414. — Gould. t. 241. — N. V. D. t. 130.

2) Eier: Bäd. t. 50. f. 4. — Cab. Journ. 1353. t. V. f. 4. Gut. — 1854. t. III. f. 3. Unkenntlich. —

L. S. XII. p. 169. n. 5. — Lath. Ind. Orn. I. p. 207. n. 3. — Temm. Man. II. p. 120. — Briss. Orn. IV. p. 126. n. 10. — Schinz p. 258. n. 2. — Br. Lehrb. p. 128. — p. 129. — p. 982. — Bp. Consp. I. Gen. 236. n. 1. N. V. D. V. p. 237. — XIII. p. 199. — K. u. Bl. n. 61. — Schl. Rev. I. p. 51. — Mus. Hein. IV. n. 34. — Schl. Mus. Cuc. p. 44. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 554. — Rüpp. S. Ueb. n. 354. — Degl. u. G. n. 70. — Br. Thierl. IV. p. 200. —

Cab. Journ. 1853. p. 144. — Extrh. p. 117. — 1859. p. 238. — 1861. p. 392. — 1862. p. 34. —

94. Coccystes americanus. K. u. Bl.

Nord-Amerika. — [Wurde einmal in England erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 816. — Wils. Am. Orn. t. 28. f. 1. — Gould t. 242. — Gray. Gen. B. dét. t. 115. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 15. f. 6. — Bäd. t. 50. f. 6. —

L. S. XII. p. 170. n. 10. — Briss. Orn. IV. n. 110. n. 2. — Temm. Man. III. p. 277. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 128. — Schinz p. 259. — Lath. Ind. Orn. I. p. 219. n. 39. — p. 221. n. 44. — Bp. Consp. I. Gen. 247. u. 1.

— K. u. Bl. n. 62. — Schl. Rev. I. p. 51. — Schl. Mus. Cuc. p. 37. n. 2. — Mus. Hein. IV. n. 61. — Degl. u. G. n. 71. — Br. Thierl. IV. p. 211. — Cab. Journ. n. 1854. p. 223. — p. 419. — 1862. p. 167. —

95. Coccystes erythrophthalmus. Glog.

Nord-Amerika. — [Wird als in Lucca (Italien) vorgekommen, von einigen Schriftstellern aufgeführt.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 28. f. 2. — Wils. Am. Orn. t. 2) Eier: Thien t. 15. f. 7. — Bäd. t. 76. f. 7. —

Wils. Am. Orn. IV. p. 16. — Gray. Gen. B. II. p. 457. n. 2. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 131. — Bp. Consp. I. Gen. 247. n. 2. — Mus. Hein. IV. p. 76. Anmerk. — Schl. Mus. Cuc. p. 37. n. 1. — Cab. Journ. 1854. p. 224. — p. 419. — 1856. p. 104. — p. 129. —

96. Coracias garrula. L.

Schweden. Pommern. Anhalt. Steiermark. Böhmen. Mähren. Galizien. Macedonien. Kiew. An der Wolga. Klein-Asien. — [Ganz Europa. Asien. Afrika.]

Abbild 1) Vogel: Gould. t. 60. — N. V. D. t. 60. — Rchb. n. 3179—80. 2) Eier: Thien. t. 41. f. 9 a b c. — Bäd. t. 11. f. 12. —

L. S. XII. p. 159. n. 1. — M. u. W. I. p. 106. — Schinz p. 149. n. 2. — Gray. Gen. B. I. p. 62. n. 1. — Br. Lehrb. p. 112. — Bp. Consp. I. Gen. 318. n. 1. — N. V. D. II. p. 158. — K. u. Bl. n. 76. — Schl. Rev. I. p. 56. — Rüpp. S. Ueb. n. 83. — Hartl. W. Afr. n. 79. — Mus. Hein. II. n. 355. — Degl. u. G. n. 72. — Br. Thierl. IV. p. 148. — Heugl. N. O. Afr. n. 132 — Cab. Journ. 1853. p. 454. —

97. Alcedo ispida. L.

Ganz Europa. — [Nord-Afrika. Canaren. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 61. — N. V. D. t. 144. — Rchb. n. 3038—42. — n. 3043—46. — n. 3401—3. —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 2. — Bäd. t. 11. f. 9. —

L. S. XII. p. 179. n. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p. 252. n. 20. — Pall. Zoogr. I. p 437. — Gray. Gen. B. I. p. 81. n. 1. — M. u. W. I. p. 134. — Schinz p. 272. n. 1. — Br. Lehrb. p. 120. — Bp. Consp. I. Gen. 307. n. 2. — N. V. D. V. p. 480. — K. u. Bl. n. 73. — Rüpp. S. Ueb. n. 91. — Mus. Hein. II. n. 411. — Schl. Mus. Alced. p. 6. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 52. — Degl. u. G. n. 75. — Br. Thierl. IV. p. 161. — Heugl. N. O. Afr. n. 137. —

98. Alcedo smyrnensis. L.

Klein-Asien. Syrien. — [Einmal an der Ems vorgekommen: Altum.]

Abbild. Vogel: Buff. pl. enl. 232. — 894. —

L. S. XII. p. 181. n. 11. — Gray. Gen. B. I. p. 79. n. 11. — Bp. Consp. I. Gen. 301. n. 24. — Mus. Hein. II. p. 155. Anmerk. — Schl. Mus. Alced. p. 28. n. 1. —

99. Alcedo rudis. L.

Afrika, besonders in den Nilländern. — [Hat sich schon öfter nach Europa (Dalmatien, Griechenland) verflogen. West-Asien.] —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 62. — pl. 716. — Gould. t. 62. Rchb. n. 3097. —

2) Eier: Bäd. t. 11. f. 10. —

Hasselq. It. p. 243. n. 22. — L. S. XII. p. 181. n. 12. — Schinz p. 272. n. 2. — Br. Lehrb. p. 121. — p. 982. — Bp. Consp. I. Gen. 308. n. 1. — K. u. Bl. n. 72. — Schl. Rev. I. p. 52. — Schl. Mus. Alced. p. 2. n. 2. — Mus. Hein. II. n. 423. — Rüpp. S. Ueb. n. 89. — Hartl. W. Afr. n. 103. — Degl. u. G. n. 76. — Br. Thierl. IV. p. 166. — Heugl. N. O. Afr. n. 144. —

Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 96. — 1855. p. 9. —

100. Alcedo alcyon. L.

Nord-Amerika. — [Einmal in Irland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 715. — Wils. Am. Orn. t. 23. f. 1. — Rchb. n. 3108—9. —

2) Eier: Bäd. t. 11. f. 11. —

L. S. XII. p. 180. n. 7. — Wils. Am. Orn. III. p. 59. — Gray. Gen. B. I. p. 82. n. 3. — Bp. Consp. I. Gen. 308. n. 4. — Mus. Hein. II. n. 430. — Schl. Mus. Alced. p. 4. n. 2. — Degl. u. G. n. 77. —

101. Merops apiaster. L.

Süd-Europa. Algerien: Loche. Klein-Asien. — [Hat sich schon bis Nord-Deutschland, Dänemark und Finnland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 59. — N. V. D. t. 143. f. 1—2. — Rchb. n. 3220. — n. 3221—22 (juv.). —

2) Eier: Thien. t. 13. f. 4. — Bäd. t. 11 f. 13. —

L. S. XII. p. 182. n. 1. — M. u. W. I. p. 132. — Schinz p. 270. — Br. Lehrb. p. 117. — N. V. D. V. p. 462. — Bp. Consp. I. Gen. 309. n. 1. — K. u. Bl. n. 75. — Schl. Rev. I. p. 52. — Schl. Mus. Merop. p. 4. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 106. — Rüpp. S. Ueb. n. 95. — Mus. Hein. II. n. 406. — Br. Thierl. IV. p. 138. — Heugl. N. O. Afr. n. 153. —

102. Merops persica. Pall.

Nord-Afrika. Madagascar: Newton. Süd-Ost-Asien. — [Einige Male zufällig in Süd-Europa vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. t. 6. — Rchb. n. 3225 26. — n. 3545—46. —

2) Eier: Bäd. t. 76. f. 6. —

Pall. It. II. app. p. 708. n. 16. — Pall. Zoogr. I. p. 440. n. 82. — Gm. L. S. p. 461. n. 4. — Schinz. p. 271. — Bp. Consp. I. Gen. 309. — n. 2—5. — K. u. Bl. n. 74. — Schl. Rev. I. p. 53. — Schl. Mus. Merop. p. 6. n. 1. — Mus. Hein. II. n. 404. — Hartl. W. Afr. n. 107. — Rüpp. S. Ueb. n. 96. — Heugl. N. O. Afr. n. 154.— Br. Thierl. IV. p. 139. — Degl. u. G. n. 74.

Cab. Journ. 1853. p. 291. — p. 455. — 1855. p. 9. — 1856. p. 398. — 1863. p. 236. — 1864. p. 334. — 1866. p. 202. — 1867. — p. 239. —

103. Upupa epops. L.

Süd- und Mittel-Europa. Canaren. Egypten und Nubien häufig: v. Heuglin. Algerien: Loche. Daurien: Dybowski.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 238. — N. V. D. t. 142. — Rchb. n. 4032 34.

2) Eier: Thien t. 15. f. 10. a b c. Nicht wie auf der Tafel angegeben: f. 12. a b c! — Bäd. t. 50. f. 3. —

L. S. XII. p. 183. n. 1. — Pall. Zoogr. I. p. 433. n. 78. — M. u. W. I. p. 114. — Schinz p. 269. — Br. Lehrb. p. 159. — N. V. D. V. p. 435. — Bp. Consp. I. Gen. 210. n. 1. — K. u. Bl. n. 77. — Schl. Rev. I. p. 52. — Mus. Hein. II. n. 378. — Rüpp. S. Ueb. n. 102. — Degl. u. G. n. 84 — Br. Thierl. IV. p. 22. — Heugl. N. O. Afr. n. 164. —

104. Certhia familiaris. L.

Ganz Europa. — [Sibirien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 631. f. 1. — Gould. t. 237. — N. V. D t. 140. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 17. f. 10 a b c. — Bäd. t. 43. f. 2 = C. familiaris. — f. 3 = C. brachydactyla. — f. 4. = C. costae. —

L. S. XII. p. 184. n. 1. — Pall. Zoogr. I. p. 432. n. 77. — M. u. W. I. p. 130. — Schinz p. 268. n. 1. — Br. Lehrb. p. 151. — N. V. D. V. p. 398. — XIII. p. 202. = C. brachydactyla. — Bp. Consp. I. Gen. 478. n. 1—2 — K. u. Bl. n. 162. — Schl. Rev. I. p. 47. — II. p. 73. — Mus. Hein. I. n. 518. Degl. u. G. n. 81. — n. 82 = C. brachydactyla. — Br. Thierl. IV. p. 53. —

N. 1856. p. 440. —

105. Tichodroma muraria. Ill.

Süd-Europäische Felsengebirge, nördlich bis zu den Alpen. — [Hat sich öfter bis Mittel-Deutschland verflogen. Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 372. — Gould. t. 239. — Rchb. n. 4075—76. n. 3845—46. — N. V. D. t. 141. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 17. f. 9. Faslch. — Bäd. t. 43. f. 5. Gut. — Cab. Journ. 1856. t. 1. f. 11. —

L. S. XII. p. 184. n. 2. — Ill., Prodr. p. 211. — Temm. Man. I. p. 412. — M. u. W. I. p. 131. — Schinz p. 268. n. 2. — Br. Lehrb. p. 156. — N. V. D. V. p. 421. — XIII. p. 206. — Bp. Consp. I. Gen. 481. n. 1. — K. u. Bl. n. 163 — Schl. Rev. I. p. 47. — Rüpp. S. Ueb. n. 114. — Degl. u. G. n. 83. — Br. Thierl. IV. p. 44. — Heugl. N. O. Afr. n. 186. —

Cab. Journ. 1855. p. 43. — Zool. Gart. 1868. p. 110. — 1869. p. 317.

106. Sitta caesia. M. u. W.

Ganz Europa mit Ausschluss des Nordens.

Abbild. 2) Vogel: Buff. pl. enl. 923. — Gould. t. 234. — N. V. D. t. 139. f. 1—2. — Rchb. n. 3546—47. —

2) Eier: Thien. t. 17. f. 16. a b. — Bäd. t. 43. f. 6. —

M. u. W. I. p. 228. — Br. Lehrb. p. 143. — N. V. D. V. p. 377. — Bp. Consp. I. Gen. 487. n. 2. — K. u. Bl. n. 143. excl. cit. — Schl. Rev. I. p. 48. excl. cit: L. S. XII. — Mus. H. I. n. 514. — Degl. u. G. n. 79. — Br. Thierl. IV. p. 37. —

N. 1856. p. 433. —

107. Var. Sitta uralensis. Licht.

Schweden. Sibirien.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 236. — Rchb. n. 3548. — n. 4041. — 4052. —
2) Eier: Bäd. t. 43. f. 7. — Die Eier sind von denen der S. caesia durchaus nicht zu unterscheiden! —

L. S. p. 177. n. 1. — Pall. Zoogr. I. p. 546. — p. 547. — Temm. Man. III. p. 645. — Bp. Consp. I. Gen. 487. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 48. — K. u. Bl. n. 144. — Degl. u. G. n. 78. —

108. Sitta syriaca. Ehrenb.

Griechenland. Macedonien. Klein-Asien, häufig.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 235. — Rchb. n. 3549—50.
2) Eier: Thien. t. 17. f. 15. a b. — Bäd. t. 43. f. 8. —

Ehrenb. Symb. phys. — Michah. Isis 1830 p. 814. — Temm. Man. III. p. 287. — Schinz p. 266. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 487. u. 3. — K. u. Bl. n. 142. — Schl. Rev. I. p. 48. — Mus. Hein. 1. n. 515. — Degl. u. G. n. 80. — Br. Thierl. IV. p. 42. —
Cab. Journ. 1861. p. 129. —

109. Sitta Krueperi. v Pelzeln.

Klein-Asien. Von Krüper 1863 entdeckt. — [Bis jetzt noch nicht in Europa beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Ibis 1865. t. 7. —
2) Eier:
Ibis 1865. p. 306. — Cab. Journ. 1866. p. 49. — 1871. Eier.

IV. OSCINES.

110. Parus major. L.

Ganz Europa. — [Mittel-Asien. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 3. f. 1. — Gould. t. 150. — N. V. D. t. 94. f. 1. —

2) Eier: Thien t. 18. f. 2. — Pall. Zoogr. I. p. 555.. n. 169. — M. u. W. I. p. 267. — Schinz p. 216. — Br. Lehrb. p. 259. — N. V. D. IV. p. 9. — K. u. Bl. n. 136. — Schl. Rev. I. p. 45. — Bp. Consp. I. Gen. 491. n. 16. — Mus. Hein. I. n. 506. — Degl. u. G. n. 258. — Br. Thierl. III. p. 931. —

111. Parus ater. L.

In allen Nadelwäldern Europa's. — [Sibirien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 155. f. 1. — N. V. D. t. 94. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 18. f. 2. abc. — Bäd. t. 43. f. 9. —

L. S. XII. p. 341. n. 7. — Pall. Zoogr. I. p. 556. n. 170. — M. u. W. I. p. 268. — Br. Lehrb. p. 260. — N. V.D. IV. p. 34. — Bp. Consp. I. Gen. 491. n. 17. — K. u. Bl. n. 137. — Schl. Rev. I. p. 46. — Mus. Hein. I. n. 508. — Degl. u. G. n. 259. —

112. Parus palustris. L.

Mittel-Europa. Im Norden durch P. borealis vertreten. In der Schweiz = Var. P. alpestris.

Abbild. 1) Vogel: Gould. 155. f. 2. — N. V. D. t. 94. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 18. f. 7. ab. — Bäd. t. 43. f. 13. —

L. S. XII. p. 341. n. 8. — M. u. W. I. p. 271. — Schinz p. 219. n. 1. — Br. Lehrb. p. 262. — N. V. D. IV. p. 51. — Bp. Consp. I. Gen. 493. n. 3. — K. u. Bl. n. 138. — Schl. Rev. I. p. 45. — Mus. Hein. I. n. 500. — Degl. u. G. n. 263. — Br. Thierl. III. p. 936.

113. Var. Parus borealis. Selys.

Schweden. Sibirien. — [Nord-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 3. f. 3. — N. V. D. t. 379. f. 2. — f. 3. = P. alpestris. Baill. —

2) Eier: Bäd. t. 43. f. 16. — f. 15 = P. alpestris. —

De Selys. Bullet. de l'Acad. de Bruxelles. X. p. 28. n. 7. — Bp. Consp. I. Gen. 493. n. 4. — n. 5. — N. V. D. XIII, p. 147. — Schl. Rev. II. p. 73. — Degl. u. G. n. 264. —

N. 1852. p. 2. — p. 101. — 1854. p. 141. — 1856. p. 161. —

114. Parus sibiricus. Gm.

Lappland. Nördliches Russland. Sibirien. = P. obtectus. Cab.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 708. f 3. — Gould. t. 151. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 18. f. 8. Unkenntlich! — Bäd. t. 76. f. 17. —

Gm. L. S. p. 1013. n. 24. — Pall. Zoogr. I. p. 558. — Temm. Man. III. p. 212. — Schinz p. 220. n. 1. — Br. Lehrb. p. 268. — Bp. Consp. I. Gen. 493. n. 1. — K. u. Bl. n. 139. — Schl. Rev. I. p. 45. — Mus. Hein. I. n. 503. — Degl. u. G. n. 265. —

115. Parus lugubris. Natt.

Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. — [Banat: Zelebor.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 151. f. 1. — N. V. D. t. 379. f. 1. —

2) Eier: Thien t. 18. f. 4. a b. Gut! — Bäd. t. 43. f. 14. Zu gross gefleckt. —

Temm. Man. I. p. 293. — III. p. 212. — Schinz p. 219. n. 2. — Br. Lehrb. p. 263. — Schl. Rev. I. p. 45. — Mus. Hein. I. n. 504. — Bp. Consp. I. Gen. 493. n. 2. — Degl. u. G. n. 266. — N. V. D. XIII. p. 152. —

116. Parus cristatus. L.

Fast in allen Nadelwäldern Mittel-Europas. Schweden.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 502. f. 2. — Gould. t. 156. — N. V. D. t. 94. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 18. f. 10. a b c. — Bäd. t. 43. f. 17. —

L. S. XII. p. 340. n. 2. — M. u. W. I. p. 270. — Schinz p. 218. n. 2. — Br. Lehrb. p. 261. n. 2. — N. V. D. VI. p. 42. — Bp. Cop. I. Gen. 490. . 2. — K. u. Bl. n. 140. — Schl. Rev. I. p. 46. — Mus. Hein. I. n. 499. — Degl. u. G. n. 262. — Br. Thierl. III. p. 930. —

117. Parus bicolor. L.

Nord-Amerika. — [Grönland. Nach Temminck oft in Schweden beobachtet. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 39. — Wils. Am. Orn. t. 8. f. 5. — Gould. t. 152. —

2) Eier: Thien. t. 18. f. 9.

L. S. XII. p. 340. n. 1. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 217. — Bp. Consp. I. Gen. 490. n. 1. — K. u. Bl. n. 141. — Schl. Rev. II. p. 72. — Mus. Hein. I. p 91. Anmerk. — Baird. u. Cass. p. 384. —

118. Parus coeruleus. L.

Ganz Europa. Klein-Asien.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 3. f. 2. — Gould. t. 154. — N. V. D. t. 95. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 18. f. 3. a b c. — Bäd. t. 43. f. 11. —

L. S. XII. p. 341. n. 5. — M. u. W. I. p. 269. — Schinz p. 217. n. 2. — Br. Lehrb. p. 267. — N. V. D. IV. p. 62. — Bp. Consp. I. Gen. 492. n. 1. — K. u. Bl. n. 135. — Schl. Rev. I. p. 46. — Mus. Hein. I. n. 498. — Degl. u. G. n. 260. — Br. Thierl. III. p. 934. —

119. Parus ultramarinus. Bp.

Nord-Afrika. — [Soll in Süd-Europa vorgekommen sein. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Gray. Gen. B. t. 52 — Sharpe u. Dresser t. ohne No.
2) Eier: Bäd. t. 43. f. 12. — Cab. Journ. 1856. t. 2. f. 14.
Bp. Rev. Zool. 1841. p. 146. — Bp. Consp. I. Gen. 492. n. 2. —
Cab. Journ. 1863. Extrh. p. 21. —

120. Parus cyaneus. Pall.

Sibirien. Russland. — [Polen. Wurde auch schon in Deutschland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 153. — N. V. D. t. 95. f. 3. —
2) Eier:
Pall. Nov. Comm. Petr. XIV. p. 588. — Pall. Zoogr. I. p. 552. n. 166. — M. u. W. I. p. 170. — Schinz. p. 218. n. 1. — Br. Lehrb. p. 266. — N. V. D. IV. p. 76. — Bp. Consp. I. Gen. 492. n. 3. — K. u. Bl. n. 134. — Schl. Rev. I. p. 46. — Degl. u. G. n. 261. — Br. Thierl. III. p. 936. —
Cab. Journ. 1871. p. 124. —

121. Panurus biarmicus. Koch.

Holland. Grossbritannien. Süd-Frankreich (Rhônemündungen): v. Müller. An der Wolga.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 618. f. 1—2. — Gould. t. 158. — N. V. D. t. 96. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 18 f. 12. a b. — Bäd. t. 43. f. 18. —
Briss. Orn. III. p. 567. n. 12. — L. S. XII. p. 312. n. 12. — Koch. Baier Zool. p. 202. — M. u. W. I. p. 273. — Schinz p. 221. n. 1. — Br. Lehrb. p. 270. — N. V. D. IV. p. 98. — Bp. Consp. I. Gen. 496. — K. u. Bl. n. 132. — Schl. Rev. I. p. 47. — Mus. Hein. I. n. 493. — Degl. u. G. n. 268. — Br. Thierl. III. p. 926. —

122. Aegithalus pendulinus. Boie.

Süd-Frankreich (Rhônemündungen): v. Müller. Ungarn. Walachei. Kiew: Göbel.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 618. f. 3. — 708. f. 1. — Gould. t. 159. — N. V. D. t. 97. f. 1—3. — Jard. u. Selby. Illustr. Orn. t. 113. f. 2. —
2) Eier: Thien. t. 18. f. 13. a b. — Bäd. t. 43. f. 20. —
L. S. XII. p. 342. n. 13. — Boie, Isis 1822. p. 556. — M. u. W. I. p. 274. — Schinz p. 221. n. 2. — Br. Lehrb. p. 272. — N. V. D. IV. p. 113. — Bp. Consp. I. Gen. 497. n. 1. — K. u. Bl. n. 131. — Schl. Rev. I. p. 47. Mus. Hein. I. n. 494. — Degl. u. G. n. 269. — Br. Thierl. III. p. 923. —

123. Mecistura caudata. Leach.

Ganz Europa, aber im Süden seltener.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 502. f. 3. — Gould. t. 157. — N. V. D t. 95. f. 4—6. —
2) Eier: Thien. t. 18. f. 11. a—d. — Bäd. t. 43. f. 19. Besser.

L. S. XII. p. 342. n. 11. — Leach Mus. Brit. — M. u. W. I. p. 72. — Schinz. p. 220. n. 2. — Br. Lehrb. p. 269. — Koch. Baier. Zool. p. 200. — N. V. D. IV. p. 82. — Bp. Consp. I. Gen. 494. n. 1. — K. u. Bl. n. 133. — Schl. Rev. I. p. 46. — Mus. Hein. I. n. 496. — Degl. u. G. n. 267. — Br. Thierl. III. p. 927. —

124. Regulus cristatus. Koch.

Europa, bis zum höchsten Norden. Scheint im Süden zu fehlen, wenigstens auf der Iberischen Halbinsel.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 148. f. 1. — N. V. D. t. 93. f. 1—3. —
2) Eier: Thien t. 19. f. 7. a b c. — Bäd. t. 51. f. 1. —

Koch. Baier. Zool. I. p. 199. n. 117. — Willugb. Orn. II. p. 163. — L. S. XII. p. 338. n. 48. — M. u. W. I. p. 250. (part.) — Schinz. p. 207. n. 1. — Br. Lehrb. p. 275. — N. V. D. III. p. 968. — Bp. Consp. I. Gen. 611. n. 1. — K. u. Bl. n. 213. — Schl. Rev. I. p. 44. — Mus. Hein. I. n. 222. — Degl. u. G. n. 257. — Br. Thierl. III. p. 919. —

125. Regulus ignicapillus. Naum.

Süd- und Mittel-Europa. — [Im Norden nicht vorkommend.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 651. f. 3. — Gould. t. 148. f. 2. — N. V. D. t. 93. f. 4—6. —
2) Eier: Thien. t. 19. f. 6. a b. Nicht genau. — Bäd. t. 51. f. 2. —

Temm. Man. I. p. 231. — Br. Beitr. II. p. 130. — Schinz p. 207. n. 2. — Br. Lehrb. p. 276. — N. V. D. III. p. 983. — Bp. Consp. I. Gen. 611. n. 2. — K. u. Bl. n. 212. — Schl. Rev. I. p. 44. — Mus. Hein. I. n. 224. — Degl. u. G. n. 257. — Br. Thierl. III. p. 919.

126. Sylvicola virens. Sw.

Nord-Amerika. — [Nach Gätke im October 1858 auf Helgoland vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 17. f. 3. — Vieill. Ois. Am. t. 92. — Edw. B. t. 300. —
2) Eier: Thien. t. 22. f. 3. —

L. S. XIII. p. 985. — Wils. Am. Orn. I. p. 279. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 126. — N. V. D. XIII. p. 156. — Bp. Consp. I. Gen. 655. n. 7. — Mus. Hein. I. n. 134. —

127. Erythrosterna parva. Bp.

Pommern, häufig. Mähren. Banat. Kiew, gemein. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 64. — N. V. D. t. 65. —
2) Eier: Thien. t. 29. f. 8. a b c. Unkenntlich. — Bäd. t. 52. f. 10. —

Bechst. Nat. D. III. p. 442. — M. u. W. I. p. 215. — Schinz p. 156. n. 1. — Br. Lehrb. p. 386. — N. V. D. II. p. 241. — XIII. p. 48. — Bp. Consp. I. Gen. 676. n. 1. — K. u. Bl. n. 256. — Schl. Rev. I. n. 23. — II. p. 50. —

Mus. Hein. I. n. 326. — Degl. u. G. n. 274. — Br. Thierl. III. p. 737. — Heugl. N. O. Afr. n. 372. —

Cab. Journ. 1853. p. 129. —

128. Muscicapa atricapilla. L.

Ganz Europa; aber strichweise fehlend. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 565. f. 2—3. — Gould. t. 63. f. 1. — N. V. D. t. 64. f. 2—4. —

2) Eier: Thien. t. 29. f. 9. ab. Zu hell. — Bäd. t. 52. f. 12. —

L. S. XII. p. 326. — Temm. Man. I. p. 155. — M. u. W. I. p. 213. — Schinz. p. 155. n. 2. — Scop. Ann. I. p. 146. n. 215. — Br. Lehrb. p. 382. N. V. D. II. p. 231. — Bp. Consp. I. Gen. 674. n. 1. — K. u. Bl. n. 257. — Schl. Rev. I. p. 22. — Mus. Hein. I. n. 319. — Degl. u. G. n. 271. — Br. Thierl. III. p. 734. — Heugl. N. O. Afr. n. 376. —

N. 1858. p. 256. —

129. Muscicapa albicollis. Temm.

Schweden. Norwegen. Polen. Steiermark. Mähren. Macedonien. Kiew: Göbel. Bei Halle a/S. (seit 1870). — [Nord-Afrika. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 63. f. 2. — N. V. D. t. 65. f. 1—2. — t. 352. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 29. f. 10. ab. Zu hell. — Bäd. t. 52. f. 13. Zu dunkel.

Temm. Man. I. p. 153. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 158. — Bechst. Nat. D. III. p. 427. — M. u. W. I. p. 212. var. c. — Schinz. p. 155. n. 1. — Br. Lehrb. p. 379. — p. 384. — N. V. D. II. p. 224. — XIII. p. 48. M. melanoptera. — Bp. Consp. I. Gen. 674. n. 3. — K. u. Bl. n. 258. — Schl. Rev. I. p. 22. — Mus. Hein. I. n. 320. — Degl. u. G. n. 272. — Br. Thierl. III. p. 734. — Heugl. N. O. Afr. n. 377. —

N. 1858. p. 257. —

130. Butalis grisola. Boie.

Europa, mit Ausschluss des höchsten Nordens. Egypten: Heuglin. — [West-Asien. Persien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 565. f. 1. — Gould. t. 65. — N. V. D. t. 64. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 29. f. 7. a—e. — Bäd. t. 52. f. 11. —

L. S. XII. p. 328. n. 20. — Boie. Isis. 1826. p. 973. — M. u. W. I. p. 221. — Schinz. p. 154. n. 2. — Br. Lehrb. p. 378. — N. V. D. II. p. 216. — — Bp. Consp. I. Gen. 675. n. 1. — K. u. Bl. n. 255. — Schl. Rev. I. p. 22. — Rüpp. S. Ueb. n. 207. — Mus. Hein. I. n. 321. — Degl. u. G. n. 273. — Br. Thierl. III. p. 732. — Heugl. N. O. Afr. n. 378. —

131. Bombycilla garrula. Vieill.

Lappland. Finnland. — [In Nord-Europa regelmässig, im mittleren Theile dann und wann, und in Süd-Europa nur sehr selten beobachtet. Einmal in Algerien: Loche.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 261. — Gould. t. 160. — N. V. D. t. 59. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 30. f. 8. a b. Unkenntlich. — Bäd. t. 52. f. 20. Sehr gut. — N. 1858. t. 1. f. 5—8. —

Vieill. Nouv. Dict. XVI. p. 523. — L. S. XII. p. 297. n. 1. — L. Faun. Suec. n. 82. — Pall. Zoogr. I. p. 548. n. 163. — Temm. Man. I. p. 124. — M. u. W. I. p. 204. — Schinz. p. 149. n. 1. — Br. Lehrb. p. 980. — N. V. D. II. p. 143. — XIII. p. 45. — Bp. Consp. I. Gen. 727. n. 1. — K. u. Bl. n. 145. — Schl. Rev. I. p. 57. — Mus Hein. I. n. 335. — Degl. u. G. n. 270. — Br. Thierl. III. p. 739. —

N. 1854. p. 123. — 1858. p. 498. — Cab. Journ. 1858. p. 307. — 1861. p. 132.

132. Lanius excubitor. L.

Nördliches und gemässigtes Europa. — [Nord-Afrika. Asien. Nord-Amerika. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 445. — Gould. t. 66. — N. V. D. t. 49. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 31. f. 1. a—d. — Bäd. t. 52. f. 1. Besser.

L. S. XII. p. 135. n. 11. — Pall Zoogr. I. p. 402. n. 56. — p. 401. n. 55. = L. major Pall. — M. u. W. I. p. 87. — Schinz. p. 151. n. 1. — Br. Lehrb. p. 84. — N. V. D. II. p. 7. — Bp. Consp. I. Gen. 773. n. 1. — K. u. Bl. n. 250. — n. 249. = L. major. Pall. — Schl. Rev. I. p. 20. — II. p. 143. = L. major. Pall. — Mus. Hein. I. n. 421. — Rüpp. S. Ueb. n. 219. — Degl. u. G. n. 97. — Br. Thierl. III. p. 693. — Heugl. N. O. Afr. n. 405. —

133. Lanius meridionalis. Temm.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Canaren: Bolle. Tanger: Drake. Palästina: Tristam. — [Griechenland: v. der Mühle.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 143. — Roux. Orn. prov. t. 153. — Gould. t. 67. —

2) Eier: Thien. t. 31. f. 3. a b. — Bäd. t. 52. f. 3. Besser. —

Temm. Man. I. p. 143. — Schinz. p. 151. n. 2. — Br. Lehrb. p. 86. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 773. n. 2. — K. u. Bl. n. 251. — Schl. Rev. I. p. 20. — Mus. Hein. I. n. 423. — Degl. u. G. n. 98. — Br. Thierl. III. p. 696. — Heugl. N. O. Afr. n. 407. —

134. Lanius minor. Gm.

Mittleres und südöstliches Europa. Fehlt im äussersten Süd-Westen. Klein-Asien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 32. f. 1. — Gould. t. 68. — N. V. D. t. 50. f. 1—2. —

2) Eier: Thien t. 31. f. 4. a—d. — Bäd. t. 52. f. 4. Besser. —

Gm. L. S. p. 308. n. 49. — Pall. Zoogr. I. p. 403. n. 57. — M. u. W. I. p. 88. — Schinz. p. 152. n. 1. — Br. Lehrb. p. 86. n. 2. — N. V. D. II. p. 15. — Bp. Consp. I. Gen. 773. n. 3. — K. u. Bl. n. 252. — Schl. Rev. I. p. 21. — Rüpp. S. Ueb. n. 220. — Mus. Hein. I. n. 420. — Degl. u. G. n. 99. — Br. Thierl. III. p. 697. — Heugl. N. O. Afr. n. 404. —

135. Lanius rufus. Briss.

Gemässigtes und südliches Europa. Im Süden sehr häufig. Klein-Asien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 9. f. 1. — 31. f. 1. — Gould. t. 70. — N. V. D. t. 51. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 31. f. 8. a—f. — Bäd. t. 52. f. 5. —

Briss. Orn. II. p. 147. n. 3. — Gm. L. S. n. 12. n. 3. — Lath Ind. Orn. p. 70. n. 12. — Bechst. Nat. D. II. p. 1327. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 101. n. 3. — M. u. W. I. p. 89. — Br. Lehrb. p. 88. — Schinz. p. 152. n. 2. — N. V. D. II. p. 22. — Bp. Consp. I. Gen. 772. n. 2. — K. u. Bl. n. 254. — Schl. Rev. I. p. 21. — II. p. 44. — Hartl. W. Afr. n. 314. — Rüpp. S. Ueb. n. 217. — Mus. Hein. I. n. 418. — Degl. u. G. n. 100. — Br. Thierl. III. p. 701. — Heugl. N. O. Afr. n. 401. —

Cab. Journ. 1854. p. 100. —

136. Lanius collurio. L.

Europa mit Ausschluss von Süd-Spanien und Portugal. Süd-Afrika: Layard. — [Ganz Europa. Asien. Nord-Ost-Afrika: Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 31. f. 2. — Gould. t. 69. — N. V. D. t. 52. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 31. f. 9. a—f. — Bäd. t. 52. f. 6. —

L. S. XII. p. 136. n. 12. — Bechst. Nat. D. II. p. 1335. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 102. — Boce., Isis. 1826. p. 973. — M. u. W. I. p. 90. — Schinz. p. 153. — Br. Lehrb. p. 89. — N. V. D. II. p. 30. — Bp. Consp. I. Gen. 772. n. 1. — K. u. Bl. n. 253. — Schl. Rev. I. p. 21. — Mus. Hein. I. n. 412. — — Rüpp. S. Ueb. n. 221. — Degl. u. G. n. 102. — Br. Thierl. III. p. 699. — Heugl. N. O. Afr. n. 402. —

Cab. Journ. 1858. p. 43. — p. 223. Eier. —

137. Lanius phoenicurus. Pall.

Ost-Asien. — [Im October 1854 von Gätke auf Helgoland erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Ibis. 1867. t. 5. f. 2. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. I. p. 405. n. 59. — Bp. Consp. I. Gen. 772. n. 4. — Mus Hein. I. n. 414. — N. V. D. XIII. p. 39. —

138. Lanius personatus. Temm.

Griechenland, selten. Klein-Asien, häufig. Nord-Afrika.

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 216. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 31. f. 11. abc. — Bäd. t. 52. f. 7. Besser. —

Licht. Catal. 1823. p. 47. n. 510. — Bp. Consp. I. Gen. 773. n. 4. — Schl. Rev. I. p. 21. — II. p. 46. — Hartl. W. Afr. n. 317. — Rüpp. S. Ueb. n. 218. — Mus. Hein. I. n. 417. — Degl. u. G. n. 101. — Br. Thierl. III. p. 702. — Cab. Journ. 1869. p. 30. — Heugl. N. O. Afr. n. 412. —

139. Lanius cucullatus. Temm.

Afrika. — [Soll in Spanien vorgekommen sein. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. II. t. 70. — Temm. pl. col. 297. f. 1.
2) Eier: Thien. t. 31. f. 5. — Bäd. t. 52. f. 9. — f. 8. = L. erythropterus Shaw. —

Le Vaill. Eencycl. p. 732. n. 19. — Schinz. p. 429. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 21. — II. p. 47. — Bp. Consp. I. Gen. 768. n. 2. — n. 1. = L. erythropterus. — Mus. Hein. I. 401. — Hartl. W. Afr. n. 321. — n. 323. — Rüpp. S. Ueb. n. 229. — Degl. u. G. n. 103. — Br. Thierl. III. p. 707. — Heugl. N. O. Afr. n. 397. —

140. Cyanopica cyanea. Bp.

Süd- und Mittel-Spanien mit Ausschluss der östlichen Provinzen: Brehm. In Portugal nur im centralen Theile (südlich von Lissabon). Mongolei. Japan. Algerien.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 217. —
2) Eier: Thien. t. 41. f. 8. — Bäd. t. 50. f. 15. Besser. —

Wagl. Syst. Av. n. 6. — Pall. It. II. app. p. 694. n. 7. — Pall. Zoogr. I. p. 391. n. 49. — Schinz. p. 145. — n. 2. — Br. Lehrb. p. 977. — K. u. Bl. n. 149. — Schl. Rev. I. p. 55. — Bp. Consp. I. Gen. 822. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 1030. — Degl. u. G. n. 94. — Br. Thierl. III. p. 374. —
N. 1854. p. 30. —

141. Pica caudata. Ray.

Ganz Europa. — [Asien. Nord-Afrika.] P. mauritianica: Portugal. Spanien. Algerien. P. hudsonica: Nord-Amerika.

Abbild. 1) Vogel: Buff pl. enl. 488. — Gould. t. 216. — N. V. D. t. 56. f. 2.
2) Eier: Thien. t. 40. f. 3. a—e. — Bäd. t. 28. f. 1. — t. 76. f. 2. = P. mauritianica. — f. 3. = P. melanotis. — Audub. B. Am. t. 227. = P. hudsonica. —

Gessn. Av. p. 965. — L. S. XII. p. 157. n. 13. — M. u. W. I. p. 104. — Schinz. p. 145. n. 1. — Br. Lehrb. p. 98. — N. V. D. II. p. 101. — Bp. Consp. I. Gen. 824. n. 1. — n. 6 = P. mauritianica. — K. u. Bl. n. 150. — Schl. Rev. I. p. 54. — Rüpp. S. Ueb. n. 234. — Mus Hein. I. n. 1054. — Degl. u. G. n. 93. — Br. Thierl. III. p. 371. — Heugl. N. O. Afr. n. 422. —

142. Garrulus glandarius. Vieill.

Ganz Europa mit Ausnahme der nördlichsten Theile. — [Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 481. — Gould. t. 215. — N. V. D. t. 58. f. 1.
2) Eier: Thien. t. 41. f. 6. a—f. — Bäd. t. 50. f. 17. —

Cuv. Règne an. I. p. 422. — L. S. XII. p. 156. n. 7. — Gessn. Av. p. 700. — M. u. W. I. p. 102. — Schinz. p. 146. n. 1. — Br. Lehrb. p. 100. — N. V. D. II. p. 122. — Bp. Consp. I. Gen. 811. n. 1. — K. u. Bl. n. 147. — Schl. Rev. I. p. 55. — Mus. Hein. I. n. 1020. — Degl. u. G. n. 95. — Br. Thierl. III. p. 378. —

143. Var. Garrulus melanocephalus. Géné.

Klein-Asien. Kaukasus. — [Syrien. Krim.]

Abbild. 1) Vogel: Mém. Acad. Turin. XXXVII. t. 1. —
2) Eier: Bäd. t. 50. f, 16. —

Géné, Mém. Acad. Turin. XXXVII. p. 298. — Schinz. p. 428. n. 3. — Bp. Consp. I. Gen. 811. n. 4. — Schl. Rev. I. p. 55. — II. p. 74. — Mus. Hein. I. n. 1023. — Degl. u. G. n. 95. A. —
Cab. Journ. 1869. p. 33. Fortpflanzung. —

144. Garrulus infaustus. Vieill.

Schweden. Norwegen. Lappland. — [Russland. Sibirien. Hat sich schon bis nach Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 608. — Gould. t. 215. —
2) Eier: Bäd. t. 77. f. 5.

Gm. L. S. p. 310. n. 25. — p. 373. n. 36. — L. Faun. Suec. p. 32. n. 93. — Pall. Zoogr. I. p. 395. n. 52. — Temm. Man. I. p. 115. — Wagl. Syst. Av. n. 20. — Vieill. Encycl. p. 891. n. 5. — Boie Reise Norweg. app. — Schinz. p. 146. n. 2. — Br. Lehrb. p. 101. — Bp. Consp. I. Gen. 810. n. 1. — K. u. Bl. n. 146. — Schl. Rev. I. p. 56. — Mus. Hein. I. n. 1018. — Degl. u. G. n. 96. — Br. Thierl. III. p. 382. —

145. Nucifraga caryocatactes. Temm.

Bewaldete Gebirgsgegenden des nördlichen und gemässigten Europa's. Asien. — [Im Winter auch in der Ebene.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 50. — Gould. t. 212. — N. V. D. t. 58. f. 2.
2) Eier: Thien. t. 41. f. 4. a b c. — Bäd. t. 50. f. 14. — t. 76. f. 4. — L. S. XII. p. 157. n. 10. — Cuv. Règne an. I. p. 423. — M. u. W. I. p. 103. — Schinz p. 147. n. 1. — Br. Lehrb. p. 103. — Bp. Consp. I. Gen. 826. n. 1. — N. V. D. II. p. 130. — K. u. Bl. n. 148. — Schl. Rev. I. p. 55. — Mus. Hein. I. n. 1052. — Degl. u. G. n. 92. — Br. Thierl. III. p. 365. —
Cab. Journ. 1861. p. 33. — 1862. p. 125. — 1866. p. 1. —

146. Corvus monedula. L.

Ganz Europa. Algerien: Loche. — [Canaren: Bolle. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould t. 223. — N. V. D. t. 56. f. 1. —
2) Eier: Thien. t. 40. f. 4. a—d. — Bäd. t. 24. f. 4. —

L. S. XII. p. 156. n. 60. — M. u. W. I. p. 99. — Schinz p. 144. n. 2. — Br. Lehrb. p. 97. — N. V. D. II. p. 93. — Bp. Consp. I. Gen. 828. n. 1. — K. u. Bl. n. 151. — Schl. Rev. I. p. 54. — Mus. Hein. I. n. 1055. — Degl. u G. n. 89. — Br. Thierl. III. p. 359. — Heugl. N. O. Afr. n. 423. —

147. Var. Corvus spermologus. Vieill.

Spanien. Süd-Frankreich. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Frisch. V. D. t. 68. — Vieill. Nouv. Dict. t. 8. —
2) Eier: Bäd. t. 76. f. 1. —

Temm. Man. I. p. 61. — Vieill. Nouv. Dict. p. 40. — Gm. L. S. p. 368. n. 6. *δ*. — Schinz p. 144. n. 3. — K. u. Bl. n. 152. — Schl. Rev. I. p. 54.

— II. p. 74. — Bp. Consp. I. Gen. 828. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 326. — Mus. Hein. I. n. 1055. — Heugl. N. O. Afr. n. 423. (part.) —

148. Corvus dauricus. Pall.

Sibirien.

Abbild. Vogel: Faun. Japon. t. 40. — t. 41. — Gray. Gen. B. t. 76. — Gm. L. S. p. 367. n. 22. — Gray. Gen. B. II. p. 21. — Pall. It. III. app. p. 694. n. 8. — Pall. Zoogr. I. p. 387. n. 47. — Wagl. Syst. Av. n. 19. — Gray. Gen. B. n. 21. — Bp. Consp. I. Gen. 828. n. 3. — K. u. Bl. n. 152. Anmerk. — Mus. Hein. I. n. 1056. —

Cab. Journ. 1869. p. 170. —

149. Corvus frugilegus. L.

Nördliches und gemässigtes Europa. — [Asien. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 224. — N. V. D. t. 55. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 40. f. 2. a—e. — Bäd. t. 28. f. 5. —

L. S. XII. p 156. n. 4. — p. 155. n. 3. — L. Faun. Suec. p. 29. n. 86. — M. u. W. I. p. 97. — Schinz p. 144. n. 1. — Br. Lehrb. p. 96. — N. V. D. II. p. 78. — Bp. Consp. I. Gen. 829. n. 4. — K. u. Bl. n. 156. — Schl. Rev. I. p. 54. — Mus. Hein. I. n. 1057. — Rüpp. S. Ueb. n. 237. — Degl. u. G. n. 88. — Br. Thierl. III. p. 356. —

150. Corvus corax. L.

Ganz Europa. Im Süden häufiger. Asien. Nord-Amerika = C. leucophaeus. Vieill. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 220. — N. V. D. t. 53. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 39. f. 1. a—f. — Bäd. t. 34. f. 3. — f. 4. = C. leucophaeus. Vieill. —

L. S. XII. p. 155. n. 2. — M. u. W. I. p. 93. — Schinz p. 142. n. 1. — p. 143. n. 2. = C. leucophaeus Vieill. — Br. Lehrb. p. 92. — N. V. D. II. p. 43. — K. u. Bl. n. 155. — Schl. Rev. I. p. 53. — Bp. Consp. I. Gen. 829. n. 25. — Mus. Hein. I. n. 1068. — Degl. u. G. n. 85. — n. 85. A. = C. leucophaeus. Vieill. Br. Thierl. III. p. 343. —

151. Corvus corone. Lath.

Mittel- und Süd-Deutschland. Frankreich. Asien. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 221. — N. V. D. t. 53. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 40. f. 1. a—g(?) — Bäd. t. 34. f. 1. —

Lath. Syn. I. p. 370. n. 3. — M. u. W. I. p. 94. Schinz. p. 142. n. 2. — Br. Lehrb. p. 94. — N. V. D. II. p. 54. — Bp. Consp. I. Gen. 829. n. 16. — K. u. Bl. n. 153. — Schl. Rev. I. p. 53. — Mus. Hein. n. 1062. — Degl. u. G. n. 86. — Br. Thierl. III. p. 351. —

Cab. Journ. 1861. p. 156. —

152. Corvus cornix. L.

Skandinavien. Nord-Deutschland. Anhalt. Russland. Steiermark. Griechenland. Egypten. Syrien. Palästina. — [Portugal. Spanien. Frankreich. Italien. Ungarn. Galizien. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 222. — N. V. D. t. 54. f. 1. – f. 2. =Bastard von C. corone und C. cornix. —

2) Eier: Thien. t. 40. f. 1. a—g (?). — Bäd. t. 34. f. 2. —

L. S. XII. p. 156. n. 5. — M. u. W. I. p. 95. — Schinz. p. 143. n. 1. — Br. Lehrb. p. 95. — N. V. D. II. p. 65. — Bp. Consp. I. Gen. 829. n. 17. — K. u. Bl. n. 154. — Schl. Rev. I. p. 54. — Rüpp. S. Ueb. n. 235. — Mus. Hein. I. n. 1064. — Degl. u. G. n. 87. — Br. Thierl. III. p. 351. — Heugl. N. O. Afr. n. 527. —

Cab. Journ. 1861. p. 156. —

153. Pyrrhocorax alpinus. Vieill.

In allen Felsengebirgen Süd-Europas. Nördlich bis zur Schweiz. Palma. In Portugal selten. Spanien. Frankreich. Griechenland. Schweiz. — [Nord-Ost-Afrika. Canaren. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 531. — Gould. t. 218. — N. V. D. t. 57. f. 1.

2) Eier: Thien. t. 41. f. 2. a—d. — Bäd. t. 28. f. 3. —

Vieill. Gal. d. Ois. p. 165. — L. S. XII. p. 158. n. 17. — M. u. W. I. p. 101. — Schinz. p. 148. n. 1. — Br. Lehrb. p. 108. — N. V. D. II. p. 107. — Bp. Consp. I. Gen. 834. — K. u. Bl. n. 157. — Schl. Rev. I. p. 56. — Mus. Hein. I. n. 1049. — Degl. u. G. n. 90. — Br. Thierl. III. p. 341. — Heugl. N. O. Afr. n. 421.

154. Pyrrhocorax graculus. Temm.

Schottland (?). Balkan. Griechenland. Pyrenaeen. Spanische Gebirge. Portugal; häufig in der Provinz Algarve. — [Canaren. Ural. Kaukasus. China. Java.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 255. — Gould. t. 219. — N. V. D. t. 57. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 41. f. 3. — Bäd. t. 28. f. 2. —

Cuv. Règne an. I. p. 458. — L. S. XII. p. 158. n. 18. — M. u. W. I. p. 101. — Schinz. p. 148. n. 2. — Br. Lehrb. p. 107. — N. V. D. II. p. 114. — Bp. Consp. I Gen. 836. — K. u. Bl. n. 158. — Schl. Rev. I. p. 56. — Rüpp. S. Ueb. n. 243. — Mus. Hein. I. n. 1051. — Degl. u. G. n. 91. — Br. Thierl. III. p. 334. — Heugl. N. O. Afr. n. 420. —

N. 1858. p. 67. —

155. Podoces Panderi. Fisch.

Asien. — [Findet sich in Europäischen Verzeichnissen als hier vorgekommen, aber ohne nähere Angabe, aufgeführt. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Mem. Soc. Imp. Mosc. t. 21. —

2) Eier:

Bp. Consp. I. Gen. 833. —

156. Oriolus galbula. L.

Südliches und gemässigtes Europa. Afrika. Palästina: Tristam. Klein-Asien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 26. — Gould. t. 71. — N. V. D. t. 61. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 27. f. 11. a—e. — Bäd. t. 50. f. 10. —

L. S. XII. p. 160. n. 1. — Gm. L. S. p. 382. n. 1. — Scop. Ann. I. p. 41. n. 45. — M. u. W. I. p. 108. — Schinz. p. 157. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 98. — Br. Lehrb. p. 114. — N. V. D. II. p. 171. — Bp. Consp. I. Gen. 741. n. 9. — K. u. Bl. n. 178. — Schl. Rev. I. p. 43. — Rüpp. S. Ueb. n. 205. — Mus Hein. I. n. 982. — Degl. u. G. n. 178. — Br. Thierl. III. p. 317. — Heugl. N. O. Afr. n. 349. —

157. Pastor roseus. Temm.

Klein-Asien. An der Wolga. Ceylon: Layard. — [Türkei. Algerien: Loche. Verfliegt sich bis nach Deutschland und England.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 251. — Gould. t. 212. — N. V. D. t. 63. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 38. f. 3. — Bäd. t. 50. f. 11. —

Briss. Orn. II. p. 250. n. 20. — L. S. XII. p. 294. n. 15. — Ranz. Elem. Zool. III. p. 177. — Temm. Man. I. p. 136. — M. u. W. I. p. 201. — Schinz. p. 159. — Br. Lehrb. p. 279. — N. V. D. II. p. 206. — Bp. Consp. I. Gen. 904. n. 1. — K. u. Bl. n. 160. — Schl. Rev. I. p. 68. — Mus Hein. I. p. 963. — Br. Thierl. III. p. 299. — Degl. u. G. n. 105. — Heugl. N. O. Afr. n. 448. N. 1856. p. 404. —

158. Sturnus vulgaris. L.

Nord- und Mittel-Europa. Südliche Alpen. Pyrenäen: Brehm. Algerien: Loche. — [Ganz Europa. Egypten. Arabien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 75. — Gould. t. 210. — N. V. D. t. 62. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 38. f. 1. a b. — Bäd. t. 50. f. 12. —

L. S. XII. p. 290. n. 1. — M. u. W. I. p. 208. — Schinz p. 158. n. 1. — Br. Lehrb. p. 282. — N. V. D. II. p. 187. — Bp. Consp. I. Gen. 903. n. 1. — K. u. Bl. n. 159. — Schl. Rev. I. p. 57. — Mus. Hein. I. n. 959. — Rüpp. S. Ueb. n. 256. — Degl. u. G. n. 104. — Br. Thierl. III. p. 294. — Heugl. N. O. Afr. n. 446. —

159. Sturnus unicolor. La Marm.

Portugal. Spanien. Sardinien. Corsika. Sicilien. — [Algerien: Taczanowski.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 111. — Gould. t. 211. —

2) Eier: Thien. t. 38. f. 2. a b. — Bäd. t. 50. f. 13. —

Temm. Man. I. p. 133. — Schinz p. 158. n. 2. — K. u. Bl. n. 159. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 57. — Mus. Hein. I. n. 960. — Bp. Consp. I. Gen. 903. n. 3. — Degl. u. G. n. 104. A. — Br. Thierl. III. p. 295. —

Cab. Journ. 1865. p. 275. —

160. Agelaïus phoeniceus. Vieill.

Nord-Amerika. — [Soll in England vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 67. — Buff. pl. enl. 402. — Wils. Am. Orn. t. 30. f. 1. — Gray. Gén. B. II. t. 86. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 37. f. 2. ab. — Bäd. t. 76. f. 14. —

L. S. XII. n. 5. — Gm. L. S. p. 386. n. 5. — Wils. Am. Orn. IV. p. 30. — Wagl. Syst. Av. n. 10. — Audub. B. Am. p. 141. n. 216. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. I. p. 192. — Bp. Consp. I. Gen. 926. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 912. — Baird. u. Cass. p. 526. — Br. Thierl. III. p. 282. —

N. 1855. p. 468. —

161. A. Ixos obscurus. Bp.

Afrika. — [Soll im südlichen Spanien vorkommen. (?)]

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier: Bäd. t. 76. f. 15. —

Temm. Man. IV. p. 608. — Schinz. p. 430. u. 1. — Schl. Rev. I. p. 42. — Bp. Consp. I. Gen. 565. n. 21. — Mus. Hein. I. n. 579. —

161. B. Ixos nigricans. Bp.

Naxos: Krüper. Am Oranje-Fluss (Süd-Afrika.) — [Bei Beirut und Damaskus häufig: Krüper. Nord-Ost-Afrika: Heugl. Port Natal: Cabanis.]

Abbild. Vogel: Le Vaill. Ois. t. 106. f. 1. — Buff. pl. enl. 317. —

Bp. Consp. I. Gen. 565. n. 25. — Gr. Gen. B. I. n. 26. — Rüpp. S. Ueb. n. 197. — Mus. Hein. I. n. 581. — Layard. S. Afr. n. 261. — Symb. Phys. p. 6. — Bp. Compt. Rend. 1856. p. 14. — Sclat. Proceed. 1862. p. 12. — Hartl. u. Finsch. p. 297. — Heugl. N. O. Afr. n. 348. —

162. Ixos aurigaster. Gr.

Asien. — [Soll einmal in Irland erlegt worden sein.]

Abbild. 1) Vogel: Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 27. f. 14. abc.

Trans. Lin. Soc. XIII. p. 147. — Gray. Gen. B. n. 25. — Ann. Mag. Nat. Hist. XIII. 1844. p. 412. — Bp. Consp. I. Gen. 565. n. 26. — Mus. Hein. I. n. 584. —

163. Toxostoma rufum. Cab.

Nord-Amerika. — [Im October 1837 auf Helgoland vorgekommen: Gätke.] —

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 14. f. 1. — Buff. pl. enl. 645. — N. V. D. I. 381. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 21. — Bäd. t. 75. f. 10. Zu grün. —

L. S. XII. p. 293. n. 9. — Schinz. p. 163. n. 2. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 116. — Bp. Consp. I. Gen. 575. n. 1. — Schl. Rev. II. p. 69. — Mus. Hein. I. n. 459. — N. V. D. XIII. p. 54. — Br. Thierl. III. p. 810. —

Cab. Journ. 1858 p. 180. —

164. Mimus polyglottus. Boie.

Nord-Amerika. — [Hat sich schon nach Europa verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. t. 22. — Buff. pl. enl. 558. f. 1. — Wils. Am. Orn. t. 10. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 12. ab. — Bäd. t. 75. f. 12. —

Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 88. — IV. p. 305. — Bp. Consp. I. Gen. 574. n. 5. — Br. Thierl. III. p. 807. —
Cab. Journ. 1858. p. 179. —

165. Galeoscoptes carolinensis. Cab.

Nord-Amerika. — [Von Gätke auf Helgoland erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 14. f. 3. — N. V. D. t. 384. f. 1. —
2) Eier: Thien. t. 24. f. 6. — Bäd. t. 75. f. 11. —
L. S. XII. p. 328. n. 18. — Wils. Am. Orn. I. p. 240. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 100. — Bp. Consp. I. Gen. 574. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 461. — N. V. D. XIII. p. 51. — Br. Thierl. III. p. 810. —
Cab. Journ. 1858. p. 180. —

166. Turdus merula. L.

Ganz Europa. Klein-Asien. — [Nord-Afrika. Canaren: Bolle. Azoren. Madeira: Keyserling u. Blasius. West-Asien. Persien.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 2. — 555. — Gould. t. 72. — N. V. D. t. 71. f. 1.—2. —
2) Eier: Thien. t. 24. f. 20. a b c. Unkenntlich. — Bäd. t. 75. f. 9. —
L. S. XII. p. 295. n. 22. — Boie, Isis. 1826. p. 972. — M. u. W. I. p. 199. — Schinz. p. 161. n. 3. — Br. Lehrb. p. 300. — N. V. D. II. p. 326. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 46. — K. u. Bl. n. 190. — Schl Rev. I. p. 41. — Mus. Hein. I. n. 19. — Rüpp. S. Ueb. n. 189. — Degl. u. G. n. 180. — Br. Thierl. III. p. 799. — Heugl. N. O. Afr. n. 335. —

167. Turdus torquatus. L.

Schweden. Schweiz. Schlesien. Mähren. Galizien. — [Ganz Europa nördlich bis Skandinavien. Nord-Afrika. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 182. — 516. — Gould. t. 73. — N. V. D. I. 70. f. 1—2. — t. 361. f. 3. —
2) Eier: Thien. t. 24. f. 17. a b c. — Bäd. t. 75. f. 8. —
L. S. XII. p. 296. n. 23. — Gessn. Av. p. 607. — M. u. W. I. p. 198. — Schinz. p. 163. n. 4. — Br. Lehrb. p. 301. — N. V. D. II. p. 318. — Bp. Consp. I. Gen. 572. — n. 40. — K. u. Bl. n. 185. — Schl. Rev. II. p. 41. — Mus. Hein. I. n. 18. — Degl. u. G. n. 181. — Br. Thierl. III. p. 798. — Heugl. N. O. Afr. n. 336. —

168. Turdus sibiricus. Pall.

Nord-Asien. — [Wurde einige Male in Deutschland und in Frankreich erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 82. — N. V. D. t. 69. f. 2. —
2) Eier:
Pall. It. III. app. p. 694. n. 10. — Pall. Zoogr. I. p. 450. n. 90. — Temm. Man. III. p. 398. — Schinz. p. 167. n. 1. — N. V. D. I. p. 310. — Bp. Consp. I. Gen. 512. n. 39. — K. u. Bl. n. 189. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 69. — Degl. u. G. n. 190. —

169. Turdus varius. Pall.

Nord-Asien. — Nach Gätke auf Helgoland vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 81. — N. V. D. t. 354. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. I. p. 449. n. 88. — Eyton. Rarer. Brit. B. p. 92. — Schinz. p. 161. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 571. n. 2. — K. u. Bl. n. 192. — Schl. Rev, I. p. 41. — II. p. 70. — Mus. Hein. I. p. 6. Anmerk. — Degl. u. G. n. 192. —

Cab. Journ. 1856. p. 237. —

170. Turdus lunulatus. Lath.

Ost-Asien. Australien. — [Wurde in England und Frankreich erlegt.] —

Abbild. 1) Vogel: Gould. Austr. IV. t. 7. —

2) Eier:

Horsf. L. Trans. XIII. p. 149. — Yarrel. Brit. B. p. 186. — Bp. Consp. I. Gen. 571. n. 1. — K. u. Bl. n. 193. — Schl. Rev. I. p. 42. — II. p. 70. — Mus. Hein. I. n. 43. — n. 44.? —

171. Turdus viscivorus. L.

Ganz Europa. Algerien: Loche. Klein-Asien. — [Sibirien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 489. — Gould. t. 77. — N. V. D. t. 66. f. 1.

2) Eier: Thien. t. 24. f. 11. a b c. — Bäd. t. 75. f. 1. —

L. S. XII. p. 291. n. 1. — Gessn. Av. p. 759. — M. u. W. I. p. 191. — Schinz. p. 160. n. 1. — Br. Lehrb. p. 293. — N. V. D. II. p. 248. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 1. — K. u. Bl. n. 187. — Schl. Rev. I. p. 39. — Mus. Hein. I. n. 12. — Rüpp. S. Ueb. n. 192. — Degl. u. G. n. 191. — Br. Thierl. III. p. 796. — Heugl. N. O. Afr. n. 330. —

172. Turdus pilaris. L.

Nord-Europa. Schlesien. Böhmen (seit 1840): Fierlinger. Provinz Sachsen, (seit 1864 bei Halle häufig). Anhalt. — [Ganz Europa, aber im Süden seltener. Nord-Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 406. — Gould. t. 76. — N. V. D. t. 67. f. 1—2. —

2) Eier; Thien. t. 24. f. 19. a b c. — Bäd. t. 75. f. 2. —

L. S. XII. p. 291. n. 2. — Gessn. Av. p. 753. — Pall. Zoogr. I. p. 454. n. 95. — Schinz. p. 160. n. 2. — Br. Lehrb. p. 295. — N. V. D. II. p. 296. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 5. — K. u. Bl. n. 186. — Schl. Rev. I. p. 39. — Mus. Hein. I. n. 13. — Rüpp. S. Ueb. n. 193. — Degl. u. G. n. 185. — Br Thierl. III. p. 797. — Heugl. N. O. Afr. n. 331. —

173. Turdus atrigularis. Temm.

Sibirien. — [Im October 1844 bei Namur vorgekommen: Dubois. In Baiern: Jäckel. Bei Prag: Fritsch.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 75. — N. V. D. t. 69. f. 1—2. — t. 361. f. 1—2.

2) Eier:

Temm Man. I. p. 169. — M. u. W. I. p. 203. — Schinz. p. 164. — N. V. D. II. p. 310. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 38. — K. u. Bl. n. 184. — Schl. Rev. I. p. 41. (part.) — Mus. Hein. I. n. 17. — Degl. u. G. n. 189. — Heugl. N. O. Afr. n. 334. —

Cab. Journ. 1862. p. 386. —

174. Turdus ruficollis. Pall.

Nord-Asien. — [Dann und wann in Europa vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 360. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. I. p. 452. n. 93. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 37. — K. u. Bl. n. 182. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 41. Mit T. atrigularis Temm. zusammengezogen. — Degl. u. G. n. 188. —

Cab. Journ. 1867. p. 109. — 1868. p. 172. — 1870. p. 62. —

175. Turdus Naumanni. Temm.

Asien. — [Nach Bonaparte und Degland in Ungarn vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 358. —

2) Eier:

Temm. Man. I. p. 170. — Bp. Consp. I. Gen. 581. n. 6. — N. V. D. II. p. 288. — Mus. Hein I. n. 16. — Degl. u. G. n. 187. — Schl. Rev. I. p. 39. (part.) —

Cab. Journ. 1870. p. 61. —

176. Turdus fuscatus. Pall.

Asien. — [Nach Degland in Europa vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 514. — Gould. t. 79. — N. V. D. t. 68. f. 1—2. — ?

2) Eier:

Pall. Zoogr. I. p. 451. n. 92. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 7. — K. u. Bl. n. 184. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 38. (part.) — Degl. u. G. n. 186.

Cab. Journ. 1862. 388. — 1868. p. 174. — 1870. p. 61. —

177. Turdus iliacus. L.

Island. Schweden. Lappland. Lofodden: Barth. — [Ganz Europa. Nord-Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 51. — Gould. t. 78. f. 1—2. — N. V. D. t. 67. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 10. a b c. — Bäd. t. 75. f. 4. —

L. S. XII. p. 292. n. 3. — Gessn. Av. p. 760. — Pall. Zoogr. I. p. 456. n. 97. — M. u. W. I. p. 196. — Schinz. p. 162. n. 2. — Br. Lehrb. p. 297. — N. V. D. II. p. 276. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 10. — K. u. Bl. n. 181. — Schl. Rev. I. p. 40. — Mus. Hein. I. n. 14. — Degl. u. G. n. 193. — Br. Thierl. III. p. 798. —

N. 1852. H. I. p. 80. —

178. Turdus musicus. L.

Nord- und Mittel-Europa. — [Ganz Europa. Nord-Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 406. — Gould. t. 78. f. 1. — N. V. D. t. 66. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 8. a b c. — Bäd. t. 75. f. 3. —

L. S. XII. p. 292. n. 4. — Pall. Zoogr. I. 455. n. 96. — M. u. W. I. p. 195. — Schinz. p. 161. n. 3. — Br. Lehrb. p. 294. — N. V. D. II. p. 262. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 9. — K. u. Bl. n. 183. — Schl. Rev. I. p. 40. Mus. Hein. I. n. 11. — Rüpp. S. Ueb. n. 191. — Degl. u. G. n. 194. — Br. Thierl. III. p. 796. — Heugl. N. O. Afr. n. 333. —

179. Turdus solitarius. Wils.

Nord-Amerika. — [Am 22. December 1825 in Anhalt geschossen: Naumann.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 58. — t. 419. — N. V. D. t. 355. f. 2. — Wils. Am. Orn. t. 43. f. 2. —

2) Eier:

Audub. Orn. Biogr. p. 303. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 120. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 12. — K. u. Bl. n. 191. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 40. — II. p. 70. — Mus. Hein. I. n. 38. — Degl. u. G. n. 196. — Wigm. Arch. 1847. p. 205. —

180. Turdus minor. Gm.

Nord-Amerika. — [Ist in Belgien erlegt worden: Dubois.]

Abbild. 1) Vogel: Vieill. Ois. Am. t. 63. — Richards. Faun. bor. t. 36.

2) Eier: Bäd. t. 75. f. 6.

Gm. L. S. p. 809. n. 32. — Schinz. p. 163. n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 13. — K. u. Bl. n. 191. Anmerk. — Mus. Hein. I. n. 37. —

Rhea. H. II. p. 199. —

181. Turdus mustelinus. Wils.

Nord-Amerika. — [Hat sich schon nach Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 43. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 7. — Bäd. t. 75. f. 7. —

Wils u. Bp. Nat. Hist. II. p. 122. — Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 14. —

182. Turdus migratorius L.

Nord-Amerika. — [Nach mehreren Angaben in Deutschland vorgekommen, z. B. im December 1851 in Meiningen: Cabanis.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 556. f. 1. — Wils. Am. Orn. t. 2. f. 2. — Gould. t. 74. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 5. — Bäd. t. 75. f. 5. —

L. S. XII. p. 292. n. 6. — Bp. Consp. I. Gen. 572. — n. 29. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 112. — IV. p. 307. — K. u. Bl. n. 191. — Schl. Rev. I. p. 39. — Mus. Hein. I. n. 27. — Degl. u. G. n. 184. —

Cab. Journ. 1858. p. 178. —

183. Turdus olivaceus. L.

Afrika. — [Soll in der Lombardei vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Levaill. Ois. d'Afr. t. 98—99. —

2) Eier:

Bp. Consp. I. Gen. 572. n. 30. — Mus. Hein. I. n. 23. — Rüpp. S. Ueb. n. 194. — Degl. u. G. n. 183. —

184. Turdus pallidus. Gm.

Nord-Asien. — [Im October 1849 bei Namur beobachtet: Dubois.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 515. — N. V. D. t. 357. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. I. p. 457. n. 98. — Gm. L. S. p. 815. n. 45. — Br. Lehrb. p. 972. — Bp. Consp. I. Gen. 571. n. 33. — n. 35. — K. u. Bl. n. 189. — Schl. Rev. I. p. 40. — Mus. Hein. I. n. 15. — Degl. u. G. n. 182. —

Cab. Journ. 1854. p. 285. Nest und Eier. — 1863. p. 32. —

185. Monticola cyanea. Cab.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Italien. Schweiz. Griechenland. Türkei. Algerien: Loche. Palästina: Tristam. Klein-Asien.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 250. — Gould. t. 87. — N. V. D. t. 72. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 3. a. — (b scheint falsch zu sein.) — Bäd. t. 27. f. 11. —

L. S. XII. p. 296. n. 24. — M. u. W. I. p. 203. — Schinz. p. 168. n. 1. — Br. Lehrb. p. 303. — N. V. D. II. p. 341. — Bp. Consp. I. Gen. 629. n. 3. — K. u. Bl. n. 180. — Schl. Rev. I. p. 32. — Mus. Hein. I. n. 51. — Rüpp. S. Ueb. n. 187. — Degl. u. G. n. 206. — Br. Thierl. III. p. 791. — Heugl. N. O. Afr. n. 323. —

Cab. Journ. 1862. p. 274. — 1869. p. 34. —

186. Monticola saxatilis. Boie.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Schweiz. Italien Böhmen: Fritsch. Schlesien. Griechenland. Türkei. Algerien: Loche. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 262. — Gould. t. 86. — N. V. D. t. 73. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 24. f. 1. a b. — Bäd. t. 27. f. 10. —

L. S. XII. p. 294. n. 14. — M. u. W. I. p. 200. — Schinz. p. 167. — Br. Lehrb. p. 304. — N. V. D. II. p. 343. — Bp. Consp. I. Gen. 628. n. 1. — K. u. Bl. n. 179. — Schl. Rev. I. p. 32. — Mus. Hein. I. n. 49. — Rüpp. S. Ueb. n. 188. — Hartl. W. Afr. n. 235. — Degl. u. G. n. 205. — Br. Thierl. III. p. 789. — Heugl. N. O. Afr. n. 322. —

Cab. Journ. 1862. p. 274. — 1869. p. 34. —

187. Bessornis gutturalis. Gr.

Klein-Asien. — [Syrien. Palästina. Nord-Ost-Afrika: Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Ibis 1867. t. 1. —

2) Eier: — Beschr. Cab. Journ. 1869. p. 43. —

Guér. Rev. Zool. 1843. p. 162. — De Filippi Arch. p. Zool. II. 1863. p. 381. — Bp. Consp. I. Gen. 644. n. 9. — Heugl N. O, Afr. n. 329. —

Cab. Journ. 1866. p. 49. — 1869. p. 39. —

188. Saxicola oenanthe. Bechst.

Europa mit Ausnahme der Iberischen Halbinsel. Algerien: Loche. Klein-Asien. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 554. f. 1—2. — Gould. t. 90. — N. V. D. t. 89. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 23. f. 2. abc. Nicht wie auf der Tafel steht: f. 3. abc. (Fig. 3. = S. leucura.) — Bäd. t. 27. f. 14. —

L. S. XII. p. 332. n. 15. — Pall. Zoogr. I. p. 472. n. 112. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 217. — M. u. W. I. p. 251. b. — Schinz. p. 170. n. 2. — Br. Lehrb. p. 309. — N. V. D. III. p. 863. — K. u. Bl. n. 244. — Schl. Rev. I. p. 33. — Mus. Hein. I. n. 65. — Bp. Consp. I. Gen. 648. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 161. — Hartl. W. Afr. n. 191. — Degl. u. G. n. 207. — Br. Thierl. III. p. 783. — Heugl. N. O. Afr. n. 295. —

189. Saxicola saltatrix. K. u. Bl.

Cykladen. Süd-Russland. Klein-Asien. Abyssinien: Heuglin.

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 34. f. 6. —

2) Eier:

Ménétr. Cat. p. 30. n. 56. — Pall. Zoogr. I. p. 474. n. 113. — Bp. Consp. I. Gen. 648. n. 3. — 2. (part.) — K. u. Bl. n. 245. — Schl. Rev. I. p. 33. — II. p. 65. — Rüpp. S. Ueb. n. 159. — Degl. u. G. n. 208. — Br. Thierl. III. p. 783. — Heugl. N. O. Afr. n. 292. —

Ibis. 1860. p. 247. — 1867. p. 94. — Cab. Journ. 1863. p. 307. — 1864. p. 276. — 1868. p. 27. — 1869. p. 35. — p. 157. —

190. Saxicola aurita. Temm.

Süd-Europa nördlich bis zur Schweiz. Algerien: Loche. — [West und Süd-Afrika. Klein-Asien. Syrien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 92. — N. V. D. t. 376. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 23. f. 5. abc. — Bäd. t. 27. f. 16. —

Temm. Man. I. p. 241. — Briss. Orn. III. p. 457. — Schinz. p. 171. n. 2. — N. V. D. XIII. p. 134. — K. u. Bl. n. 246. (part.) — Schl. Rev. I. p. 34. — II. p. 67. — Mus. Hein. I. n. 67. — Hartl. W. Afr. n. 193. — Bp. Consp. I. Gen. 648. n. 5. — Degl. u. G. n. 210. — Br. Thierl. III. p. 784. — Heugl. N. O. Afr. n. 296. —

Cab. Journ. 1858. p. 67. — 1863. p. 307.

191. Saxicola stapazina. Temm.

Süd-Europa. Algerien: Loche. — [West-Asien: Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 91. — N. V. D. t. 90. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 23. f. 4. abc. — Bäd. t. 27. f. 15. —

Temm. Man. I. p. 241. — L. S. XII. p. 331. n. 14. — Schinz. p. 171.

n. 1. — Br. Lehrb. p. 310. — N. V. D. III. p. 879. — XIII. p. 131. — Bp. Consp. I. Gen. 648. n. 4. — K. u. Bl. n. 246. (part.) — Schl. Rev. I. p. 33. — Mus. Hein. I. n. 66. — Rüpp. S. Ueb. n. 162. — Degl. u. G. n. 209. — Br. Thierl. III. p. 784. — Heugl. N. O. Afr. n. 297. —

Cab. Journ. 1858. p. 67. — 1864. p. 276. — 1869. p. 162. —

192. Saxicola leucomela. K. u. Bl.

Süd-Russland, (Wolga). — [Ural. Syrien. Klein-Asien. Daurien. Indien: Jerdon.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 89. —

2) Eier: Thien. t. 23. f. 6. a b c. — Bäd. t. 27. f. 17. —

Pall. Zoogr. I. p. 479. n. 117. — Temm. Man. I. p. 243. — Schinz p. 172. n. 1. — Br. Lehrb. p. 313. — Bp. Consp. I. Gen. 648. n. 6. — K. u. Bl. n. 247. — Schl. Rev. I. p. 34. — II. p. 67. — Rüpp. S. Ueb. n. 152. — Degl. u. G. n. 211. — Heugl. N. O. Afr. n. 300. —

193. Saxicola lugens. Licht.

Egypten. Arabien: Heuglin. — [Griechenland: von der Mühle.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 257. f. 3. —

2) Eier:

Temm. Man. III. p. 166. — Licht. Doubl. p. 33. n. 364. — Bp. Consp. I. Gen. 648. n. 7. — K. u. Bl. n. 247. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 67. — Mus. Hein. I. n. 69. — Rüpp. S. Ueb. n. 156. — Degl. u. G. n. 211. A. — Heugl. N. O. Afr. n. 301. —

194. Saxicola isabellina. Temm.

Algerien. — [In Europa noch nicht mit Sicherheit beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 395. f. 1. — t. 472. f. 1. — Rüpp. Atl. t. 34. f. a. (fem.) —

2) Eier:

Lefeb. Abyss. Ois. p. 92. — Bp. Consp. I. Gen. 647. n. 4. — Mus. Hein. I. n. 63. — Rüpp. S. Ueb. n. 152. — Heugl. N. O. Afr. n. 307. —

Cab. Journ. 1864. p. 391. — 1869. p. 156. —

195. Saxicola leucura. Licht.

Spanien. Algerien. Cykladen: Erhard.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 88. — N. V. D. t. 375. f. 1—2.

2) Eier: Thien. t. 23. f. 3. a b c. Auf der Tafel fälschlich mit f. 2. a b c. = S. oenanthe, angegeben. — Peterm. Geogr. Mitth. 1861. p. 312. —

Gm. L. S. p. 820. n. 66. — Temm. Man. I. p. 256. — Licht. Catal. p. 32. — Schinz. p. 170 n. 1. — Bp. Consp. I. Gen. 647. n. 5. — K. u. Bl. n. 248. — Schl. Rev. I. p. 34. — Rüpp. S. Ueb. n. 151. — Mus. Hein. I. n. 64. — Degl. u. G. n. 212. — Heugl. N. O. Afr. n. 310.

Cab. Journ. 1858. p. 395. — 1858. p. 55. — 1861. p. 112. — 1863. p. 307. — 1865. p. 44. — 1869. p. 153. —

196. Pratincola rubicola. Koch.

Portugal und Spanien, sehr häufig. Westphalen. Böhmen: Fritsch. Steiermark. Galizien. Macedonien. Algerien: Loche. — [Teneriffa. Sibirien: von Middendorff. Klein-Asien. Palästina.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 678. — Gould. t. 94. — N. V. D. t. 90. f. 3—5. —

2) Eier: Thien t. 23. f. 7. ab. — Bäd. t. 27. f. 12. —

L. S. XII. p. 332. n. 17. — Bechst. Nat. D. III. p. 694. — M. u. W. I. p. 253. a. — Schinz. p. 173. — Br. Lehrb. p. 315. — N. V. D. III. p. 885. — Bp. Consp. I. Gen. 650. n. 4. — K. u. Bl. n. 243. — Anmerk. = P. Hemprichi. — Schl. Rev. I. p. 35. — Mus. Hein. I. n. 75. — Rüpp. S. Ueb. n. 164. — Hartl. W. Afr. n. 199. — Degl. u. G. n. 214. — Br. Thierl. III. p. 779. — Heugl. N. O. Afr. n. 285. — n. 286. — P. Hemprichi. —

197. Pratincola rubetra. Koch.

Alle ebenen Gegenden Europas. Algerien: Loche. — [Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 678. f. 2. — Gould. t. 93. — N. V. D. t. 89. f. 3.—4. —

2) Eier: Thien. t. 23. f. 8. abc. — Bäd. t. 27. f. 13. —

L. S. XII. p. 332. n. 16. — Bechst. Nat. D. III. p. 684. — Koch. Baier. Zool. I. p. 191. n. 112. — M. u. W. I. p. 252. b. — Schinz. p. 172. n. 2. — Br. Lehrb. p. 314. — N. V. D. III. p. 903. — Bp. Consp. I. Gen. 650. n. 1. — K. u. Bl. n. 242 — Schl. Rev. I. p. 34. — Mus. Hein. I. n. 74. — Rüpp. S. Ueb. n. 165. — Hartl. W. Afr. n. 200. — Degl. u. G. n. 213. — Br. Thierl. III. p. 779. — Heugl. N. O. Afr. n. 284. —

198. Ruticilla phoenicurus. Bp.

Ganz Europa. — [Nord- und West-Afrika. Indien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 351. f. 2 — Gould. t. 95. — N. V. D. t. 79. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 22. f. 9. ab. — Bäd. t. 27. f. 8. —

L. S. XII. p. 335. n. 34. — Lath. Ind. Orn. II. p. 511. n. 15. — M. u. W. I. p. 244. — Schinz. p. 191. n. 1. — Br. Lehrb. p. 348. — N. V. D. III. p. 510. — Bp. Consp. I. Gen. 627. n. 1. — K. u. Bl. n. 239. — Schl. Rev. I. p. 31. — Rüpp. S. Ueb. n. 142. — Hartl. W. Afr. n. 205. — Mus. Hein. I. n. 7. — Degl. u. G. n. 202. — Br. Thierl. III. p. 778. — Heugl. N. O. Afr. n. 276.

199. Ruticilla erythrogaster. Br.

Daurien (Ufer des Onon): Dybowski. — [Nach Degland in Ost-Europa vorkommend.]

Abbild. 1) Vogel: Güld. Nov. Comm. Petr. XIX. (1775) t. 16. — t. 17.

2) Eier:

Güld. Nov. Comm. Petr. XIX. (1755.) p. 469. — Pall. Zoogr. I. p 467. n. 116. — Bp. Consp. I. Gen. 627. n. 3. — K. u. Bl. n. 241. — Degl. u. G. n. 204. —

200. Ruticilla erythronotus. Gray.

Asien. — [Soll in Russland vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Addend. Pall. Zoogr. Fasc. II. — Midd. Sib. Reise II. t. 15. f. 3. —

2) Eier:

Bp. Consp. I. Gen. 627. n. 12. — Midd. Sib. Reise p. 175. —

201. Ruticilla Moussieri. Tristr.

Algerien. — [Soll in Spanien vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: N. 1853. t. 1 (mas. et. fem.)

2) Eier:

L. Galliard. N. 1852. H. III. p. 63. — Cab. Journ. 1853. p. 266.

202. Ruticilla tithys. Br.

Europa, mit Ausschluss des hohen Nordens. Im Süden selten. Algerien: Loche.

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 96. — N. V. D. t. 79. f. 3–4.

2) Eier: Thien. t. 22. f. 8. abc. — Bäd. t. 27. f. 9. —

L. S. XII. p. 335. n. 35. — Scop. Ann. I. p. 157. n. 233. — M. u. W. I. p. 241. — Schinz. p. 190. — Br. Lehrb. p. 350. — N. V. D. III. p. 525. — Bp. Consp. I. Gen. 627. n. 2. — K. u. Bl. n. 240. — Schl. Rev. I. p. 31. — Rüpp. S. Ueb. n. 143. — Mus. Hein. I. n. 8. — Degl. u. G. n. 203. — Br. Thierl. III. p. 775. — Heugl. N. O. Afr. n. 278. —

203. Accentor alpinus. Bechst.

Höhere Gebirge Süd- und Mittel-Europa's. Am Ochotskischen Meere: von Middendorff.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 668. f. 2. — Gould. t. 99. — N. V. D. t. 92. f. 1. — t. 378. f. 1.

2) Eier: Thien. t. 23. f. 12. ab. — Bäd. t. 27. f. 2.

Gm. L. S. p. 957. n. 65. — Bechst. Nat. D. III. p. 700. — Scop. Ann. I. p. 131. n. 192. — M. u. W. I. p. 253. b. — Schinz. p. 196. — Br. Lehrb. p. 254. — N. V. D. III. p. 941. — XIII. p. 144. — Bp. Consp. I. Gen. 652. n. 1. — K. u. Bl. n. 194. — Schl. Rev. I. p. 43. — Mus. Hein. I. n. 213. — Degl. u. G. n. 216. — Br. Thierl. III. p. 914. —

204. Accentor modularis. Cuv.

England, häufig. Schweiz. Westphalen, häufig. Bei Frankfurt a/M. Thüringen. Pommern. — [Ganz Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. Nord-Afrika: Brehm. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 615. f. 1. — Gould. t. 100. — N. V. D. t. 92. f. 3—4. —

2) Eier: Thien. t. 23. f. 13. ab. — Bäd. t. 27. f. 2. —

Cuv. Règne an. I. p. 388. — L. S. XII. p. 329. n. 3. — Briss. Orn. III. p. 374. — n. 12. — Schinz. p. 197. n. 1. — Br. Lehrb. p. 255. — N. V. D. III. p. 951. — Bp. Consp. I. Gen. 652. n. 6. — K. u. Bl. n. 196. — Schl. Rev. I. p. 44. — Mus. Hein. I. n. 214. — Degl. u. G. n. 217. — Br. Thierl. III. p. 912. — Heugl. N. O. Afr. n. 275.

205. Accentor montanellus. Temm.

Asien. — [Soll in Dalmatien und Italien und nach einer andern Angabe bei Wien vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 101. — N. V. D. t. 92. f. 2. —

2) Eier:

Pall. It. III. app. p. 695. n. 12. — Pall. Zoogr. I. p. 471. — Temm. Man. I. p. 251. — Schinz. p. 197. n. 2. —Br. Lehrb. p. p. 256. — N. V. D. III. p. 949. — Bp. Consp. I. Gen. 652. n. 9. — K. u. Bl. n. 195. — Schl. Rev. I. p. 43. — Midd. Sib. Reise II. p. 172. — Degl. u. G. n. 218. — Br. Thierl. n. 913. —

206. Melodes Calliope. K. u. Bl.

Oestliches Sibirien. — [Hat sich nach Temminck nach Russland, und nach Degland nach Frankreich verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 118. —

2) Eier: Midd. Sib. Reise II. t. 15. f. 2. Wohl etwas zu blau. —

Pall. It. III. app. p. 698. n. 17. — Pall. Zoogr. I. p. 483. n. 119. — Temm. Man. III. p. 173. — Schinz p. 198. — Bp. Consp. I. Gen. 624. n. 1. — K. u. Bl. n. 236. — Schl. Rev. I. p. 32. — Mus. Hein. I. n. 4. — Midd. Sib. Reise II. p. 174. Fortpflanzung. — Degl. u. G. n. 215. — Br. Thierl. III. p. 769. —

207. Lusciola suecica. K. u. Bl.

Schweden. Norwegen. Pommern. Mittel-Deutschland. Nord- und Ost-Sibirien: von Middendorff. — [Algerien: Loche. Palästina: Tristram. Indien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 361. f. 2. — t. 610. f. 1—3. — Gould. t. 97. — N. V. D. t. 75. f. 3—5. — t. 355. — t. 356. —

2) Eier: Thien t. 22. f. 7. a b c. — Bäd. t. 27. f. 6. — f. 7. —

L. S. XII. p. 336. n. 37. — Pall. Zoogr. I. p. 480. n. 118. — M. u. W. I. p. 240. — Schinz p. 191. n. 2. — Br. Lehrb. p. 341. — p. 344. — N. V. D. II. p. 414 — Bp. Consp. I. Gen. 626. n. 1. — K. u. Bl. n. 237. — Schl. Rev. I. p. 32. — II. p. 65. — Mus. Hein. I. n. 5. — Midd. Sib. Reise II. p. 177. — Rüpp. S. Ueb. n. 140. — Degl. u. G. n. 201. — n. 201. A. = L. suecica orientalis. Schl. — Br. Thierl. III. p. 765. — Heugl. N. O. Afr. n. 281. —

208. Lusciola luscinia. K. u. Bl.

Europa bis Mittel-Schweden. Algerien: Loche. — [Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 615. f. 2. — Gould. t. 116. — N. V. D. t. 74. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 2. a b c. — Bäd. t. 27. f. 4. —

L. S. XII. p. 328. n. 1. — M. u. W. I. p. 221. — Schinz. p. 180. n. 2. — Br. Lehrb. p. 322. — N. V. D. II. p. 373. — Bp. Consp. I. Gen. 623. n. 1. — K. u. Bl. n. 234. — Schl. Rev. I. p. 31. — II. p. 62. — Rüpp. S. Ueb. n. 136. — Mus. Hein. I. n. 1. — Degl. u. G. n. 199. — Br. Thierl. III. p. 758. — Heugl. N. O. Afr. n. 282. —

209. Lusciola philomela. K. u. Bl.

Schweden. Ungarn. Galizien. Steiermark, selten. Polen. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 117. — N. V. D. t. 74. f. 1. —
2) Eier: Thien. t. 21. f. 1. a b c. — Bäd. t. 27. f. 3. —

Bechst. Nat. D. III. p. 507. — Briss. Orn. III. p. 400. — Pall. Zoogr. I. p. 486. n. 122. — M. u. W. I. p. 222. — Br. Lehrb. p. 323. — Schinz. p. 181. n. 1. — N. V. D. II. p. 362. — Bp. Consp. 1. Gen. 623. n. 2. — K. u. Bl. n. 233. — Schl. Rev. I. p. 30. — Mus. Hein. I. n. 2. — Br. Thierl. III. p. 759. — Degl. u. G. n. 200. — Heugl. N. O. Afr. n. 283. —

210. Erythacus rubecula. Cuv.

Ganz Europa. Im Süden (Portugal) selten. — [Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 361. f. 1. — Gould. t. 98. — N. V. D. t. 75. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 22. f. 6. a b c. — Bäd. t. 27. f. 5. —

L. S. XII. p. 337. n. 45. — Boie Isis 1826. p. 972. — Gessn. Av. p. 729. — M. u. W. I. p. 238. — Schinz. p. 192. — Br. Lehrb. p. 351. — N. V. D. II. p. 397. — Bp. Consp. I. Gen. 625. n. 1. — K. u. Bl. n. 238. — Mus. Hein. I. n. 3. — Rüpp. S. Ueb. n. 141. — Schl. Rev. I. p. 32. — Br. Thierl. III. p. 770. — Degl. u. G. n. 198. — Heugl. N. O. Afr. n. 280. —

211. Sylvia nisoria. Bechst.

Mittel-Europa. Nördlich bis Süd-Schweden. Südlich bis zur Schweiz. (Deutschland häufig.) — [Nord-Afrika. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 128. — N. V. D. t. 76. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 20. f. 3. a b c. — Bäd. t. 51. f. 14. Sehr treu. —

Bechst. Nat. D. III. p. 547. — M. u. W. I. p. 227. — Schinz. p. 182. n. 2. — Br. Lehrb. p. 326. — N. V. D. II. p. 430. — Bp. Consp. I. Gen. 621. — K. u. Bl. n. 232. — Schl. Rev. I. p. 23. — Mus. Hein. I. n. 234. — Br. Thierl. III. p. 837. — Degl. u. G. n. 226. — Heugl. N. O. Afr. n. 258. —

212. Sylvia hortensis. Lath.

Ganz Europa; im Süden selten oder fehlend. — [Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 579. f. 2. — Gould. t. 121. — N. V. D. t. 78. f. 3. —
2) Eier: Thien. t. 20. f. 2. a—c. — Bäd. t. 51. f. 11. —

Bechst. Nat. D. III. p. 524. — M. u. W. I. p. 224. — Schinz. p. 186. n. 1. — Br. Lehrb. p. 328. — N. V. D. II. p. 478. — Bp. Consp. 1. Gen. 620. n. 2. — K. u. Bl. n. 231. — Schl. Rev. I. p. 25. — — Mus. Hein. I. n. 240. — Hartl. W. Afr. n. 744. — Br. Thierl. III. p. 841. — Degl. u. G. n. 220. — Heugl. N. O. Afr. n. 252. —

213. Sylvia atricapilla. Lath.

Mittel-Europa. Canaren: Bolle. Klein-Asien. — [Süd-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 580. f. 1—2. — Gould. t. 120. — N. V. D. t. 77. f. 2—3. — t. 357. —

2) Eier: Thien. t. 20. f. 1. a b. — Bäd. t. 51. f. 12. —

Lath. Ind. Orn. II. p. 508. n. 6. — Gm. L. S. I. p. 970. n. 18. — Briss. Orn. III. p. 380. n. 6. — M. u. W. I. p. 223. — Schinz. p. 183. — Br. Lehrb. p. 329. — N. V. D. II. p. 492. — XIII. p. 64. = S. ruficapilla Naum. — Bp. Consp. I. Gen. 620. n. 1. — K. u. Bl. n. 228. — Schl. Rev. I. p. 25. — Mus. Hein. I. n. 239. — Rüpp. S. Ueb. n. 132. — Br. Thierl. III. p. 814. — Degl. u. G. n 219. — Heugl. N. O. Afr. n. 253. —

214. Sylvia Rueppelli. Temm.

Klein-Asien. — [Griechenland, sehr selten. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 245. f. 1. — Gould. t. 122. — Rüpp. Atl. t. 19. — N. 1854. t. 4. —

2) Eier: Thien. t. 22. f. 1. a b c. Falsch. — Bäd. t. 51. f. 13. Falsch. Eier von Krüper aus Klein-Asien sehen aus wie die auf t. 51. f. 4. als S. melanocephala zugehörig, abgebildeten. —

Temm. Man. III. p. 129. — Rüpp. Mus. Senk. II. p. 181. — Schinz. p. 185. n. 2. — Bp. Consp. I. Gen. 620. n. 2. — K. u. Bl. n. 229. — Schl. Rev. I. p. 25. — Rüpp. S. Ueb. n. 135. — Br. Thierl. III. p. 853. — Degl. u. G. n. 228. — Heugl. N. O. Afr. n. 257. —

Cab. Journ. 1853. p. 477. — 1861. p. 279. — 1865. p. 43.

215. Sylvia cinerea. Lath.

Ganz Europa. Klein-Asien. — [Nord-Afrika Canaren.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 579. f. 3. — Gould. t. 125. f. 1. — N. V. D. t. 78. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 20. f. 6. a—d. — Bäd. t. 51. f. 9. —

Briss. Orn. III. p. 376. n. 4. — L. S. XII. p. 330. n. 9. — Lath. Ind. Orn. I. p. 514. — M. u. W. I. p. 225. n. 5. — n. 6. — Schinz. p. 186. n. 2. — Br. Lehrb. p. 330. — N. V. D. II. p. 464. — Bp. Consp. I. Gen. 619. n. 2. — K. u. Bl. n. 230. — Schl. Rev. I. p. 23. — Rüpp. S. Ueb. n. 133. — Mus. Hein. I. n. 233. — Br. Thierl. III. p. 846. — Degl. u. G. n. 223. — Heugl. N. O. Afr. n. 249. —

216. Sylvia conspicillata. La Marm.

Portugal. Spanien. Sardinien. Italien. — [Griechenland: von der Mühle.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 6. f. 1. — Gould. t. 126. —

2) Eier: Thien. t. 20. f. 8. a b. — Bäd. t. 51. f. 6. (?) —

Temm. Man. I. p. 210. — Schinz p. 188. n. 1. — p. 431. n. 4. — Br. Lehrb. p. 333. — Bp. Consp. I. Gen. 619. n. 3. — K. u. Bl. n. 221. — Schl. Rev. I. p. 33. — Mus. Hein. I. n. 236. — Br. Thierl. III. p. 848. — Degl. u. G. n. 225. —

217. Sylvia provincialis. Temm.

Portugal. Spanien. England. Süd-Frankreich. Italien. Griechenland. — [Klein-Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 655. f. 1. — Gould. t. 129. —

2) Eier: Thien. t. 20. f. 10. ab. Unkenntlich. — Bäd. t. 51. f. 3. — Cab. Journ. 1856. t. 1. f. 4. —

Gm. L. S. p. 958. n. 67. — Lath. Ind. Orn. II. p. 517. n. 31. — Temm. Man. I. p. 211. — Br. Lehrb. p. 339. — Schinz. p. 189. n. 1. — K. u. Bl. n. 223. — Schl. Rev. I. p. 24. — Bp. Consp. I. Gen. 617. — Mus. Hein. I. n. 229. — Br. Thierl. III. p. 856. — Degl. u. G. n. 229. — Heugl. N. O. Afr. n. 244. —

Cab. Journ. 1863. Extrh. p. 20.

218. Sylvia sarda. La Marm.

Süd-Portugal. Bei Santiago: Rios Nasceyro. Balearen: A. v. Homeyer. Sardinien. Malta. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 24. f. ?. — Gould. t. 127. —

2) Eier: Thien. t. 20. f. 5. ab. — Bäd. t. 51. f. 5. Besser. — Cab. Journ. 1856. t. 1. f. 5. —

Temm. Man. I. p. 204. — La Marm. Mem. Acad. Torino. 1829. — Br. Lehrb. p. 337. — Schinz. p. 184. n. 2. — K. u. Bl. n. 224. — Schl. Rev. I. p. 24. — Bp. Consp. I. Gen. 618. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 232. — Br. Thierl. III. p. 854. — Degl. u. G. n. 230. — Heugl. N. O. Afr. n. 245. —

Cab. Journ. 1862. p. 279. — 1863. p. 88. — Extrh. p. 20. — 1864. p. 389. —

219. Sylvia subalpina. Bonelli.

Ganz Süd-Europa. Klein-Asien. Teneriffa: Boile. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 6. f. 2. — t. 251. f. 2—3. — Gould. t. 124.

2) Eier: Thien. t. 20. f. 9. ab. — Bäd. t. 51. f. 7. Besser. —

Temm. Man. I. p. 214. — III. p. 138. — Br. Lehrb. p. 334. — p. 338. — p. 340. — Schinz. p. 189. n. 2. — K. u. Bl. n. 222. — Schl. Rev. I. p. 24. — Rüpp. S. Ueb. n. 129. — Bp. Consp. I. Gen. 619. n. 4. — Mus. Hein. I. n. 235. — Br. Thierl. III. p. 850. — Degl. u. G. n. 224. — Heugl. N. O. Afr. n. 247. — Cab. Journ. 1854. p. 454. — 1856. p. 458. —

220. Sylvia melanocephala. Lath.

Ganz Süd-Europa. — [Nord-Afrika. Süd-West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 129. —

2) Eier: Thien t. 20. f. 7. ab. (?) — Bäd. t. 51. f. 4. —

Gm. L. S. p. 970. n. 104. — Lath. Ind. Orn. II. p. 509. n. 7. — Br. Lehrb. p. 336. — Schinz. p. 184. n. 1. — K. u. Bl. n. 225. — Schl. Rev. I. p. 24. — Rüpp. S. Ueb. n. 131. — Bp. Consp. I. Gen. 618. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 230. — n. 231. — Br. Thierl. III. p. 853. — Degl. u. G. n. 227. — Heugl. N. O. Afr. n. 246. —

Cab. Journ. 1862. p. 277. — 1869. p. 37. —

221. Sylvia orphea. Temm.

Ganz Süd-Europa. Klein-Asien. — [Nord- und Mittel-Afrika. Indien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 579. f. 1. — Gould. t. 119. — N. V. D. t. 76. f. 3—4. —

2) Eier: Thien. t. 20. f. 4. a b c. — Bäd. t. 51. f. 10. —

Temm. Man. I. p. 198. — Br. Lehrb. p. 325. — Schinz. p. 182. n. 1. — N. V. D. II. p. 415. — K. u. Bl. n. 226. — Schl. Rev. I. p. 25. — Bp. Consp. I. Gen. 620. n. 4. — Mus. Hein. I. n. 238. — Br. Thierl. III. p. 839. — Degl. u. G. n. 222. Heugl. N. O. Afr. n. 251. —

Cab. Journ. 1861. p. 276. — 1862. p. 277. — 1863. p. 93. —

222. Sylvia curruca. Lath.

In Europa nördlich bis Schweden, südlich bis Nord-Italien. — [Süd-Europa. Sibirien. Klein-Asien. Nord-Afrika,]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 580. f. 3. — Gould. t. 125. f. 2. — N. V. D. t. 77. f. 1 —

2) Eier: Thien. t. 20. f 11. a - d. — Bäd. t. 51. f. 8. —

Lath. Ind. Orn. II. p. 509. n. 9. — Briss. Orn. III. p. 384. n. 7. — Pall. Zoogr. I. p. 488. n. 124. — M. u. W. I. p. 226. — Br. Lehrb. p. 332. — Schinz. p. 187. n. 1. — N. V. D. II. p. 451. — K. u. Bl. n. 227. — Schl. Rev. I. p. 24. — Rüpp. S. Ueb. n. 134. — Bp. Consp. I. Gen. 619. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 237. — Br. Thierl. III. p. 813. — Degl. u. G. n. 221. — Heugl. N. O. Afr. n. 250. —

223. Phyllopseuste rufa. Meyer.

Frankreich Schweiz. Holland. Deutschland. Russland. Norwegen. Schweden. — [Süd-Europa Nord-Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 131. f. 2. — N. V. D. t. 80. f. 4. —

2) Eier: Thien. t. 19. f. 10. a b c. — Bäd. t. 19. f. 9. —

Lath. Ind. Orn. II. p 516. n. 27. — Penn. Brit. Zool. I. p. 508. — M. u. W. I. p. 249. — Br. Lehrb. p. 374. — Schinz. p. 195. — N. V. D. III. p. 219. — K. u. Bl. n. 219. — Schl. Rev. I. p. 26. — Rüpp. S. Ueb. n. 147. — Bp. Consp. I. Gen. 606. n. 4. — Mus. Hein. I. n. 219. — Degl. u. G. n. 252. — Heugl. N. O. Afr. n. 241. —

224. Phyllopseuste trochilus. Meyer.

Ganz Europa. — [Nord-Afrika. Nord-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 651. f. 1. — Gould. t. 131. f. 1. — N. V. D. t. 80. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 19. f. 9. a b c. — Bäd. t. 19. f. 7. — f. 8. —

L. S. XII. p. 338. n. 49. — Koch. Baier. Zool. I. p. 159. n. 82. — M. u. W. I. p. 248. — Br. Lehrb. p. 373. — Schinz. p. 195. n. 1. — N. V. D. III. p. 568. — K. u. Bl. n. 217. — Schl. Rev. I. p. 25. — Bp. Consp. I. Gen. 606. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 218. — Br. Thierl. III. p. 858. — Degl. u. G. n. 251. — Heugl. N. O. Afr. n. 240. —

225. Phyllopseuste icterina. (Vieill.)

Sibirien. — [Einmal auf Helgoland erlegt: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 132. — N. V. D. t. 375. f. 1. — Midd. Sib. Reise II. t. 16. f. 1—3. —

2) Eier:

Vieill. Nouv. Dict. XI. p. 194. — Midd. Sib. Reise. II. p. 178. — Schinz. p. 194. n. 3. — K. u. Bl. n. 218. — Schl. Rev. II. p. 52. — Bp. Consp. I. Gen. 606. n. 1. — N. V. D. XIII. p. 69. —

226. Phyllopseuste sibilatrix. Boie.

Mittel- und Nord-Europa bis Süd-Schweden. — [Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 245. f. 3. — Gould. t. 131. f. 3. — N. V. D. t. 80. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 19. f. 11. a—d. — Bäd. t. 19. f. 5. —

Bechst. Nat. D. III. p. 561. — Lath. Ind. Orn. Suppl. II. p. 53. — M. u. W. I. p. 247. — Br. Lehrb. p. 370. — Schinz. p. 194. n. 2. — N. V. D. III. p. 556. — K. u. Bl. n. 216. — Schl. Rev. I. p. 26. — Rüpp. S. Ueb. n. 144. — Bp. Consp. I. Gen. 606. u. 2. — Mus. Hein. I. n. 217. — Degl. u. G. n. 253. — Heugl. N. O. Afr. n. 239. —

227. Phyllopseuste Bonellii. Bp.

Süd-Europa. Nördlich bis zur Schweiz. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 24. f. 2. — Gould. t. 134. —

2) Eier: Thien. t. 19. f. 12. a b c. — Bäd. t. 19. f. 6. —

Vieill. Encycl. Méth. Orn. II. p. 468. — Temm. Man. I. p. 227. — Br. Lehrb. p. 376. — Schinz. p. 193. n. 1. — K. u. Bl. n. 220. — Schl. Rev. I. p. 26. — Rüpp. S. Ueb. n. 146. — Bp. Consp. I. Gen. 606. n. 5. — Mus. Hein. I. n. 220. — Hartl. W. Afr. n. 184. — Degl. u. G. n. 254. — Heugl. N. O. Afr. n. 242. —

228. Phyllopseuste javanica (Horsf.).

Java. — [Im October 1854 auf Helgoland erlegt: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 3307. (Unter dem Namen: Zosterops frontalis.)

2) Eier:

Lin. Soc. XIII. p. 156. — Richards. Faun. Bor. p. 205. — Bp. Consp. I. Gen. 606. n. 10. — Mus. Hein. I. n. 619. —

N. 1856. p. 311. —

229. Pyllobasileus proregulus. Cab.

Nord-Asien. — [Wurde schon mehrfach in Europa erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 149. — N. V. D. t. 378. f. 2—3. — Cab. Journ. 1853. t. 1. —

2) Eier:

Gm. L. S. XIII. p. 975. n. 120. — Lath. Ind. Orn. II. p. 526. n. 63. — Pall. Zoogr. I. p. 499. n. 133. — K. u. Bl. n. 214. — Schl. Rev. I. p. 45.

— Bp. Consp. I. Gen. 612. n. 1. — Mus. Hein. I. p. 33. Anmerk. — N. V. D. XIII. p. 74. — Degl. u. G. n. 255. — Br. Thierl. III. p. 860.
Cab. Journ. 1853. p. 81. —

230. Hypolaïs vulgaris. Br.

Mittel- und Nord-Europa bis Skandinavien. — [Süd-Europa. Nord-Afrika.] —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 133. — N. V. D. t. 80. f. 1. —
2) Eier: Thien. t. 19. f. 3. a—d. — d. gut. — Bäd. t. 19. f. 1. —
L. S. XII. p. 330. n. 7. — M. u. W. I. p. 246. — Br. Lehrb. p. 369. — Schinz. p. 193. n. 2. — N. V. D. III. p. 540. — K. u. Bl. n. 215. — Schl. Rev. I. p. 26. — Bp. Consp. I. Gen. 605. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 241. — Br. Thierl. III. p. 861. — Degl. u. G. n. 232. — Heugl. N. O. Afr. n. 237.

231. Hypolaïs polyglotta. Gerbe.

Portugal. Spanien. Italien. Süd-Frankreich. Dalmatien. — [Berberei: Wright.]

Abbild. 1) Vogel: O. d. Murs. t. 43. f. 1. — Roux. Orn. Prov. t. 224. —
2) Eier:
Vieill. Nouv. Dict. XI. p. 200. excl. synon. — K. u. Bl. n. 218. (?) — Rev. Zool. VII. p. 440. — IX. p. 434. — Bp. Rev. crit. p. 151. — Bp. Cat. Parzud. p. 6. — Bp. Consp. I. Gen. 605. n. 4. — Degl. u. G. n. 233.
Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 91. — 1863. p. 264. —

232. Hypolaïs olivetorum. Gerbe.

Griechenland. Klein-Asien. — [Dalmatien: Feldegg.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 109. —
2) Eier: Thien. t. 19. f. 14. a b c. — Bäd. t. 19. f. 3. —
Schinz. p. 430. n. 2. — K. u. Bl. n. 202. — Schl. Rev. I. p. 27. — II. p. 56. — Bp. Consp. I. Gen. 605. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 243. — Degl. u. G. n. 234. —

233. Hypolaïs elaïca. Cab.

Griechenland. Klein-Asien. — [Dalmatien: Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: O. d. Murs. Icon. Orn. t. 58. f. 1. —
2) Eier: Thien. t. 19. f. 15. — Bäd. t. 19. f. 4. —
Schl. Rev. I. p. 26. — II. p. 53. — Bp. Consp. I. Gen. 605. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 242. — Degl. u. G. n. 236. — Heugl. N. O. Afr. p. 297. Anmerk. —
N. 1858. p. 264. —

234. Hypolaïs pallida. Gerbe.

Süd-Portugal. Süd-Spanien: Brehm. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel:
2) Eier: Bäd. t. 19. f. 2. —
Br. Thierl. III. p. 865. — Degl. u. G. n. 235. — Heugl. N. O. Afr. p. 297. Anmerk. —
N. 1858. p. 265. — Cab. Journ. 1863. p. 264. —

235. Iduna salicaria. Cab.

Asien. — [Im September 1851 auf Helgoland vorgekommen: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 375. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 9. —

Eversm. Reise p. 128. — Pall. Zoogr. I. p. 492. n. 127. — K. u. Bl. n. 235. — Schl. Rev. I. p. 30. — II. p. 60. — Bp. Consp. I. Gen. 598. n. 6. — Mus. Hein. I. p. 37. Anmerk. — N. V. D. XIII. p. 78. — Degl. u. G. n. 237.

236. Cettia sericea. Bp.

Balearen: A. v. Homeyer. — Italien. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. — [Algerien: Loche.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 635. f. 2. — Gould. t. 114. — t. 115. —

2) Eier: Thien t. 21. f. 3. a b. — Bäd. t. 19. f. 24. —

La Marm. Mem. Acad. Torino. XXV. p. 254. — Temm. Man. I. p. 197. — III. p. 126. — Br. Lehrb. p. 357. — p. 358. — Schinz. p. 176. n. 1. — p. 181. n. 2. — K. u. Bl. n. 210. — n. 211. — Schl. Rev. I. p. 29. — II. p. 59. — Bp. Consp. I. Gen. 603. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 273. — Degl. u. G. n. 243. — Heugl. N. O. Afr. n. 216. —

N. 1857. p. 409. — Cab. Journ. 1862. p. 281. — 1863. p. 81. — Extrh. p. 21. —

237. Salicaria locustella. Selby.

Mähren. Schesien. Deutschland. Gross-Britannien. — [Süd- und Mittel-Europa. Süd-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 581. f. 3. — Gould. t. 103. — N. V. D. t. 83. f. 2—3. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 8. a b c. — Bäd. t. 19. f. 21. —

Penn Brit. Zool. I. p. 518. — Lath. Ind. Orn. II. p. 515. n. 25. — M. u. W. I. p. 230. — Br. Lehrb. p. 359. — Schinz. p. 178. n. 1. — K. u. Bl. n. 203. — Schl. Rev. I. p. 28. — p. 30. — II. p. 60. — Bp. Consp. I. Gen. 587. n. 1. — Gen. 603. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 250. — N. V. D. III. p. 701. — Br. Thierl. III. p. 872. — Degl. u. G. n. 245. — n. 245. A. = S. lanceolata.

N. 1858. p. 262. — Cab. Journ. 1853. p. 42. — 1869. p. 61. — p. 322.

238. Salicaria fluviatilis. K. u. Bl.

Galizien. Umgegend von Wien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 102. — N. V. D. t. 83. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 6. a b c. Falsch. — Bäd. t. 19. f. 19. Gut. — N. 1853. p. 47. t. 2. —

M. u. W. I. p. 229. — Br. Lehrb. p. 358. n. 2. — Schinz. p. 177. n. 2. — N. V. D. III. p. 694. — K. u. Bl. n. 197. — Schl. Rev. I. p. 28. — Bp. Consp. I. Gen. 604. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 251. — Degl. u. G. n. 242. — Heugl. N. O. Afr. n. 234. —

Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 74. — 1869. p. 37. —

239. Salicaria certhiola. K. u. Bl.

Nord-Asien. — [Im August 1856 von Gätke auf Helgoland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 105. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. I. p. 509. — Temm. Man. I. p. 187. — III. p. 114. — Br. Lehrb. p. 361. n. 1. — Schinz. p. 178. n. 2. — K. u. Bl. n. 206. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 59. — N. V. D. XIII. p. 91. — Bp. Consp. I. Gen. 587. n. 1.

240. Salicaria luscinioïdes. K. u. Bl.

Italien. Ungarn (Ufer der Donau). Galizien. — [Algerien. Palästina. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 101. — N. V. D. t. 370. f. 4—5. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 12. — Bäd. t. 19. f. 20. Besser. — N. 1853. t. 2. Savi. Orn. Tosc. I. p. 270. — Temm. Man. III. p. 119. — Schinz. p. 176. n. 2. — K. u. Bl. n. 198. — Schl. Rev. I. p. 28. — N. V. D. XIII. p. 474. — p. 87. — Bp. Consp. I. Gen. 604. n. 1. — Degl. u. G. n. 241. — Heugl. N. O. Afr. n. 235. —

N. 1853. p. 47. — Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 48. —

241. Aëdon galactodes. Boie.

Süd-Europa. Nord-Afrika. Klein-Asien. — [Hat sich nordwärts bis Helgoland verflogen: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 251. f. 1. — Gould. t. 112. — N. V. D. t. 367. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 4. a b c — Bäd. t. 19. f. 22. Zu dunkel.

Temm. Man. I. p. 182. — III. p. 129. — Boie Isis. 1826. p. 972. — Ménétr. Cat. p. 32. n. 60. — Br. Lehrb. p. 305. — Schinz. p. 431. n. 2. — p. 185. n. 1. — N. V. D. XIII. p. 62. — Bp. Consp. I. Gen. 599. n. 1. — n. 2. — K. u. Bl. n. 207. — Schl. Rev. I. p. 29. — II. p. 58. — Mus. Hein. I. n. 256. — n. 258. — Br. Thierl. III. p. 763. — Degl. u. G. n. 231. — Heugl. N. O. Afr. n. 218. —

Cab. Journ. 1853. p. 457. — 1858. p. 51. — 1863. p. 232. — p. 263. — 1861. p. 331. — 1869. p. 38. —

242. Calamodyta melanopogon. Bp.

Italien. — [Sardinien: Salvadori. Dalmatien und Süd-Ungarn: Blasius.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 245. f. 2. — Gould. t. 111. f. 1. —

2) Eier:

Temm. Man. III. p. 121. — Schinz. p. 176. n. 2. — K. u. Bl. n. 209. — Schl. Rev. I. p. 29. — Bp. Consp. I. Gen. 601. n. 4. — Degl. u. G. n. 244. —

243. Calamodyta phragmitis. Bp.

Ganz Europa. — [Nord-Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 110. — N. V. D. t. 82. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 10. a b c. — Bäd. t. 19. f. 17. —

Bechst. Nat. D. III. p. 635. — L. Faun. Succ. p. 89. n. 246. — M. u. W. I. p. 234. — Br. Lehrb. p. 362. — Schinz. p. 179. n. 2. — K. u. Bl. n. 204. — Schl. Rev. I. p. 28. N. V. D. III. p. 648. — Rüpp. S. Ueb. n. 125. f.

— Bp. Consp. I. Gen. 601. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 252. — Br. Thierl. III. p. 871. — Degl. u. G. n. 247. — Heugl. N. O. Afr. n. 233. —

244. Calamodyta aquatica. Bp.

Süd-Frankreich. Italien, häufig. Braunschweig. Anhalt, selten. Canaren: Bolle. Algerien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 111. f. 2. — N. V. D. t. 82. f. 4. — 5. — f. 2—3. = C. carriceti.

2) Eier: Thien. t. 21. f. 11. a b c. — Bäd. t. 19. f. 18. ? —

Lath. Ind. Orn. II. p. 510. n. 11. — Scop. Ann. I. p. 235. — M. u. W. I. p. 232. — Schinz. p. 179. n. 1. — p. 180. n. 1. — K. u. Bl. n. 205. — n. 206. = S. cariceti Naum. — Schl. Rev. I. p. 28. — II. p. 58. = S. cariceti Naum. — N. V. D. III. p. 668. — p. 686. = S. cariceti. Naum. — XIII. p. 81. = S. cariceti Naum. — Bp. Consp. I. Gen. 601. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 253. — n. 254. = S. carriceti Naum. — Degl. u. G. n. 248. — Heugl. N. O. Afr. n. 232. —

245. Calamoherpe turdina. Glog.

In Europa nördlich bis Skandinavien; südlich bis Spanien. Algerien: Loche. Asien.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 513. — Gould. t. 106. — N. V. D. t. 81. f. 1.

2) Eier: Thien. t. 21. f. 5. a b c. — Bäd. t. 19. f. 10. —

Gm. L. S. p. 834. n. 25. — Lath. Ind. Orn. I. p. 334. n. 28 — Temm. Man. I. p. 181. — Briss. Orn. II. p. 219. n. 6. — M. u. W. I. p. 202. — Br. Lehrb. p. 353. — Schinz. p. 174. — K. u. Bl. n. 199. — Schl. Rev I. p. 27. — N. V. D. III. p. 597. — Rüpp. S. Ueb. n. 127. — Hartl. W. Afr. n. 183. — Bp. Consp. I. Gen. 598. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 244. — Br. Thierl. III. p. 867. — Degl. u. G. n. 258. — Heugl. N. O. Afr. n. 227.

246. Calamoherpe arundinacea. Boie.

Südliches und gemässigtes Europa. Im Norden bis Schweden. Archangel. Algerien: Loche. — [Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 108. — N. V. D. t. 81. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 7. c, e, f. Die Uebrigen: a, b, d, gehören zu C. palustris. — Bäd. t. 19. f. 11 bis 15, wovon f. 11 am besten. —

Lath. Ind. Orn. II. p. 510. n. 12. — Briss. Orn. III. p. 378. n. 5. — Gm. L. S. I. p 992. n. 167. — M. u. W. I. p. 235. — Br. Lehrb. p. 354. — Schinz p. 175. n. 1. — K. u. Bl. n. 200. — Schl. Rev. I. p. 27. — N. V. D. III. p. 614. — Bp. Consp. I. Gen. 598. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 126. — Mus. Hein. I. n. 247. — Degl. u G. n. 239. — Heugl. N. O. Afr. n. 230. — N. 1858. p. 258. — Cab. Journ. 1856. p. 237. — 1863. p. 78. —

247. Calamoherpe palustris. Boie.

Gemässigtes und südliches Europa. — [West-Asien. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 109. — N. V. D. t. 81. f. 3. — Bechst. Nat. D. t. 27. = C. nigrifrons. —

2) Eier: Thien. t. 21. f. 7. a, b, d. Die Uebrigen: c, e, f, gehören C. arundinacea an. — Bäd. t. 19. f. 16. —

Bechst. Nat. D. III. p. 639. — p. 575. = C. nigrifrons. — M. u. W. I. p. 237. — Br. Lehrb. p. 356. — Schinz. p. 175. n. 2. — N. V. D. III. p. 630. — K. u. Bl. n. 201. — Schl. Rev. I. p. 27. — II. p. 55 = C. nigrifrons. — Rüpp. S. Ueb. n. 125. e. — Bp. Consp. I. Gen. 598. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 248. — Degl. u. G. n. 240. — Heugl. N. O. Afr. n. 229. —

248. Cisticola schoenicola. Bp.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Italien. Balearen: A. v. Homeyer. Sardinien: Antinori. Griechenland. Klein-Asien. Egypten. Nubien. Palästina: Tristram. Indien: Heuglin.

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 6. f. 3. — Gould. t. 113. —

2) Eier: Thien. t. 22. f. 11. a b. — Bäd. t. 19. f. 23. — In beiden Werken sind nur ungefleckte Eier abgebildet, während dieselben häufig roth oder braun gefleckt vorkommen. — N. 1858. p. 137. t. 2. f. 5. a—i. —

Temm. Man. I. p. 228. — III. p. 123. — Br. Lehrb. p. 361. n. 2. — Schinz. p. 177. n. 1. — K. u. Bl. n. 208. — Schl. Rev. I. p. 30. — Hartl. W. Afr. n. 754. — Bp. Consp. I. Gen. 600. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 125. a. — Mus. Hein. I. n. 278 — Br. Thierl. III. p. 876. — Degl. u. G. n. 249. — Heugl. N. O. Afr. n. 211. (111.) —

N. 1857. p. 115. — p. 405. — Cab. Journ. 1860. p. 129. — 1862. p. 283. — 1863. p. 83. — Extrh. p. 21. — 1866. p. 238. — 1869. p. 37. —

249. Troglodytes parvulus. Koch.

Ganz Europa. (Faröer = Tr. borealis Fischer.)

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 615. f. 2. — Gould. t. 130. — N. V. D. t. 83. f. 4. — Cab. Journ. 1861. t. 1. = T. borealis. Fischer. —

2) Eier: Thien. t. 12. f. 12. a b. — Bäd. t. 76. f. 16. — Cab. Journ. 1861. t. 1. = T. borealis. Fischer. —

Cuv. Règne an. I. p. 390. — L. S. XII. p. 337. n. 46. — M. u. W. I. p. 251. — Br. Lehrb. p. 318. — Schinz. p. 208. — N. V. D. III. p. 725. — K. u. Bl. n. 161. — Schl. Rev. I. p. 44. — Bp. Consp. I. Gen. 472. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 442. — Br. Thierl. III. p. 881. — Degl. u. G. n. 250. —

Cab. Journ. 1861. p. 14. = T. borealis. Fischer. —

250. Cinclus aquaticus. Bechst.

Alle Gebirge Europa's. — [Asien. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 940. Gould. t. 83. — t. 84 = C. melanogaster. Brehm. — N. V. D. t. 91. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 27. f. 4. a b. — Bäd. t. 35. f. 13. —

Bechst. Nat. D. III. p. 103. — L. S. XII. p. 290. n. 5. — Briss. Orn. V. p. 252. n. 19. — M. u. W. I. p. 207. — Schinz. p. 168. — Br. Lehrb. p. 286. — p. 289 = C. melanogaster. — N. V. D. III. p. 925. — XIII. p. 138. = C. melanogaster u. C. septentrionalis. Br. — Bp. Consp. I. Gen. 535. n. 1. — n. 2. = C. melanogaster. — Mus. Hein. I. n. 84. — Degl. u. G. n. 177. — n. 177. A. = C. melanogaster. — Br. Thierl. III. p. 817. —

251. Var. Cinclus Pallasi. Temm.

Sibirien. Japan. Amerika. — [Im December 1847 auf Helgoland erlegt: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 16. f. 1. — Gould. t. 85. —
2) Eier:

Temm. Man. III. p. 171. — Pall. Zoogr. I. p. 426. — Schinz p. 169. — K. u. Bl. n. 164. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 71. — Bp. Consp. I. Gen. 535. n. 4. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. IV. p. 92. — N. V. D. XIII. p. 141. —

252. Motacilla alba. L.

Fast ganz Europa. In Portugal (südlich von Lissabon) nicht beobachtet. Egypten: Heuglin. — [Canaren. West-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 652. f. 1. — Gould. t. 143. — N. V. D. t. 86. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 1. a b c. Unkenntlich. — Bäd. t. 35. f. 12. —

L. S. XII. p. 331. n. 11. — Gessn. Av. p. 618. — Pall. Zoogr. I. p. 506. n. 139. — M. u. W. I. p. 216. — Schinz. p. 199. n. 2. — Br. Lehrb. p. 247. — N. V. D. III. p. 803. — K. u. Bl. n. 172. — Schl. Rev. I. p. 37. — Rüpp. S. Ueb. n. 173. — Bp. Consp. I. Gen. 530. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 88. — Br. Thierl. III. p. 899. — Degl. u. G. n. 175. — Heugl. N. O. Afr. n. 259. (part.)

253. Var. Motacilla Yarrelli. Gould.

Gross-Britannien. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 141. — t. 142. — N. V. D. t. 377. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 2. a b c. (?) — Die Eier sind nicht von denen der M. alba zu unterscheiden.

Pall. Zoogr. I. p. 507. — Temm. Man. IV. p. 620. — I. p. 253. — Br. Lehrb. p. 249. — Schinz p. 199. n. 1. — N. V. D. XIII. p. 114. — K. u. Bl. n. 172. Anmerk. — n. 173. — Schl. Rev. II. p. 68. — Bp. Consp. I. Gen. 530. n. 2. — Br. Thierl. III. p. 899. — Degl. u. G. n. 175. A. — Heugl. N. O. Afr. n. 259. (part.) —

254. Motacilla sulphurea. Bechst.

Mittel- und Süd-Europa. Am Ochotskischen Meere: von Middendorff. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 28. f. 1. — Gould. t. 147. — N. V. D. t. 87. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 4. — Unkenntlich. — Bäd. t. 35. f. 11. —

Bechst. Nat. D. III. p. 459. — Gm. L. S. I. p. 997. n. 51. — M. u. W. I. p. 217. — Br. Lehrb. p. 246. — Schinz. p. 200. n. 1. — K. u. Bl. n. 174. — Schl. Rev. I. p. 37. — N. V. D. III. p. 824 — Rüpp. S. Ueb. n. 177. — Bp. Consp. I. Gen. 529. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 94. — Br. Thierl. III. p. 902. — Degl. u. G. n. 176. — Heugl. N. O. Afr. n. 261. —

255. Budytes citreolus. Bp.

Ost-Asien. — [Von Gätke auf Helgoland erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 144. — N. V. D. t. 377. f. 2—4. — Midd. Sib. Reise II. t. 14. f. 4—5. —

2) Eier:

Pall. It. III. app. p. 696. n. 14. — Pall. Zoogr. I. p. 503. n. 137. — Lath. Ind. Orn. II. p. 504. n. 9. — Br. Lehrb. p. 252. — Schinz. p. 200. n. 2. — K. u. Bl. n. 175. — Schl. Rev. I. p. 39. — Bp. Consp. I. Gen. 528. n. 6. — N. V. D. XIII. p. 117. — Br. Thierl. III. p. 908. — Degl. u. G. n. 174.

256. Budytes flavus. Cuv.

Europa (nur in der Ebene); nordwärts bis Lappland. Algerien: A. v. Homeyer. Teneriffa: Bolle. — [Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 674. f. 2. — Gould. t. 146. — N. V. D. t. 88. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 5. a b c. — Bäd. t. 35. f. 9. —

L. S. XII. p. 331. n. 12. — Pall. Zoogr. I. p. 501. n. 136. — Cuv. Règne an. I. p. 391. — M. u. W. I. p. 218. — Br. Lehrb. p. 250. — Schinz. p. 201. n. 2. — K. u. Bl. n. 177. — Schl. Rev. I. p. 38. — Rüpp. S. Ueb. n. 176. — N. V. D. III. p. 839. — Mus. Hein. I. n. 95. — Bp. Consp. I. Gen. 528. n. 1. — Br. Thierl. III. p. 905. — Degl. u. G. n. 173. — Heugl. N. O. Afr. n. 263.

257. Var. Budytes Rayi. Bp.

England. Frankreich. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 145. — N. V. D. t. 372. f. 1—4. —

2) Eier:

Temm. Man. III. p. 183. — N. V. D. XIII. p. 129. — K. u. Bl. n. 176. (part.) — Schl. Rev. I. p. 38. — Schinz. p. 201. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 218. — Bp. Consp. I. Gen. 528. n. 4. — Degl. u. G. n. 173 A. — Heugl. N. O. Afr. n. 263. Var. 4. —

258. Var. Budytes campestris. Br.

Süd-Russland. Ural. —

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 372. —

2) Eier:

Pall. It. III. app. p. 696. n. 15. — Pall. Zoogr. I. p. 504. n. 138. — K. u. Bl. n. 176. (part.) — Schl. Rev. II. p. 68. — Heugl. N. O. Afr. n. 263. Var. 5. —

259. Var. Budytes cinereocapillus. Br.

Süd-Europa. — [Egypten.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 373. f. 1—4. —

2) Eier: Bäd. t. 35. f. 10. —

Savi. Nuov. Giorn. Letter. p. 190. n. 57. — Savi. Orn. Tosc. III. p. 216. — N. V. D. XIII. p. 128. — K. u. Bl. n. 177. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 38. — Bp. Consp. I. Gen. 528. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 96. — Degl. u. G. n. 173. B. — Heugl. N. O. Afr. n. 263. Var. 1—2. —

260. Var. Budytes melanocephalus. Br.

Süd-Europa. Klein-Asien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 374. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 6. a b. (?) —

Licht. Doubl. p. 36. n. 415. — K. u. Bl. n. 177. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 38. — N. V. D. XIII. p. 125. — Bp. Consp. I. Gen. 528. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 97. — Br. Thierl. III. p. 905. — Degl. u. G. n. 173. C. — Heugl. N. O. Afr. n. 263. Var. 3. —

261. Anthus aquaticus. Bechst.

Schweiz. Riesengebirge. — [Mittel- und Süd-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 661. f. 2. — Gould. t. 138. — N. V. D. t. 85. f. 2—4. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 10. a b c. — Bäd. t. 35. f. 3. —

Bechst. Nat. D. III. p. 745. — L. S. XII. p. 288. n. 7. (part.) — M. u. W. I. p. 258. — Br. Lehrb. p. 237. — K. u. Bl. n. 165. — Schl. Rev. I. p. 35. — Bp. Consp. I. Gen. 527. n. 1. — N. V. D. III. p. 789. (part.) — XIII. p. 110. — Br. Thierl. III. p. 892. — Degl. u. G. n. 171. — Heugl. N. O. Afr. n. 267. (part.) —

262. Anthus rupestris. Nils.

Schweden. Norwegen. Dänemark. — [Pommern.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 371. f. 1—2. — Nils. Orn. Suec. I. t. 9. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 11. a b c. (?) — Bäd. t. 35. f. 4. —

Nils. Orn. Suec. I. p. 245. n. 115. — Penn. Brit. Zool. I. p. 482. — Br. Lehrb. p. 239. — Schinz. p. 432. n. 2. — K. u. Bl. n. 166. — Schl. Rev. I. p. 35. — N. V. D. XIII. p. 108. — Bp. Consp. I. Gen. 527. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 100. — Br. Thierl. III. p. 893. — Degl. u. G. n. 172. — Heugl. N. O. Afr. n. 267. (part.) —

N. 1854. p. 6. — 1856. p. 465. —

263. Anthus ludovicianus. Licht.

Nord-Amerika. — [Im November 1851 nach Gätke auf Helgoland vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 42. f. 4. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. a b c. Gut. — Bäd. t. 35. f. 6. Unkenntlich. —

Licht. Cat. p. 37. n. 421. — Gm. L. S. XIII. p. 793. n. 14. — 794. n. 15. — Wils. Am. Orn. II. p. 184. — Briss. Orn. app. p. 94. n. 13. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. 178. — Mus. Hein. I. n. 101. — Bp. Consp. I. Gen. 527. n. 25. — N. V. D. XIII. p. 111. —

N. 1854. p. 13. —

264. Anthus pratensis. Bechst.

Nord- und Mittel-Europa. Nord-Asien. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 660. f. 2. — Gould. t. 136. — N. V. D. t. 84. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 8. a b c. — Bäd. t. 35. f. 5. Weniger gut. —

L. S. XII. p. 782. n. 2. — Bechst. Nat. D. III. p. 732. — M. u. W. I. p. 255. — Br. Lehrb. p. 242. — p. 965. — p. 967. — Schinz. p. 205. n. 1. — N. V. D. III. p. 774. — K. u. Bl. n. 167. — Schl. Rev. I. p. 35. — Rüpp.

S. Ueb. n. 180. — Bp. Consp. I. Gen. 527. n. 6. — Mus. Hein. I. n. 98. — Br. Thierl. III. p. 889. — Degl. u. G. n. 169. — Heugl. N. O. Afr. n. 264. — N. 1854. p. 16. —

265. Anthus cervinus. K. u. Bl.

Lappland. Nord-Ost-Afrika: Heuglin. — [Süd-Russland. Asien. Einmal in Böhmen erlegt: Fritsch.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 140. — N. V. D. t. 85. f. 1. (als A. pratensis.)

2) Eier: Bäd. t. 35. f. 7. — N. 1854. t. 3. f. 4. —

Pall. Zoogr. I. p. 54. n. 142. — Br. Lehrb. p. 963. — Schinz. p. 205. n. 2. — K. u. Bl. n. 168. — Schl. Rev. I. p. 36. — N. V. D. XIII. p. 97. — Rüpp. S. Ueb. n. 181. — Bp. Consp. I. Gen. 527. n. 4. — Mus. Hein. I. n. 99. — Degl. u. G. n. 170. — Heugl. N. O. Afr. n. 265. —

N. 1854. p. 18. — 1856. p. 464. — Cab. Journ. 1853. p. 252. — 1859. p. 464. —

266. Anthus arboreus. Bechst.

Ganz Europa. Canaren: Bolle. — [Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 660. f. 1. — Gould. t. 139. — N. V. D. t. 84. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 7. a—f. — Bäd. t. 35. f. 8. Nicht characteristisch. —

Gm. L. S. I. p. 796. n. 5. — Bechst. Nat. D. III. p. 706. — Pall. Zoogr. I. p. 512. n. 143. — M. u. W. I. p. 254. b. — Br. Lehrb. p. 241. — Schinz. p. 206. — N. V. D. III. p. 758. — K. u. Bl. n. 169. — Schl. Rev. I. p. 36. — Rüpp. S. Ueb. n. 179. — Bp. Consp. I. Gen. 527. n. 6. — Mus. Hein. I. n. 107. — Br. Thierl. III. p. 891. — Degl. u. G. n. 168. — Heugl. N. O. Afr. n. 266. —

N. 1854. p. 22. —

267. Anthus campestris. Bechst.

Süd- und Mittel-Europa. Canaren. Algerien: Loche. — [Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 661. f. 1—2. — Gould. t. 137. — N. V. D. t. 84. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 13. a b c. — Bäd. t. 35. f. 2. —

Bechst. Nat. D. III. p. 722. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 200. — Temm. Man. I. p. 267. — M. u. W. I. p. 257. — Br. Lehrb. p. 235. n. 2. — Schinz. p. 204. — N. V. D. III. p. 745. — K. u. Bl. n. 170. — Schl. Rev. I. p. 36. — Rüpp. S. Ueb. n. 182. — Bp. Consp. I. Gen. 526. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 220. — Mus. Hein. I. n. 103. — Br. Thierl. III. p. 894. — Degl. u. G. n. 166. — Heugl. N. O. Afr. n. 268. —

N. 1854. p. 4. — 1856. p. 463. —

268. Anthus Richardi. Vieill.

Daurien. — [Klein-Asien. Soll in Süd-Europa und Nord-Afrika vorkommen. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 101. — Gould. t. 135. — N. V. D. t. 371. f. 3—4. —

2) Eier: Thien. t. 25. f. 14. a b. (?) Ich kenne diese Eier nur von der Färbung wie f. 8. b. — Bäd. t. 35. f. 1. Etwas hell. —

Vieill. Nouv. Dict. XXVI. p. 491. — Temm. Man. I. p. 263. — II. p. 185. — Ménétr. Catal. p. 37. n. 80. — Br. Lehrb. p. 235. n. 1. — Schinz. p. 202. — K. u. Bl. n. 171. — p. 173. (?) — Schl. Rev. I. p. 36. — Bp. Consp. I. Gen. 525. n. 1. — N. V. D. XIII. p. 94. — Mus. Hein. I. n. 111. — Br. Thierl. III. p. 897. — Degl. u. G. n. 167. —

N. 1854. p. 2. — 1856. p. 463. —

269. Alauda desertorum. Stanl.

Algerien. Egypten. — [Palästina. Klein-Asien. Persien. Griechenland. Provence.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 393. — Rüpp. Atl. t. 5. — Gould. t. 168. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 12. a b. —

Salt. Voy. Abyss. app. p. 60. — Licht. Doubl. p. 28. n. 285. — Schinz. p. 215. n. 2 — K. u. Bl. n. 78. — Schl. Rev. I. p. 58. — II. p. 74. — Rüpp. S. Ueb. n. 304. — Bp. Consp. I. Gen. 522. n. 7. — Mus. Hein. I. n. 672. — Br. Thierl. III. p. 276. — Degl. u. G. n. 163. — Heugl. N. O. Afr. n. 578. —

270. Alauda Duponti. Vieill.

Algerien. — [Süd-Europa: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Vieill. Faun. Franc. pl. 76. f. 2. — Roux. Orn. Prov. I. t. 186. —

2) Eier: Bäd. t. 76. f. 8. —

Vieill. Faun. Franc. p. 173. — Roux. Orn. Prov. I. p. 285. — Temm. Man. III. p. 197. — Schinz. p. 215. n. 1 — K. u. Bl. n. 81. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 58. — II. p. 75. — Bp. Consp. I. Gen. 522. n. 6. — Degl. u. G. n. 164. —

N. 1858. p. 265. —

271. Alauda arvensis. L.

Europa mit Ausschluss des Südens. Sibirien: von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 363. f. 1. — Gould. t. 166. — N. V. D. t. 100. f. 1. —

2) Eier: Thien t. 26. f. 1. a—e. — Bäd. t. 66. f. 4. —

L. S. XII. p. 827. n. 1. — M. u. W. I. p. 260. — Br. Lehrb. p. 232. — Schinz p. 213. n. 1. — N. V. D. IV. p. 156. — K. u. Bl. n. 81. — Schl. Rev. I. p. 59. — II. p. 75. — Rüpp. S. Ueb. n. 310. — Bp. Consp. I. Gen. 520. n. 6. — Mus. Hein. I. n. 665. — Br. Thierl. III. p. 271. — Degl. u. G. n. 152. — Heugl. N. O. Afr. n. 556. —

272. Alauda arborea. L.

Süd- und Mittel-Europa. Nördlich bis ins mittlere Schweden. Palästina: Tristram. — [Asien. Nord-Afrika: A. Brehm.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 503. f. 2. — Gould. t. 167. — N. V. D. t. 100. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 4. a—d. — Bäd. t. 66. f. 5. —

L. S. XII. p. 287. n. 3. — Willugb. Orn. II. p. 149. — M. u. W. I. p. 262. — Br. Lehrb. p. 230. — Schinz. p. 213. n. 2. — N. V. D. IV. p. 192. — K. u. Bl. n. 80. — Schl. Rev. I. n. 59. — Bp. Consp. I. Gen. 520. n. 11. — Mus. Hein. I. n. 667. — Br. Thierl. III. p. 269. — Degl. u. G. n. 153. — Heugl. N. O. Afr. n. 569.

273. Alauda isabellina. Temm.

Egypten. Algerien. — [Griechenland: von der Mühle. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 244. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 6. a b. — Bäd. t. 66. f. 11. In beiden Werken verschieden. Ich kenne die Eier nicht.

Licht. Doubl. p. 28. n. 286. — Temm. Man. III. p. 637. — Gm. L. S. I. p. 798. — Schinz. p. 214. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 60. — Rüpp. S. Ueb. n. 307. — Bp. Consp. I. Gen. 520. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 668. — Br. Thierl. III. p. 262. — Degl. u. G. n. 156. — Heugl. N. O. Afr. n. 570. —

274. Alauda cristata. L.

Süd- und Mittel-Europa. Nördlich bis Pommern. Klein-Asien. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 503. f. 1. — t. 662. — Gould. t. 165. — N. V. D. t. 99. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 2. a—d. — Bäd. t. 66. f. 8. — f. 9. = A. ferruginea. — f. 10. = A. Theclae. —

L. S. XII. p. 288. n. 6. — Pall. Zoogr. I. p. 523. n. 149. — p. 524. n. 150. — M. u. W. I. p. 264. — Br. Lehrb. p. 229. — Schinz. p. 211. n. 2. — N. V. D. IV. p. 134. — K. u. Bl. n. 79. — Schl. Rev. I. p. 59. — Rüpp. S. Ueb. n. 309. — Bp. Consp. I. Gen. 521. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 666. — Br. Thierl. III. p. 267. — Degl. u. G. n. 165. — Heugl. N. O. Afr. n. 567.

N. 1858. p. 204. — Cab. Journ. 1862. p. 267. = A. Theclae. —

275. Alauda calandra. L.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Italien. Griechenland. Türkei. Süd-Russland. Klein-Asien. Algerien: Loche. — [Mittel-Europa, selten.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 363. f. 2. — Gould. t. 162. — N. V. D. t. 98. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 5. a—d. — Bäd. t. 66. f. 6. Besser. —

L. S. XII. p. 288. n. 9. — M. u. W. I. p. 261. — Br. Lehrb. p. 225. Schinz. p. 210. n. 2. — N. V. D. IV. p. 127. — K. u. Bl. n. 86. Schl. Rev. I. p. 60. — Rüpp. S. Ueb. n 305. — Bp. Consp. I. Gen. 517. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 659. — Br. Thierl. III. p. 258. — Degl. u. G. n. 160. — Heugl. N. O. Afr. n. 561. —

276. Alauda tatarica. Pall.

Sibirien. — [Süd- und Mittel-Asien. Süd-Russland (an der Wolga). Verirrt sich, wenn auch selten, bis nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 650. f. 1. — Gould. t. 161. — N. V. D. I. t. 380. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 8. a b c. —

Pall. It. II. app. p. 707. n. 15. — Pall. Zoogr. I. p. 514. n. 144. — Br. Lehrb. p. 226. — Schinz. p. 210. u. 1. — K. u. Bl. n. 87. — Schl. Rev. I. p. 60. — Bp. Consp. I. Gen. 517. n. 3. — N. V. D. XIII. p. 158. — Mus. Hein. I. n. 661. — Midd. Sib. Reise II. p. 133. — Br. Thierl. III. p. 261. — Degl. u. G. n. 162. —

277. Alauda sibirica. L.

Süd-Russland. — [Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Pall. Zoogr. I. t. 33. f. 2. —

2) Eier: Bäd. t. 66. f. 7. —

Gm. L. S. I. p. 799. n. 31. — p. 518. n. 147. — Pall. It. II. app. p. 708. n. 15. — K. u. Bl. n. 85. — Schl. Rev. I. p. 60. — Bp. Consp. I. Gen. 517. n. 5. — Degl. u. G. n. 161. —

278. Alauda brachydactyla. Leisl.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Italien. Griechenland. Klein-Asien. - [Nord-Afrika. Verirrt sich bis nach Helgoland: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 305. — f. 1. = A. Kollyi. — Gould. t. 163. — N. V. D. t. 98. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 26. f. 7. a—d. — Bäd. t. 66. f. 2. —

Leisl. Wett. Ann. III. p. 357. — Br. Lehrb. p. 227. — Schinz. p. 212. — p. 204. = A. Kollyi. — N. V. D. IV. p. 188. — K. u. Bl. n. 82. — n. 83. = A. Kollyi. — Schl. Rev. I. p. 59. — II. p. 75. = Al. Kollyi. — Rüpp. S. Ueb. n. 306. — Bp. Consp. I. Gen. 520. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 656. — n. 657. = Al. Kollyi. — Br. Thierl. III. p. 260. — Heugl. N. O. Afr. n. 579. —

279. Alauda pispoletta. Pall.

Süd-Russland. —

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier: Bäd. t. 66. f. 3. —

Pall. Zoogr. I. p. 526. n. 154. — Bp. List. B. p. 37. — Ménétr. Catal. p. 39. n. 87. — K. u. Bl. n. 82. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 76. — Bp. Consp. I. Gen. 520. n. 5. — Mus. Hein. I. p. 122. Anmerk. — Degl. u. G. n. 155. —

280. Alauda alpestris. L.

Schweden. Labrador (A. cornuta. Wils.) Sibirien: von Middendorff. [Nord-Europa. Süd-Russland. Dann und wann in Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 630. f. 2. — Gould. t. 164. — N. V. D. t. 99. f. 2—3. — Wils. Am. Orn. t. 5. f 4. = A. cornuta. Wils.

2) Eier: Thien. t. 26. f. 3. a b c d. Nur f. a. kenntlich. — Bäd. t. 66. f. 1. Die mittelste Abbildung ist die beste. —

L. S. XII. p. 289. n. 10. — Gm. L. S. p. 800. n. 2. — Wils. Am. Orn. I. p. 85. = A. cornuta. — Pall. Zoogr. I. p. 519. n. 148. — M. u. W. I. p.

265. — Br. Lehrb. p. 228. — Schinz. p. 211. n. 3. — N. V. D. IV. p. 149. — K. u. Bl. n. 84. — Schl. Rev. I. p. 60. — Bp. Consp. I. Gen. 523. n. 2. — n. 3 = A. cornuta. — Mus. Hein. I. n. 651. — n. 652 = A. cornuta. — Br. Thierl. III. p. 265. — Degl. u. G. n. 157. —

281. Var. (?) Alauda penicillata. Gould.

Daurien. — [Ob in Europa vorgekommen, ist fraglich. Arabien: Rüppell.]

Abbild. 1) Vogel: Tnmm. pl. col. 241. f. 1. — Gray. Gen. B. t. 92. —

2) Eier:

Gould. Proceed. Zool. Soc. 1837. V. p. 226. — Bp. List. B. p 37. n. 254. — Gm. It. I. p. 62. — K. u. Bl. n. 83. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 76. — Rüpp. S. Ueb. n. 308. — Bp. Consp. I. Gen. 523. n. 6. — n. 7. — Mus. Hein. I. n. 654. —

282. Emberiza miliaria. L.

Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. — [Nord-Afrika. Canaren.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 233. — Gould. t. 171. — N. V. D. t. 101. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 33. f. 8. a—e. — Bäd. t. 3. f. 3. —

L. S. XII. p. 308. n. 3. — M. u. W. I. p. 180. — Br. Lehrb. p. 204. — Schinz. p. 224. n. 1. — N. V. D. IV. p. 213. — K. u. Bl. n. 95. — Schl. Rev. I. p. 71. — Rüpp. S. Ueb. n. 297. — Bp. Consp. I. Gen. 977. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 675. — Br. Thierl. III. p. 244. — Degl. u. G. n. 138. — Heugl. N. O. Afr. n. 548. —

283. Emberiza citrinella. L.

Europa mit Ausschluss des Südens. Süd-Sibirien. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 30. — Gould. t. 173. — N. V. D. t. 102. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 33. f. 4. a—d. — Bäd. t. 3. f. 8. —

L. S. XII. p. 309. n. 5. — M. u. W. I. p. 178. — Br. Lehrb. p. 206. — Schinz. p. 223. n. 2. — K. u. Bl. n. 94. — Schl. Rev. I. p. 68. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 10. — Mus Hein. I. n. 676. — N. V. D. IV. p. 234. — Br. Thierl. III. p. 245. — Degl. u. G. n. 139. —

284. Emberiza cirlus. L.

Portugal. Spanien. Italien. Süd-Frankreich. Schweiz. Bei Trier: A. von Homeyer. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 653. f. 1. — Gould. t. 175. — N. V. D. t. 102. f. 3—4. —

2) Eier: Thien. t. 33. f. 5. a b c. — Bäd. t. 3. f. 7. Besser. —

L. S. XII. p. 311. n. 12. — M. u. W. I. p. 185. — Br. Lehrb. p. 208. — Schinz. p. 228. n. 2. — N. V. D. IV. p. 251. — Bechst. Orn. Tasch. I. p. 135. — Bechst. Nat. V. D. III. p. 292. — K. u. Bl. n. 93. — Schl. Rev. I.

p. 68. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 16. — Mus. Hein. I. n. 677. — Degl. u. G. n. 140.

Cab. Journ. 1860. Beil. IX. p. 69.

285. Emberiza hortulana. L.

Ost-Spanien: A. Brehm. Süd-Frankreich. In Deutschland strichweise und oft wechselnd. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Süd-Schweden. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 176. - N. V. D. t. 103. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 33. f. 7. a—d. — Bäd. t. 3. f. 5. Besser. —

L. S. XII. p. 309. n. 4. — M. u. W. I. p. 183. — Br. Lehrb. p. 207. — Schinz. p. 228. a. 1. — N. V. D. IV. p. 258. — K. u. Bl. n. 92. — Schl. Rev. I. p. 69. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 14. — Mus. Hein. I. n. 680. — Br. Thierl. III. p. 246. — Degl. u. G. n. 113. — Heugl. N. O. Afr. n. 551. —

286. Emberiza chrysophrys. Pall.

Asien. — [Nach De Selys-Longchamps bei Lille, nach Schinz auch bei Cöln vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Selys. Faune belge I. t. 4. f. 1. — Pall. Zoogr. II. t. 48. f. 2. —

2) Eier:

Pall. It. III. app. n. 25. — Pall. Zoogr. II. p. 46. n. 210. — Selys. Faune belge I. p. 81. n. 77. — Schinz. p. 224. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 69. — II. p. 83. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 7. — Degl. u. G. n. 145. —

287. Emberiza caesia. Cretz.

Griechenland. Klein-Asien. Egypten. — [Verfliegt sich bis Helgoland: Gätke. Nord-Ost-Afrika: von Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 181. — Rüpp. Atl. t. 10. f. 6. — Roux. Orn. Prov. t. 112. — N. V. D. t. 381. f. 3—4. —

2) Eier:

Rüpp. Atl. p. 17. — Sw. Nat. Hist. II. p. 290. — Schinz. p. 227. n. 1. — K. u. Bl. n. 98. — Schl. Rev. I. p. 69. — Rüpp. S. Ueb. n. 301. — Bp. Consp. I. Gen. 980. n. 1. - Mus. Hein. I. n. 681. — N. V. D. XIII. p. 172. — Degl. u. G. n. 144. — Heugl. N. O. Afr. n. 552. —

288. Emberiza cia. L.

Spanien: A. Brehm. Süd-Frankreich. Zwischen Bingen und Remagen: Brahts. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Algerien: Loche. Libanon: Tristram. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 30. f. 2. — 511. f. 1. — Gould. t. 179. — N. V. D. t. 104. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 33. f. 6. ab. — Bäd. t. 3. f. 6. Besser. —

L. S. XII. p. 301. n. 11. — Gm. L. S. p. 882. n. 61. — M. u. W. I. p. 186. — Br. Lehrb. p. 209. — Schinz. p. 229. n. 1. — N. V. D. IV. p. 270. — XIII. p. 171. — K. u. Bl. n. 99. — Schl. Rev. I. p. 69. — Bp. Consp. I.

Gen. 979. n. 17. — Br. Thierl. III. p. 248. — Degl. u. G. n. 141. — Heugl. N. O. Afr. n. 549. —

289. Emberiza pityornis. Pall.

Sibirien. — [In Ost-Europa vorgekommen: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 180. — N. V. D. t. 104. f. 3. —

2) Eier:

Pall. It. II. app. n. 22. — Pall. Zoogr. II. p. 37. n. 203. — Br. Lehrb. p. 212. — Schinz. p. 226. n. 1. — K. u. Bl. n. 100. — Schl. Rev. I. p. 70. — N. V. D. IV. p. 276. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 20. — Mus. Hein. I. n. 679. — Degl. u. G. n. 142. —

Cab. Journ 1869. p. 217. —

290. Emberiza schoeniclus. L.

Ganz Europa. — [Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 247. f. 2. — 497. f. 2. — 656. f. 1. — Gould. t. 183. — N. V. D. t. 105. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 33. f. 9. a b c. — Bäd. t. 3. f. 4. —

L. S. XII. p. 311. n. 17. — Pall. Zoogr. II. p. 49. n. 213. — M. u. W. I. p. 181. — Br. Lehrb. p. 210. — Schinz. p. 225. — N. V. D. IV. p. 280. — K. u. Bl. n. 101. — Schl. Rev. I. p. 70. — Bp. Consp. I. Gen. 978. n. 1. — n. 2. — Mus. Hein. I. n. 685. — Br. Thierl. III. p. 250. — Degl. u. G. n. 146. — Heugl. N. O. Afr. n. 556. = Emb. intermedia. —

291. Var. Emberiza palustris. Savi.

Spanien. — [An der Wolga. Krim. Süd-Frankreich: Roux.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 184. — Roux. Orn. Prov. t. 144. —

2) Eier: Bäd. t 12. f. 12. —

Savi, Orn. Tosc. II. p. 91. — III. p. 225. — Pall. Zoogr. II. p. 49. n. 212. — Ménétr. Catal. p. 41. n. 101. — Schinz. p. 226. n. 2. — K. u. Bl. n. 102. — Schl. Rev. I. p. 70. — N. V. D. XIII. p. 184. — Bp. Consp. I. Gen. 978. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 686. — Degl. u. G. n. 147. —

N. 1856. p. 471. —

292. Emberiza rutisca. Pall.

Sibirien. Nord-Russland (Archangel). —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 656. f. 2. — Pall. Zoogr. II. t. 47. f. 2. — Gould. t. 177. — N. V. D. t. 382. f. 1 - 2. —

2) Eier: Bäd. t. 12. f. 13. — t. 76. f. 10. —

Pall. It. III. app. p. 698. n. 21. — Pall. Zoogr. II. p. 43. n. 207. — Gm. L. S. I. p. 882. n. 60. (?) — Temm. Man. I. p. 317. — III. p. 229. — Br. Lehrb. p. 955. — Schinz. p. 227. n. 2. — K. u. Bl. n. 96. — Schl. Rev. I. p. 71. — N. V. D. XIII. p. 180. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 21. (?) — Mus. Hein. I. p. 131. Anmerk. 2. — Degl. u. G. n. 149. —

293. Emberiza fucata. Pall.

Asien. — [Nach Schlegel im südlichen Frankreich vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 656. f. 1. — Gould. t. 178. —
2) Eier:
Pall. It. III. app. p. 698. n. 22. — Pall. Zoogr. II. p. 41. n. 205. — K. u. Bl. n. 97. — Schl. Rev. I. p. 70. — II. p. 83. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 3. — Mus. Hein I. p. 131. Anmerk. 2. —

294. Emberiza pusilla. Pall.

Nord-Asien. Nord-Russland (Archangel). — [Nach Schlegel 1842 bei Leyden gefangen. Nach Gätke mehrfach auf Helgoland, zuerst am 4. October 1845, vorgekommen.]
Abbild. 1) Vogel: Pall. Zoogr. II. t. 47. f. 1. — N. V. D. t. 382. f. 3—4.
2) Eier: Bäd. t. 76. f. 9. — N. 1854. t. 3. f. 5. —
Pall. It. III. p. 697. n. 20. — Pall. Zoogr. II. p. 42. n. 206. — Schl. Rev. I. p. 71. — II. p. 84. — N. V. D. XIII. p. 175. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 4. — Degl. u. G. n. 148.

295. Emberiza cinerea. Strickl.

Klein-Asien (Smyrna). — [Zufällig in Nord-Ost-Afrika: von Heuglin.]
Abbild. 1) Vogel:
2) Eier:
Strickl. Proc. Zool. Soc. 1837. p. 99. — Schl. Rev. II. p. 82. — Bp. Consp. I. Gen. 979. n. 5. — Heugl. N. O. Afr. n. 550.

296. Emberiza striolata. Temm.

Nubien, Kordofan: von Heuglin. Am todten Meere: Tristram. — [Die Angaben über das Vorkommen in (Süd-)Europa sind unsicher.]
Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 10. f. a. — Gould. t. 152. —
2) Eier:
Licht. Doubl. p. 24. n. 245. — Rüpp. Atl. p. 15. — Sw. Nat. Hist. B. II. p. 290. — Schinz. p. 433. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 69. — Rüpp. S. Ueb. n. 300. — Bp. Consp. I. Gen. 980. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 683. — Degl. u. G. n. 137. — Heugl. N. O. Afr. n. 555. —

297. Emberiza aureola. Pall.

Sibirien. Nord-Russland (Archangel). —
Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 174. — N. V. D. t. 381. f. 1—2. —
2) Eier: Bäd. t. 12. f. 11. — Cab. Journ. 1856. t. 2. f. 15. —
Pall It. II. app. p. 711. n. 23. — Pall. Zoogr. II. p. 52. n. 216. — Temm Man. III. p. 233. — Schinz p. 229. — K. u. Bl. n. 91. — Schl. Rev. I. p. 70. — Bp. Consp. I. Gen. 981. n. 2. — Gray. Gen. B. n. 3. — N. V. D. XIII. p. 166. — Mus. Hein. I. n. 689. — Degl. u. G. n. 135. —

298. Emberiza melanocephala. Scop.

Macedonien. Griechenland. Süd-Russland. Insel Rhodus. Klein-Asien. — [Dekan, Hindostan: Jerdon. Hat sich nach Deutschland und Helgoland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 172. — N. V. D. t. 101. f. 2. —
2) Eier: Thien. t. 33. f. 3. abc. — Bäd. t. 3. f. 9. Besser. —
Scop. Ann. I. p. 142. n. 208. — Güld. Nov. Comm. Petr. XIX. p. 466. — Pall. Zoogr. I. p. 423. n. 74. — Ménétr. Catal. I. p. 40. n. 99. — Br. Lehrb. p. 205. — Schinz. p. 223. n. 1. — N. V. D. IV. p. 227. — K. u. Bl. n. 90. — Schl. Rev. I. p. 72. — Bp. Consp. I. Gen. 981. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 687. — Br. Thierl. III. p. 249. — Degl. u. G. n. 136. —

299. Plectrophanes nivalis. Meyer.

Grönland. Spitzbergen. Norwegen. Schweden. Sibirien: (Taimyrfluss) von Middendorff. Labrador. — [Im Winter öfter in Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 497. f. 1. — 511. f. 2. — Gould. t. 170. — N. V. D. t. 106. f. 1—4. — t. 107. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 33. f. 11. a—e. — Bäd. t. 3. f. 1.
L. S. XII. p. 308. n. 1. — M. u. W. I. p. 187. — Br. Lehrb. p. 214. — p. 219. — Schinz. p. 232. n. 2. — N. V. D. IV. p. 297. — K. u. Bl. n. 88. — Schl. Rev. I. p. 72. — Bp. Consp. I. Gen. 976. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 674. — Degl. u. G. n. 150. — Br. Thierl. III. p. 254. —

300. Plectrophanes calcaratus. Meyer.

Lappland. Grönland. Sibirien: (Taimyrfluss und Boganida) von Middendorff. — [Hat sich öfter nach Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 169. — N. V. D. t. 108. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 33. f. 12. — Bäd. t. 3. f. 2. —
L. S. XII. p. 317. n. 1. — Pall. It. II. app. p. 710. n. 20. — M. u. W. I. p. 176. — Schinz. p. 231. — p. 233. — Br. Lehrb. p. 221. — N. V. D. IV. p. 319. — K. u. Bl. n. 89. — Schl. Rev. I. p. 72. — Wils u. Bp. Nat. Hist. IV. p. 121. — Bp. Consp. I. Gen. 976. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 673. — Br. Thierl. III. p. 252. — Degl. u. G. n. 151. —

301. Nyphaea hyemalis. Audub.

Nord Amerika. — [Soll sich nach Island verflogen haben. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 167. — Gould. t. 190. — Wils. Am. Orn. t. 16 f. 6. —
2) Eier: Bäd. t. 12. f. 5. —
L. S. X. p. 183. — L. S. XII. p. 308. n. 2. — Temm. Man. III. p. 234. — Br. Lehrb. p. 223. — K. u. Bl. n. 126. — Schl. Rev. II. p. 82. — Wils u. Bp. Nat. Hist. II. p. 256. — Bp. List. B. p. 31. n. 215. — Bp. Consp. I. Gen. 992. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 701. — Br. Thierl. III. p. 139. —

302. Oreospiza nivalis. Glog.

Schweiz. Süd-Frankreich (Basses Alpes). — [Kaukasus: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 189. — N. V. D. t. 117. f. 1—2. — Schl. u. Bp. Lox. t. 46. —
2) Eier: Thien. t. 36. f. 7. — Bäd. t. 12. f. 4. —
Briss. Orn. III. p. 162. — L. S. XII. p. 321. n. 21. — Pall. Zoogr. II. p. 20. n. 190. — M. u. W. I. p. 161. — Br. Lehrb. p. 190. — Schinz. p. 245. — N. V. D. V. p. 4. — K. u. Bl. n. 125. — Schl. Rev. I. p. 61. — Bp. Consp.

I. Gen. 1068. n. 1. — Schl. u. Bp. Lox. p. 40. — Mus. Hein. I. n. 784. — Br. Thierl. III. p. 138. — Degl. u. G. n. 123. —

303. Oreospiza arctoa. Glog.

Nord-Sibirien: (Pallas). — [Wohl nicht mit Sicherheit in Europa beobachtet?]

Abbild. 1) Vogel: Baird. u. Cass. t. 74. f. 1. — Schl. u. Bp. Lox. t. 44. — t. 45. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. II. p. 21. n. 191. — Bull. Acad St. Petersb. X. p. 251. — Gray. Gen. B. n. 63. — n. 64. — Bp. Consp. I. Gen. 1067. n. 4. — n. 5. — Schl. u. Bp. Lox. p. 38. — Mus. Hein. I. n. 787. —

304. Fringilla coelebs. L.

Gemässigtes Europa, nördlich bis Schweden. Sibirien. (?) — [Süd-Europa. Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 187. — N. V. D. t. 118. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 36. f. 5. a—e. — Bäd. t. 12. f. 3. —

L. S. XII. p. 318. n. 3. — Pall. Zoogr. II. p. 17. n. 187. — M. u. W. I. p. 150. — Br. Lehrb. p. 188. — Schinz. p. 244. n. 1. — N. V. D. V. p. 13. — K. u. Bl. n. 123. — Schl. Rev. I. p. 61. — Bp. Consp. I. Gen. 1039. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 782. — Br. Thierl. III. p. 131. — Degl. u. G. n. 120. — Heugl. N. O. Afr. n. 530. —

305. Fringilla spodiogena. Bp.

Algerien: A. v. Homeyer. — [Nach Degland im April 1861 bei Marseille geschossen.]

Abbild. 1) Vogel: Bp. Rev. Zool. t. 4. — Le Vaill. Expl. t. 7. f. 1—2.

2) Eier:

Bp. Rev. Zool. p. 146. — Bp. Consp. I. Gen. 1039. n. 3. — Degl. u. G. n. 121 —

Cab. Journ. 1862. p. 264. —

306. Fringilla montifringilla. L.

Schweden. Norwegen. Lappland. Sibirien: von Middendorff. — [Ganz Europa. Algerien: Loche.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 54. f. 2. — Gould. t. 188. — N. V. D. t. 119. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 36. f. 6. a—c. — Bäd. t. 12. f. 2. Besser. —

L. S. XII. p. 318. n. 4. — M. u. W. I. p. 151. — Br. Lehrb. p. 189. — Schinz. p. 244. n. 2. — N. V. D. V. p. 44. — K. u. Bl. n. 124. — Schl. Rev. I. p. 61. — Bp. Consp. I. Gen. 1039. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 783. — Degl. u. G. n. 122. — Br. Thierl. III. p. 136. —

307. Fringilla chloris. Ill.

Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 267. f. 2. — Gould. t. 200. — N. V. D. t. 120. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 34. f. 4. abc. — Bäd. t. 20. f. 1. —

L. S. XII. p. 304. n. 27. — Gessn. Av. p. 259. — M. u. W. I. p. 144. — Br. Lehrb. p. 179. — Schinz. p. 240. n. 2. — N. V. D. V. p. 62. — K. u. Bl. n. 120. — Schl. Rev. I. p. 61. — Bp. Consp. I. Gen. 1045. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 799. — Br. Thierl. III. p. 170. — Degl. u. G. n. 119. —

308. Fringilla citrinella. L.

Süd-Frankreich (Basses Alpes). Schweiz. Baden: Schütt. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 652. f. 2. — Gould. t. 198. — N. V. D. t. 124. f. 3—4. —

2) Eier: Thien. t. 35. f. 16. ab. — Bäd. t. 20. f. 4. Besser. —

L. S. XII. p. 320. n. 16. — Gessn. Av. p. 260. — M. u. W. I. p. 175. — Br. Lehrb. p. 200. — Schinz. p. 249. n. 2. — N. V. D. V. p. 148. — K. u. Bl. n. 119. — Schl. Rev. I. p. 62. — Bp. Consp. I. Gen. 1053. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 816. — Degl. u. G. n. 126. —

309. Fringilla cannabina. L.

Ganz Europa. Canaren: Bolle. Algerien: Loche. — [Nord-Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 151. f. 1—2. — Gould. t. 191. — N. V. D. t. 121. f. 1—4. — Schl. u. Bp. Lox. t. 48. —

2) Eier: Thien. t. 35. f. 10. abc. — Bäd. t. 20. f. 13. —

L. S. XII. p. 322. n. 28. — Pall. Zoogr. II. p. 27. n. 195. — M. u. W. I. p. 163. — Br. Lehrb. p. 190. — Schinz. p. 246. — N. V. D. V. p. 80. — K. u. Bl. n. 117. — Schl. Rev. I. p. 62. — Bp. Consp. I. Gen. 1070. n. 1. — Schl. u. Bp. Lox. p. 43. — Mus. Hein. I. n. 814. — Degl. u. G. n. 129. — Br. Thierl. III. p. 141. — Heugl. N. O. Afr. n. 535. —

310. Fringilla flavirostris. L.

Schweden. Norwegen. Schottland. — [Im Winter bis Deutschland und Frankreich.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 192. — N. V. D. t. 122. f. 1—3. — Schl. u. Bp. Lox. t. 50. —

2) Eier: Thien. t. 35. f. 11. abc. — Bäd. t. 20. f. 14. —

L. S. XII. p. 322. n. 27. — Gm. L. p. 917. n. 68. — Br. Lehrb. p. 193. — Schinz. p. 247. n. 1. — n. 2. — N. V. D. V. p. 103. — K. u. Bl. n. 118. — Schl. Rev. I. p. 62. — II. p. 77. — Bp. Consp. I. Gen. 1070. n. 3. — Schl. u. Bp. Lox. p. 45. — Mus. Hein. I. n. 815. — Degl. u. G. n. 130. — Br. Thierl. III. p. 144. —

311. Fringilla linaria. L.

Grönland. Island. Sibirien: von Middendorff. Soll nach Bl. Hanf in der Schweiz brüten. — [In strengen Wintern in ganz Europa. Maroka: Drake. Syrien: Tristram.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 194. — N. V. D. t. 126. f. 1—4. — Schl. u. Bp. Lox. t. 52. — t. 53. = Fr. Holbölli. — t. 54. = Fr. rufescens. Savi. —

2) Eier: Thien. t. 35. f. 13. a b c. — Bäd. t. 20. f. 15. —

L. S. XII. p. 322. n. 29. — Gessn. Av. p. 591. — M. u. W. I. p. 171. — Br. Lehrb. p. 196. — Schinz. p. 250. n. 1. — N. V. D. V. p. 173. — K. u. Bl. n. 115. — Schl. Rev. I. p. 63. — Rüpp. S. Ueb. n. 290. — Bp. Consp. I. Gen. 1071. n. 1. — n. 3. — Schl. u. Bp. Lox. p. 48. — p. 50. = Fr. Holbölli et Fr. rufescens Savi. — Mus. Hein. I. n. 812. — p. 161. Anmerk. — Br. Thierl. III. p. 145. — Degl. u. G. n. 131. — n. 132. — Heugl. N. O. Afr. n. 534. —

312. Var. Fringilla canescens. Selys.

Labrador. — [Ist ebenfalls im Winter in Europa beobachtet worden.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 19?. — Wils. Am. Orn. t. 30. f. 4. — Schl. u. Bp. Lox. t. 51. —

2) Eier: Thien. t. 35. f. 12. a b c. —

Selys. Faune belge I. p. 73. — Roux. Orn. Prov. I. p. 165. — Schinz. p. 250. n. 2. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 267. — K. u. Bl. n. 116. — Schl. Rev. I. p. 63. — II. p. 77. — Bp. Consp. I. Gen. 1071. n. 2. — n. 4(?) — Schl. u. Bp. Lox. p. 47. — Mus. Hein. I. n. 813. — Degl. u. G. n. 133.

313. Fringilla carduelis. L.

Europa, nördlich bis Schweden. Canaren: Bolle. Klein-Asien. Syrien: von Heuglin. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 4. f. 1. — Gould. t. 196. — N. V. D. t. 124. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 35. f. 9. a b c. — Bäd. t. 20. f. 3. Besser. —

L. S. XII. p. 318. n. 7. — M. u. W. I. p. 167. — Br. Lehrb. p. 201. — Schinz. p. 245. n. 2. — N. V. D. V. p. 126. — K. u. Bl. n. 114. — Schl. Rev. I. p. 63. — Bp. Consp. I. Gen. 1048. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 802. — Br. Thierl. III. p. 151. — Heugl. N. O. Afr. n. 531. — Degl. u. G. n. 124. —

314. Fringilla orientalis. Eversm.

Sibirien: Eversmann. — [Wohl irrthümlich als Europäer aufgeführt.]

Abbild. 1) Vogel: Add. Pall. Zoogr. t. 9. —

2) Eier:

Bp. Consp. I. Gen. 1048. n. 2. —

315. Fringilla spinus. L.

Europa, nördlich bis Norwegen. Nord-Ost-Asien: Radde. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 197.— N. V. D. t. 125. f. 1—3. —

2) Eier: Thien t. 35. f. 14. a b c. — Bäd. t. 20. f. 2. —

L. S. XII. p. 322. n. 25. — M. u. W. I. p. 170. — Br. Lehrb. p. 198. — Schinz. p. 249. n. 1. — N. V. D. V. p. 155. — K. u. Bl. n. 113. — Schl. Rev. I. p. 63. — Bp. Consp. I. Gen. 1046. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 806. — Br. Thierl. III. p. 147. — Degl. u. G. n. 125. —

316. Fringilla pistacina. Eversm.

Sibirien: Eversmann. — [Das Vorkommen in Europa ist sehr zweifelhaft.]

Abbild. 1) Vogel:
2) Eier:
Bp. Consp. I. Gen. 1046. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 159. Anmerk. 1. —

317. Fringilla serinus. L.

Portugal. Spanien. Süd-Frankreich. Italien. Sardinien. Steiermark. In Deutschland sich immer mehr ausbreitend. Baden. Hessen. Baiern. Schlesien (Bei Glogau erst seit 1861): A. v. Homeyer. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 658. — Gould. t. 195. — N. V. D. t. 123. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 35. f. 15. a b c. — Bäd. t. 20. f. 5. —

L. S. XII. p. 320. n. 17. — Faber, Isis. 1826. p. 1053. = Fr. islandica. — M. u. W. I. p. 146. — Br. Lehrb. p. 186. — Schinz. p. 248. — N. V. D. V. p. 114. — K. u. Bl. n. 112. — Schl. Rev. I. p. 66. — II. p. 81. = Fr. islandica. — Bp. Consp. I. Gen. 1056. n. 8. — Mus. Hein. I. n. 817. — Degl. u. G. n. 127. — Br. Thierl. III. p. 116. — Heugl. N. O. Afr. n. 539. —
Cab. Journ. 1862. p. 97. — p. 106. — 1867. p. 387. —

318. Fringilla pusilla. Gray.

Asien. Zwischen dem Kaukasus und dem Schwarzen Meere: Pallas.

Abbild. Vogel: Cab. Journ. 1854. Erinnerungsschrft. t. 1. f. 1—2. —
Pall. Zoogr. II. p. 28. n. 196. — Bp. Consp. I. Gen. 1056. n. 9. — Schl. Rev. I. p. 65. — II. p. 78. —
Cab. Journ. 1854. Erinnerungsschrft p. 94. —

319. Pyrrhula vulgaris. Briss.

Nord- und Mittel-Europa. Süd-Frankreich. Sibirien. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 145. f. 1—2. — Gould. t. 209. — N. V. D. t. 111. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 36. f. 3. a b c. — Bäd. t. 20. f. 7. —

L. S. XII. p. 300. n. 4. — Briss. Orn. III. p. 308. n. 1. — Pall. Zoogr. II. p. 7. n. 179. — Temm. Man. I. p. 338. — Selys Faun. belge p. 79. = P. coccinea. Selys. — M. u. W. I. p. 147. — Br. Lehrb. p. 172. — Schinz. p. 238. n. 1. — N. V. D. IV. p. 383. — K. u. Bl. n. 106. — Schl. Rev. I. p. 66. — II. p. 80. — Bp. Consp. I. Gen. 1059. n. 2. — Mus. Hein. I. n. 828. — Br. Thierl. III. p. 112. — Degl. u. G. n. 109. — n. 109 A. = P. coccinea. Selys. —

320. Pyrrhula githaginea. Temm.

Canaren: Bolle. Nord-Afrika. — [Hat sich nach Italien, die Griechischen Inseln und einmal nach Frankreich verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 400. — Roux. Orn. Prov. t. 74. — Gould. t. 208. — Schl. u. Bp. Lox. 33. — N. 1858. t. 2. f. 1—2. —
2) Eier: Bäd. t. 76. f. 3. —

Licht. Doubl. p. 24. n. 242. — Cuv. Règne an. p. 80. n. 3. — Audub. Descr. d. l'Eg. XXIII. p. 369. — Schinz. p. 239. — K. u. Bl. n. 111. — Schl. Rev. I. p. 66. — Rüpp. S. Ueb. n. 315. — Bp. Consp. I. Gen. 1067. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 822. — Schl. u. Bp. Lox. p. 29. — Br. Thierl. III. p. 106. — Degl. u. G. n. 110. — Heugl. N. O. Afr. n. 547. —

N. 1858. p. 130. — p. 369. — Cab. Journ. 1859. p. 320. —

321. Pyrrhula sibirica. K. u. Bl.

Daurien: Dybowski. — [Wohl nur irrthümlich in Europäischen Verzeichnissen angeführt. ?]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 205. — Schl. u. Bp. Lox. t. 34. — t. 35. —

2) Eier:

Pall. It. II. app. n. 24. — Pall. Zoogr. II. p. 10. n. 181. — Temm. Man. I. p. 340. — Br. Lehrb. p. 174. — K. u. Bl. n. 105. — Schl. Rev. II. p. 81. — Bp. Consp. I. Gen. 1064. n. 1. — Schl. u. Bp. Lox. p. 30. — Br. Thierl. III. p. 105. —

Cab. Journ. 1869. p. 58. —

322. Pyrrhula rhodoptera. Temm.

Nord-Afrika. Asien. — [Nach Bonaparte in Europa vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Schl. u. Bp. Lox. t. 30. — t. 31. —

2) Eier:

Bp. List. B. p. 34. n. 227. — Gould. Proceed. Zool. Soc. 1837. p. 127. — K. u. Bl. n. 111. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 81. — Bp. Consp. I. Gen. 1067. n. 2. — Schl. u. Bp. Lox. p. 27. — Mus. Hein. I. p. 157. Anmerk. — Heugl. N. O. Afr. n. 546. —

323. Pyrrhula erythrina. Temm.

Russland. Sibirien. Hat schon in Deutschland gebrütet. Auf Sylt.: Naumann. Im Schlesischen Gebirge: Tobias. Bei Breslau: Gloger. — [Süd-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 206. — N. V. D. t. 113. f. 1—2. — Schl. u. Bp. Lox. t. 14. — Roux. Orn. Prov. Suppl. I. t. 78. = Fr. incerta Risso. — Bp. Faun. Ital. t. 38. = Fr. incerta. —

2) Eier: Bäd. t. 20. f. 12. — N. 1858. t. 2. f. 3—4. —

Temm. Man. I. p. 336. — Pall. Nov. Com. Petr. XIV. p. 587. — Pall. Zoogr. II. p. 8. n. 180. — M. u. W. I. p. 166. — Br. Lehrb. p. 171. — Schinz. p. 237. n. 2. — N. V. D. IV. p. 418. — K. u. Bl. n. 110. — Schl. Rev. I. p. 67. — Bp. Consp. I. Gen. 1066. n. 10. — Schl. u. Bp. Lox. p. 12. — Mus. Hein. I. n. 823. — Br. Thierl. III. p. 103. — Degl. u. G. n. 112. —

N. 1853. p. 428. — 1856. p. 275. — 1858. p. 130. — p. 275. — Cab. Journ. 1867. p. 235. —

(Risso Nat. Hist. III. p. 52. n. 125. — Roux. Orn. Prov. Suppl. I. p. 378. — Schinz. p. 241. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 62. — Bp. Consp. I. Gen. 1045. n. 1. — Degl. u. G. I. p. 607. — Cab. Journ. 1856. p. 313. — 1860. p. 226. = Fr. incerta. —)

324. Pyrrhula rosea. Temm.

Sibirien. — [Hat sich schon bis nach Helgoland verflogen: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 207. — N. V. D. t. 113. f. 3. — Schl. u. Bp. Lox. t. 19. — t. 20. —

2) Eier:

Temm. Man. I. p. 335. — Pall. It. III. app. p. 699. n. 26. — Pall. Zoogr. III. p 23. n. 192. — Br. Lehrb. p. 170. — Schinz. p. 237. n. 1. — N. V. D. IV. p. 427. — XIII. p. 195. — K. u. Bl. n. 109. — Schl. Rev. I. p. 67. — Bp. Consp. I. Gen. 1066. n. 7. — Schl. u. Bp. Lox. p. 18. — Br. Thierl. III. p. 103. — Degl. u. G. n. 113. —

325. Pyrrhula rhodochlamys. Brandt.

Asien. — [Einige Schriftsteller führen ihn ohne nähere Angabe als Europäischen Vogel auf. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Schl. u. Bp. Lox. t. 25. — t. 24. = P. sophia. —

2) Eier:

Bull. Acad. St. Petersb. 1843. p. 27. — Bp. Consp. I. Gen. 1066. n. 6. — Schl. u. Bp. Lox. p. 22. — Mus. Hein. I. n. 827. —

326. Corythus enucleator. Cuv.

Lappland. Finnland. Nord-Amerika = C. canadensis. — [Dann und wann in Deutschland. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 135. f. 1. — Gould. t. 204. — N. V. D. t. 112. f. 1—2. — Schl. u. Bp. Lox. t. 11. — t. 12. = C. canadensis. — Wils. Am. Orn. t. 5. f. 2. = C. canadensis. —

2) Eier: Thien. t. 36. f. 1. — Bäd. t. 20. f. 11. — t. 76. f. 11. Besser.

L. S. XII. p. 299. n. 3. — Cuv. Règne an. I. p. 415. — Temm. Man. I. p. 333. — Pall. Zoogr. II. p. 5. n. 178. — M. u. W. I. p. 142. — Br. Lehrb. p. 169. — Schinz. p. 236. — N. V. D. IV. p. 403. — K. u. Bl. n. 108. — Schl. Rev. I. p. 67. — Bp. Consp. I. Gen. 1063. n. 1. — Schl. u. Bp. Lox. p. 9. — Mus. Hein. I. n. 829. — n. 830 = C. canadensis. — Br. Thierl. III. p. 99. — Degl. u. G. n. 114. —

N. 1855. p. 425. —

327. Coccothraustes vulgaris. Pall.

Mittel-Europa. Süd-West-Sibirien. — [Süd-Europa. Nord-West-Afrika: A. Brehm.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 99—100 — Gould. t. 199. — N. V. D. t. 114. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 36. f. 2. a b c. — Bäd. t. 12. f. 1. —

L. S. XII. p. 299. n. 2. — Pall. Zoogr. II. p. 12. n. 182. — M. u. W. I. p. 143. — Br. Lehrb. p. 176. — Schinz. p. 240. n. 1. — N. V. D. IV. p. 435. — K. u. Bl. n. 127. — Bp. Consp. I. Gen. 1037. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 801. — Degl. u. G. n. 118. — Br. Thierl. III. p. 173. —

328. Coccothraustes caucasicus, Pall.

Asien. — [Mir ist kein sicher constatirtes Vorkommen in Europa bekannt.]

Abbild 1) Vogel: Schl. u. Bp. Lox. t. 26 — Nov. Com. Petr. XIX. t. 12.
2) Eier:

Pall. Zoogr II. p. 13. n. 183. — Güld. Nov. Com. Petr. XIX. p. 464. n. 1. — K. u. Bl. n. 107. — Schl. Rev. I. p. 65. — II. p. 79. — Bp. Consp. I. Gen. 1066. n. 5. — Schl. u. Bp. Lox. p. 23. — Degl. u. G. n. 111. —

329. Passer domesticus. Koch.

Ganz Europa. Nord-Asien. Nord-Afrika. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 184. f. 1. — N. V. D. t. 115. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 34. f. 15. a—e. — Bäd. t. 12. f. 7. —

L. S. XII. p. 323. n. 36. — Gessn. Av. p. 643. — M. u. W. I. p. 156. — Br. Lehrb. p. 182. — Schinz. p. 242. n 1. — N V. D. IV. p. 253. — K. u. Bl. n. 104. — Schl. Rev. I. p. 64. — Rüpp. S. Ueb. n. 291. — Bp. Consp. I. Gen. 1040. n. 9. — Br. Thierl. III. p. 155. — Degl. u. G. n. 106. — Heugl. N. O. Afr. n. 520. —

330. Var. Passer Italiae. Degl.

Italien. Provence. Nord-Afrika. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 184. f. 2. — Vieill. Galer. I. t. 63. —
2) Eier: Bäd. t. 12. f. 8. —

Vieill. Nouv. Dict. XII. p. 199. — Temm. Man. I. p. 351. — Br. Lehrb. p. 184. — Schinz. p. 242. n. 2. — K. u. Bl. n. 104. Var. β. — Schl. Rev. I. p. 64. — Rüpp. S. Ueb. n. 292. — Bp. Consp. I. Gen. 1040. n. 10. — Mus. Hein. I. n. 789. — Degl. u. G. n. 106. A. — Heugl. N. O. Afr. n. 521. —

331. Passer salicarius. K. u. Bl.

Portugal. Spanien. Griechenland. Macedonien. Süd-Russland: von Heuglin. Canaren: Bolle. Capverden: Dohrn. Nord-Afrika. Klein-Asien. Indien, Java, Japan, Timor: von Heuglin. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 185. f. 1. — Roux. Orn. Prov t. 84. —
2) Eier: Thien t. 34. f. 14. a b c. — Bäd. t. 12. f. 6. —

Temm. Man. I. p. 353. — Br. Lehrb. p. 185. n. 1. — Schinz. p. 243. n. 1. — K. u. Bl. n. 104. Var. γ. — Schl. Rev. I. p. 64. — Rüpp. S. Ueb. n. 293. — Bp. Consp. I. Gen. 1040. — n. 11. — Mus. Hein. I. n. 790. — Br. Thierl. III. p. 162. — Degl. u G. n. 106. B. — Heugl. N. O. Afr. n. 522. Cab. Journ. 1857. p. 303. —

332. Passer montanus. Koch.

Nord- und Mittel-Europa. Nord-Asien. — [Nord-Afrika. Japan.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 267. — Gould. t. 185. f. 2. — N. V. D. t. 116. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 34. f. 13. a—d. Bäd. t. 12. f. 6. —

L. S. XII. p.324. n. 37. — Aldrov. Orn. p. 560. — Pall. Zoogr. II. p. 30. n. 198. — M. u. W. I. p. 158. — Br. Lehrb. p. 185. n. 2. — Schinz. p. 243. n. 2. — N. V. D. IV. p. 480. — K. u. Bl. n. 103. — Schl. Rev. I. p. 64. — Rüpp. S. Ueb. n. 294. — Bp. Consp. I. Gen. 1040. n. 1. — Mus. Hein. I. n. 792. — Br. Thierl. III. p. 165. — Degl. u. G. n. 107. —

333. Passer petronius. Koch.

Portugal. Spanien: A. Brehm. Süd-Frankreich. Griechenland. Macedonien. Klein-Asien. Canaren: Bolle. — [Verfliegt sich bis nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 225. — Gould. t. 186. — N. V. D. t. 116. f. 3—4. —

2) Eier: Thien. t. 34. f. 18. a b c. — Bäd. t. 12. f. 10. —

L. S. XII. p. 322. n. 30. — M. u. W. I. p. 168. — Schinz. p. 241. n. 2. — N. V. D. IV. p. 497. — K. u. Bl. n. 122. — Schl. Rev. I. p. 65. — Bp. Consp. I. Gen. 1044. n. 3. — Mus. Hein. I. n. 797. — Br. Thierl. III. p. 168. — Degl. u. G. n. 108. —

334. Loxia pytiopsittacus. Bechst.

Sichere Eier erhielt ich nur aus Thüringen. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 201. — N. V. D. t. 109. f. 1—3. — Schl. u. u. Bp. Lox. t. 1. —

2) Eier: Thien. t. 36. f. 17. a b. — Bäd. t. 76. f. 12. Besser. —

Bechst. Orn. Tasch. I. p. 106. — M. u. W. I. p. 137. — Br. Lehrb. p. 164. — Schinz. p. 234. n. 1. — N. V. D. IV. p. 339. — K. u. Bl. n. 128. — Schl. Rev. I. p. 67. — Bp. Consp. I. Gen. 1062. n. 1. — Schl. u. Bp. Lox. p. 3. — Mus. Hein. I. n. 882. — Br. Thierl. III. p. 91. — Degl. u. G. n. 116.

335. Loxia curvirostra. L.

Süd-Frankreich. Schweden. Harz, Thüringerwald, Schlesische Gebirge, wahrscheinlich auch in Oberschlesien und Preussen: Borggreve. Sibirien. Inner-Asien = L. himalayana. Hodgs. Nord-Amerika = L. americana Wils. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 218. — Gould. t. 202. — N. V. D. t. 110. f. 1—4. — Schl. u. Bp. Lox. t. 2., — 3., — 4. — t. 5. = rubrifasciata Br. — t. 6. = L. americana Wils. (Bp.) — t. 7. = L. himalayana Hodgs. — Wils. Am. Orn. t. 31. f. 3. = L. americana Wils. —

2) Eier: Thien. t. 36. f. 18. a b c. — Bäd. t. 20. f. 8. Besser. — t. 20. f. 9. = L. rubrifasciata Br. —

L. S. XII. p. 299. n. 1. — Pall. Zoogr. II. p. 4. n. 177. — M. u. W. I. p. 140. — Br. Lehrb. p. 166. — Schinz. p. 234. n. 2. — N. V. D. IV. p. 356. — K. u. Bl. n. 129. — Schl. Rev. I. p. 68. — Bp. Consp. I. Gen. 1062. n. 2. — Schl. u. Bp. Lox. p. 4. — p. 6 = L. himalayana Hodgs. — p. 5. = L. americana Wils. — L. rubrifasciata Br. — Mus. Hein. I. n 831. — Br. Thierl. III. p. 91. — Degl. u. G. n. 115. —

Cab. Journ. 1863. Extrh. p. 17. = L. balearica A. v. Hom.

336. Loxia leucoptera. Gm.

Bei Archangel. Sibirien. Labrador. — [Verfliegt sich in manchen Jahren bis England und Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 203. — N. V. D. t. 385. f. 1—4. — Schl. u. Bp. Lox. t. 9. — 10. — t. 8 = L. bifasciata. — Wils. Am. Orn. t. 31. f. 3.

2) Eier: Bäd. t. 20. f. 10. –

Gm. L. S. p. 844. n. 12. — Schinz. p. 235. — K. u. Bl. n. 130. — Schl. Rev. 1. p. 68. — II. p. 82. — Bp. Consp. I. Gen. 1062. n. 4. — Schl. u. Bp. Lox. p. 8. — p. 7. = L. taenioptera. — N. V. D. XIII. p. 188. — Mus. Hein. I. n. 833. — Br. Thierl. III. p. 91. — Degl. u. G. n. 117. —

Cab. Journ. 1860. p. 397. —

V. COLUMBAE.

337. Columba palumbus. L.

Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. Asien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 316. — Gould. t. 243. — N. V. D. t. 149. f. 1—2. — Rchb. f. 1241.—42. —

2) Eier: Thien. t. 11. f. 12. — Bäd. t. 67. f. 5. —

L. S. XII. p. 282. n. 19. — M. u. W. I. p. 286. — Br. Lehrb. p. 410. — N. V. D. VI. p. 168. — Schinz. p. 273. — K. u. Bl. n. 264. — Schl. Rev. I. p. 73. — Bp. Consp. II. Gen. 38. n. 1. — Br. Thierl. IV. p. 262. — Degl. u. G. n. 285. —

338. Columba oenas. Gm.

Süd- und Mittel-Europa bis Mittel-Schweden. — [Algerien: Loche. Palästina, Persien, am Irtisch und Altai: von Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 244. — N. V. D. t. 151. f. 1—2. — Rchb. f. 1247.—49. —

2) Eier: Thien. t. 11. f. 13. — Bäd. t. 67. f. 6. —

Gm. L. S. p. 769. n. 2. — Briss. Orn. I. p. 86. n. 5. — M. u. W. I. p. 287. — Br. Lehrb. p. 414. — Schinz. p. 274. n. 1. — N. V. D. VI. p. 215. — K. u. Bl. n. 265. — Schl. Rev. I. p. 73. — Bp. Consp. I. Gen. 44. n. 7. — Degl. u. G. n. 286. — Br. Thierl. IV. p. 267. — Heugl. N. O. Afr. n. 666.

339. Columba livia. Briss.

Süd-Portugal; sehr häufig. Spanien: A. Brehm. Balearen: A. v. Homeyer. Cykladen: Ehrhard. Orkney-Inseln. Capverden: Dohrn. Canaren: Bolle. Nord-Afrika. Asien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 510. — Gould. t. 245. — N. V. D. t. 150. f. 1—2. — Rchb. f. 1245.—46. —

2) Eier: Thien. t. 11. f. 14. — Bäd. t. 67. f. 7. —

Briss. Orn. I. p. 82. n. 3. — L. S. XII. p. 279. n. 1. — M. u. W. I. p. 288. — Br. Lehrb. p. 411. — Schinz. p. 274. n. 3. — N. V. D. VI. p. 187. — K. u. Bl. n. 266. — Schl. Rev. I. p. 73. — Rüpp. S. Ueb. n. 361. —

Bp. Consp. II. Gen. 44. n. 2. — Br. Thierl. III. p. 268. — Degl. u. G n. 287. — Heugl. N. O. Afr. n. 667. —
Cab. Journ. 1855. p. 172. — 1858. p. 24. —

340. Columba turtur. L.

Süd- und Mittel-Europa. Canaren: Bolle. Algerien: Loche. West-Asien: von Heuglin. — [Verfliegt sich bis Lappland.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 394. — Gould. t. 246. — N. V. D. t. 152. f. 1—2. — Rchb. f. 1356—58. —
2) Eier: Thien. t. 11. f. 5. — Bäd. t. 67. f. 8. —

L. S. XII. p. 284. n. 32. — M. u. W. I. p. 289. — Br. Lehrb. p. 415. — Schinz. p. 275. n. 2. — N. V. D. VI. p. 233. — K. u. Bl. n. 267. — Schl. Rev. I. p. 74. — Rüpp. S. Ueb. n. 365. — Bp. Consp. II. Gen. 55. n. 4. — Br. Thierl. IV. p. 279. — Degl. u. G. n. 289. — Heugl. N. O. Afr. n. 675.

341. Columba rupicola. Pall.

Daurien: Dybowski. — [Soll in Schweden vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 550. — Rchb. f. 1359. — f. 2585. —
2) Eier:
Bp. Consp. II. Gen. 55. n. 1. — Degl. u. G. n. 290. —

342. Columba senegalensis. L.

Afrika. West-Asien. — [Die Angaben über das Vorkommen in Süd-Europa (Portugal, Spanien, Griechenland) haben sich nicht bestätigt.]

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 1375—76. — Levaill. Ois. d'Afr. t. 270. —
2) Eier: Bäd. t. 67. f. 11. —

L. S. I. p. 283. — Lath. Ind. Orn. II. p. 607. n. 49. — Schinz. p. 248. — Schl. Rev. I. p. 74. — II. p. 88. — Bp. Consp. II. Gen. 55 n. 9. — Hartl. W. Afr. n. 570. — Rüpp. S. Ueb. n. 367. — Heugl. N. O. Afr. n. 674.

343. Columba risoria. L.

Asien. Nord-Afrika: A. Brehm. Am Lago-Maggiore und auf Isola Madre verwildert: Bolle. — [In Europa häufig domesticirt.]

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 1366. — f. 1365 = Var. alba. —
2) Eier: Thien. t. 11. f. 8. — Bäd. t. 67. f. 9. —

L. S. XII. p. 285. n. 33. — K. u. Bl. n. 268. — Rüpp. S. Ueb. n. 366. — Bp. Consp. II. Gen. 56. n. 5. — Br. Thierl. IV. p. 282.
Cab. Journ. 1858. p. 460.

344. Columba migratoria. L.

Nord-Amerika. — [Wurde im December 1825 bei Westhall in England geschossen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 176. — Wils. Am. Orn. t. 41. f. 2. — Audub. B. Am. t. 62. — Gould. t. 247. — Rchb. f. 1377.—79. —

2) Eier: Thien. t. 11. f. 11. —

L. S. XII. p. 285. n. 36. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. II. p. 293. — IV. p. 319. — Schinz. p. 274. n. 2. — K. u. Bl. n. 269. — Schl. Rev. I. p. 74. — Bp. Consp. II. Gen. 54. — Degl. u. G. n. 288. — Br. Thierl. IV. p. 273. —

VI. GALLINAE.

345. Syrrhaptes paradoxus. Ill.

Oestlich vom Kaspischen Meere bis zur Mongolei. Im Juni 1863 in Jütland und Dänemark. — [Seit 1859 öfter in Europa, besonders häufig im Jahre 1863 in Deutschland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 95. — Gray. Gen. B. t. 134. — Determ. f. 4. — Rchb. f. 1807.—8. —

2) Eier:

Pall. It. II. app. 111. — K. u. Bl. n. 271. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 90. — Degl. u. G. n. 294. — Br. Thierl. IV. p. 322.

Cab Journ. 1863. p. 241. — p. 248. — p. 296. — p. 321. — p. 387. — p. 390. p. 392. — p. 395. — 1864. p. 52. — p. 61. — p. 74. — p. 80. — p. 297. — p. 339. — 1865. p. 291. — p. 293. — 1867. p. 37. Eier. — p. 234.

346. Pterocles arenarius. Temm.

Portugal. Spanien. Nord-West-Afrika. Asien. — [Canaren: Bolle. Verfliegt sich nach Süd-Frankreich, und wurde auch in Deutschland (Anhalt) im Jahre 1801 von Naumann beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 354. — pl. 360. — Gould. t. 257. — N. V. D. t. 153. f. 1—2. — Rchb. f. 1809—12. —

2) Eier: Thien. t. 10. f. 1. ? — Bäd. t. 67. f. 1. Die Abbildung ist nach verbleichten Exemplaren gefertigt. —

Pall. Nov. Com. Petrop. XIX. p. 418. — Pall. It. III. app. p. 699. n. 27. — Pall. Zoogr. II. 73. n. 223. — Temm. Man. II. p. 476. — Br. Lehrb. p. 420. — Schinz. p. 284. — N. V. D. VI. p. 258. — K. u. Bl. n. 271. — Schl. Rev. I. p. 79. — Degl. u. G. n. 293. — Br. Thierl. IV. p. 313.

347. Pterocles alchata. Steph.

Portugal. Spanien. Klein-Asien: Krüper. Mittel-Asien. Algerien. Egypten. — [Fast alljährlich in Süd-Frankreich. Canaren: Bolle. Soll einmal in Hannover vorgekommen sein: Borggreve.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 105.—106. — Gould. t. 258. — Rchb. f. 1813.—14. —

2) Eier: Thien. t. 10. f. 2. ab. — Bäd. t. 21. f. 8. Besser. —

L. S. XII. p. 276. n. 11. — Pall. Zoogr. II. p. 73. n. 222. — Temm. Man. II. p. 478. — Steph., Shaw. Zool. XI. 2. p. 311. — Br. Lehrb. p. 421. — Schinz. p. 285. — K. u. Bl. n. 270. — Schl. Rev. I. p. 78. — Degl. u. G n. 292. — Br. Thierl. IV. p. 313. —

348. Lagopus alpinus. Nils.

Schweiz. Steiermark. Lappland: von Nordmann. Sibirien: von Middendorff. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 129. — pl. 494. — Gould. t. 253. — 254. — N. V. D. t. 161. — 162. — Rchb. f. 1841—49. —

2) Eier: Thien. t. 8. f. 7. a—d. Undeutlich. — Bäd. t. 46. f. 3. — f. 1. = L. montanus. Br. —

Temm. Man. II. p. 468. — Nils. Skand. Faun. II. p. 98. — M. u. W. I. p. 298. — Br. Lehrb. p. 445. — p. 448. = L. montanus. Br. — Schinz p. 281. n. 2. — N. V. D. VI. p. 401. — K. u. Bl. n. 274. — Schl. Rev. I. p. 76. — II. p. 89. — Degl. u. G. n. 297. — Br. Thierl. IV. p. 376. —

349. Var. Lagopus islandorum. (Faber.)

Island. —

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 1850—57. —

2) Eier: Bäd. t. 46. f. 2. —

Faber, Prodrom. p. 6. n. 1. — Br. Lehrb. p. 440. — K. u. Bl. p. 64. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 76. — II. p. 90. —

350. Lagopus albus. Vieill.

Norwegen. Lappland. Finnland. Sibirien: Radde. Labrador. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 255. — t. 256. = L. brachydactylus. Br. — — N. V. D. t. 159. f. 1—2. — Rchb. f. 1858—62. — f. 2929 = L. brachydactylus. Br. —

2) Eier: Thien. t. 8. f. 6. a—d. — Bäd. t. 46. f. 4. Besser. —

Gm. L. S. p. 750. n. 23. — Temm. Man. II. p. 471. — Pall. Zoogr. II. p. 67. = L. brachydactylus. — Br. Lehrb. p. 436. — p. 440. = L. brachydactylus. — p. 986. = L. Reinhardi. Br. — Schinz. p. 283. — p. 436. n. 1. = L. Reinhardi. — N. V. D VI. p. 381. — K. u. Bl. n. 273. — Anmerk. = L. brachydactylus. — Schl. Rev. I. p. 75. — II. p. 88. = L. brachydactylus. — Degl. u. G. n. 296. — Br. Thierl. IV. p. 369. —

Cab. Journ. 1861. p. 288. — 1869. p. 90.

351. Lagopus scoticus. Vieill.

Schottland. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 252. — Rchb. f. 1863—75. —

2) Eier: Bäd. t. 46. f. 5. —

Briss. Orn. I. p. 199. n. 5. — Lath. Ind. Orn. II. p. 641. n. 15. — Br. Lehrb. p. 434. — Schinz. p. 281. n. 1. — K. u. Bl. n. 272. — Schl. Rev. I. p. 76. — II. p. 89. — Degl. u. G. n. 295. — Br. Thierl. IV. p. 374. —

252. Tetrao urogallus. L.

Westphalen. Thüringen. Schlesien. Schweiz. Steiermark. Schweden. Norwegen. Liefland. Provinz Preussen. Finnland: von Nordmann. Nord-Russland. Sibirien.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 73 74. — Gould. t. 248. — N. V. D. t. 154—155. — Rchb. f. 1909—13. — Midd. Sib. Reise II. t. 18. f. 1—3. = T. urogalloïdes. Midd. —

2) Eier: Thien. t. 9. f. 1. a b. — Bäd. t. 29. f. 2. Besser. —

L. S. XII. p. 273. n. 1. — M. u. W. I. p. 293. — Br. Lehrb p. 427. — Schinz. p. 278. — N. V. D. VI. p. 277. — K. u. Bl. n. 275. — Schl. Rev. I. p. 75. — Midd. Sib. Reise II. p. 195. = T. urogalloïdes. Midd. — Degl. u. G. n. 298. — Br. Thierl. IV. p. 335. —

353. Tetrao tetrix. L.

Schweden. Norwegen. Deutschland (Preussen und Schlesien noch häufig). Schweiz. Sibirien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 172.—173. — Gould. t. 250. — N. V. D. t. 157. f. 1—2. — Rchb. f. 2502—3. —

2) Eier: Thien. t. 9. f. 2. a b. — Bäd. t. 29. f. 3. Besser. —

L. S. XII. p. 274. n. 2. — M. u. W. I. p. 295. — Br. Lehrb.. p. 432. — Schinz. p. 279. n. 2. — N. V. D. VI. p. 324. — K. u. Bl. n. 276. — Schl. Rev. I. p. 75. — Degl. u. G. n. 299. — Br. Thierl. IV. p. 347. —

354. Abrr. Tetrao medius. Meyer.

Bastard von Tetrao urogallus und T. tetrix. —

Skandinavien. Schweiz. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 249. — N. V. D. t. 156. f. 1—2. — Rchb. f. 1905—6. —

2) Eier:

Meyer. Mag. Ges. naturf. Fr. V. Quartal 3. 1811. — Br. Lehrb. p. 430. — Schinz. p. 279. n. 1. — N. V. D. VI. p. 304. — K. u. Bl. n. 276. Anmerk. — Degl. u. G. n. 299. A. — Br. Thierl. IV. p. 354. —

N. 1854. p. 244. — 1855. p. 108. — Cab. Journ. 1851. p. 131. —

355. Abrr. Tetrao lagopoïdes. Nils.

Bastard von Tetrao tetrix und uud Lagopus albus. —

Skandinavien. —

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. VI. Titelkupfer. — Sparrm. Mus. Carls. t. 65. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 753. — Temm. Man. II. p. 461. — Nils. Orn. Suec. I. p. 303. — N. V. D. VI. p. 334. — Degl. u. G. n. 299. B.

N. 1854. — p. 244. — Cab. Journ. 1854. p. 132. —

356. Tetrao bonasia, L.

Schweden. Norwegen. Ost-Preussen. Polen. Russland. Sibirien: von Middendorff. Westphalen. Schweiz. Steiermark. Schlesien. —

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 174—175. — Gould. t. 251. — N. V. D. t. 158. f. 1—2. — Rchb. f. 1835—37. —

L. S. XII. p. 275. n. 9. — M. u. W. I. p. 297. — Br. Lehrb. p. 424. — Schinz. p. 280. — N. V. D. VI. p. 358. — K. u. Bl. n. 277. — Schl. Rev. I. p. 75. — Degl. u. G. n. 300. — Br. Thierl. IV. p. 356. —

357. Tetraogallus caucasicus. Gray.

Kaukasus, Armenien, Kurdistan: Radde. —

Abbild. 1) Vogel: Gray. Gen. B. t. 229. — Determ. t. 129. f. 3. — Rchb. f. 1990—91. — f. 2542. —

2) Eier:

Pall. Zoogr. II. p. 76. n. 225. — K. u. Bl. n. 283. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 76. — II. p. 90. — Degl. u. G. n. 301. — Br. Thierl. IV. p. 384. —

358. Numida meleagris. L.

West-Afrika. Verwildert in Griechenland. Auf den Capverden: Darwin. St. Thomé: Weiss. Guinea: Pel. Haiti: Sallé. Cuba: Gundlach. — [In und ausserhalb Europa vielfach domesticirt.]

Abbild. 1) Vogel: Fraser Zool. typ. VI. t. 2. — Rchb. f. 1586. —

2) Eier: Thien. t. 6. f. 3. — Bäd. t. 20. f. 1. —

L. S. XII. p. 273. n. 1. — Ogilby. Proceed. Zool. Soc. 1835. p. 103. — Sallé Proceed. Zool. 1857. p. 236. — Sw. W. Afr. II. p. 226. — K. u. Bl. n. 282. — Br. Thierl. IV. p. 477. —

Cab. Journ. 1865. p. 433. Bastard von N. meleagris und Gallus domesticus. —

359. Phasianus colchicus. L.

West-Asien. — [In Europa vielfach acclimatisirt und stellenweise vollständig verwildert, z. B. in Böhmen.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 121. — 122. — Gould. t. 247. — N. V. D. t. 162. f. 1—2. — Rchb. f. 1925—37. —

2) Eier: Thien. t. 7. f. 3. — Bäd. t. 65. f. 1. —

L. S. XII. p. 271. n. 3. — M. u. W. I. p. 291. — Br. Lehrb. p. 454. — Schinz. p. 277. — N. V. D. VI. p. 433. — K. u. Bl. n. 278. — Schl. Rev. I. p. 74. — Degl. u. G. n. 310. — Br. Thierl. IV. p. 456. —

360. Francolinus vulgaris. Steph.

Cypern. Klein-Asien: von Gonzenbach. Syrien: Sperling. Afganistan: Hutton. Indien: Jerdon. Früher auf Sicilien: Malherbe. Ebenso in Süd-Spanien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 147—148. — Gould. t. 259. — Rchb. f. 1738—40. — f. 2528—29. — f. 2884—85. —

2) Eier: Thien. t. 7. f. 8. Falsch. — (f. 9. würde besser passen.) — t. 99. f. 1. Falsch. — Bäd. t. 21. f. 1.

L. S. XII. p. 275. n. 10. — Gessn. Av. p. 228. — Briss. Orn. I. p. 245. n. 13. — Cuv. Règne an. I. p. 484. — Br. Lehrb. p. 458. — Schinz. p. 287. — K. u. Bl. n. 283. — Schl. Rev. I. p. 77. — Degl. u. G. n. 302. — Br. Thierl. IV. p. 404. —

361. Starna cinerea. K. u. Bl.

Nord-Spanien (Asturien, Leon, Catalonien): A. Brehm. Nord-Frankreich. Gross-Britannien. Belgien. Holland. Deutschland. Dänemark. Finnland: von Nordmann. Nord-Italien. Böhmen. Mähren. Ungarn. Süd-Russland (Kiew): Göbel. Sibirien: von Middendorff.

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 170. — Gould. t. 262. — N. V. D. t. 163. f. 1—2. — Rchb. f. 1694—96. — f. 1697 = Var. P. leucoptera Rchb. — f. 1699 = Var. P. pallida. Rchb. — f. 1698 = Var. P. variegata. Rchb. —

2) Eier: Thien. t. 7. f. 12. — Bäd. t. 21. f. 5. —

L. S. XII. 276. n. 13. — Briss. Orn. I. p. 219. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 646. n. 11. — M. u. W. I. p. 303. — Br. Lehrb. p. 464. — Schinz. p. 289. n. 2. — N. V. D. VI. p. 477. — K. u. Bl. n. 287. — Schl. Rev. I. p. 78. — Degl. u. G. n. 307. — Br. Thierl. IV. p. 396. —

362. Perdix petrosa. Lath.

Algerien. Canaren: Bolle. — [Süd-Frankreich. Italien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 261. f. 1. — Rchb. f. 1727—28. —

2) Eier: Thien. t. 7. f. 7. — Bäd. t. 21. f. 4. Besser. —

Lath. Ind. Orn. II. p. 468. n. 14. — Br. Lehrb. p. 462. — Schinz. p. 289. n. 1. — K. u. Bl. n. 284. — Schl. Rev. I. p. 77. — Degl. u. G. n 306. — Br. Thierl. IV. p. 395. —

Cab. Journ. 1857 p. 333. —

363. Perdix saxatilis. M. u. W.

Im ganzen Alpengebiet. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 231. — Gould. t. 261. f. 2. — N. V. D. t. 164. f. 1—2. — Rchb. f. 1719—24. —

2) Eier: Thien. t. 7. f. 5. a b. — Bäd. t. 21. f. 3. Besser. —

M. u. W. I. p. 305. — Br. Lehrb. p. 460. — Schinz. p. 288. n. 1. — N. V. D. VI. p. 546. — K. u. Bl. n. 266. — Schl. Rev. I. p. 77. (part.) — Degl. u. G. n. 303. (part.) — Br. Thierl. IV. p. 388. (part.) —

364. Var. Perdix graeca. Briss.

Griechenland Macedonien. Klein-Asien. Palästina, Arabien: A. Brehm. —

Abbild. 1) Vogel: Gray. Ind. Zool. I. t. 54.

2) Eier: Bäd. t. 67. f. 2. Nicht ganz treu. —

Briss. Orn. I. p. 241. n. 12. — Bäd. Text zu t. 67. — Rüpp S. Ueb. n. 376. Cab. Journ. 1858. p. 30. —

365. Perdix chukar. Gray.

Klein-Asien. Indien.

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier:

Brandt. Bull. Acad. St. Petersb. 1843. — Gray. Gen. B. III. p. 508. — Degl. u. G. n. 304. —

Cab. Journ. 1858. p. 30. —

366. Perdix rubra. Briss.

Portugal. Spanien. Balearen: A. v. Homeyer. Süd-Frankreich. Nord-West-Afrika: A. Brehm. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 150. — Gould. t. 260. — N. V. D. t. 165. f. 1—2. — Rchb. f. 1712—18. —

2) Eier: Thien. t. 7. f. 6. a b. — Bäd. t. 21. f. 2. Besser; aber zu gelb.

L. S. XII. p. 276. n. 12. — Briss. Orn. I. p. 236. n. 10. — Gessn. Av. p. 682. — Br. Lehrb. p. 461. — Schinz. p. 288. n. 2. — N. V. D. VI. p. 563. — K. u. Bl. n. 285. — Schl. Rev. I. p. 77. — Degl. u. G. n. 305. — Br. Thierl. IV. p. 391. —

367. Coturnix communis. Bonn.

Süd- und Mittel-Europa. Mittel-Asien. Süd-Afrika (Capstadt). — [Nord- und Mittel-Afrika. Selten in Nord-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 96. — Gould. t. 263. — N. V. D. t. 166. f. 1—3. — Rchb. f. 1634—43. —

2) Eier: Thien. t. 8. f. 1. a b. — Bäd. t. 21. f. 6. —

L. S. XII. p. 278. n. 20. — Briss. Orn. I. p. 247. — Lath. Ind. Orn. II. p. 651. n. 28. — M. u. W. I. p. 306. — Br. Lehrb. p. 466. — Schinz. p. 290. — N. V. D. VI. p. 575. — K. u. Bl. n. 289. — Schl. Rev. I. p. 78. — Rüpp. S. Ueb. n. 383. — Degl. u. G. n. 308. — Br. Thierl. IV. p. 423. —

368. Turnix andalusicus. Roux.

Süd-Portugal: Du Bocage. Algerien. — [Süd-Spanien?]

Abbild. 1) Vogel: Roux Orn. Prov. t. 23. — Gould. t. 264. — Rchb. f. 1773—75. —

2) Eier: Thien. t. 8. f. 4. Unkenntlich. — t. 99. f. 2. — Bäd. t. 67. f. 4.

Gm. L. S. p. 766. n. 58—59. — Temm. Man. II. p. 491. — p. 495 = T. gibraltariensis. Bonn. — Br. Lehrb. p. 469. — p. 470 = T. gibraltariensis. Schinz p. 290. — K. u. Bl. n. 290. — n. 291 = T. gibraltariensis. — Degl. u. G. n. 309. — Br. Thierl. IV. p. 432.

VII. GRALLAE.

369. Grus cinerea. Bechst.

Schweden. Finnland. Pommern. Nord-Russland. Sibirien. Mark Brandenburg. Schlesien (Görlitz): A. v. Homeyer. Polen. Süd-Russland (Kiew: Göbel. An der Wolga.) — [Ganz Europa. Nord- und Mittel-Afrika: A. Brehm. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 769. — Gould. t. 270. — N. V. D. t. 231.
2) Eier: Thien t. 71. f. 1. — Bäd. t. 13. f. 1. —

L. S. XII. p. 234. n. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 674. n. 5. — Pall. Zoogr. II. p. 106. n. 240. — Bechst. Nat. D. IV. p. 103. — M. u. W. II. p. 350. — Br. Lehrb. p. 540. — Schinz. p. 306. — N. V. D. IX. p. 345. — K. u. Bl. n. 307. — Schl. Rev. I. p. 100. — Bp. Consp. II. Gen. 89. n. 1. — Degl. u. G. n. 382. — Br. Thierl. IV. p. 723. —

370. Grus virgo. Pall.

Süd-Russland. (An der Wolga. In der Krim.) Mittel-Asien. — [Afrika. Verfliegt sich bis Helgoland: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 241. — Gould. t. 272. — Gray. Gen. B. II. t. 149. f. 2. — N. V. D. t. 232. f. 1—2. — Rchb. f. 1237. —
2) Eier: Thien. t. 71. f. 4. — Bäd. t. 13. f. 2. —

L. S. XII. p. 234. n. 2. — Pall. Zoogr. II. p. 108. n. 241. — Vieill. Nouv. Dict. II. p. 163. — Lath. Ind. Orn. II. p. 35. n. 2. — Br. Lehrb. p. 541. — Schinz. p. 307. n. 1. — N. V. D. IX. p. 386. — K. u. Bl. n. 308. — Schl. Rev. I. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 93. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 421. — Degl. u. G. n. 385. — Br. Thierl. IV. p. 728. —

371. Grus Antigone. Pall.

Asien. — [Nach Nordmann am Don vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 865. — Vieill. Gal. Ois. t. 256. — Rchb. f. 1239–40. —
2) Eier: Jard. Contrib. 1850. t. 27. —

L. S. XII. p. 235. n. 6. — Pall. Zoogr. II. p. 102. n. 238. — K. u. Bl. n. 306. — Bp. Consp. II. Gen. 90. n. 3. — Degl. u. G. n. 383. —

372. Grus leucogeranus. Pall.

Asien. — [Nach Pallas an der Wolga vorgekommen. Ebenso bei Petersburg.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 467. — Gould. t. 271. — Rchb. f. 2859—60. —

2) Eier:

Gm. It. II. p. 189. — Pall. It. II. p. 438. — p. 714. — Pall. Zoogr. II. t. 103. n 239. — Penn. Arct. Zool. II. p. 455. — Br. Lehrb. p. 542. — Schinz. p. 307. n. 2. — K. u. Bl. n. 305. — Schl. Rev. I. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 90. n. 1. — Degl. u. G. n. 384. —

373. Balearica pavonia. Briss.

Süd- und Mittel-Afrika. — [Nach Degland auf Sicilien vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 265. — Wils. Am. Orn. t. 48. — Gray. Gen. B. II. t. 149. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 71. f. 6. —

Aldrov. Orn. III. p. 361. — Willugb. Orn. p. 275. — Bp. Consp. II. Gen. 94. n. 1. — Rüpp. S Ueb. n. 422. — Degl. u. G. n. 386. — Br. Thierl. IV. p. 730. —

374. Otis tarda. L.

Portugal. Spanien: A. Brehm. Frankreich. Deutschland (Thüringen, Anhalt). Ungarn und Süd-Russland, häufig. Mittel-Asien. — [Zeigt sich nur selten in Nord-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 245. — Gould. t. 267. — N. V. D. t. 167—168. — Rchb. f. 2135—41. —

2) Eier: Thien. t. 56. f. 1. a b c. — Bäd. t. 45. f. 1. —

L. S. XII. p. 264. n. 1. — M. u. W. I. p. 308. — Br. Lehrb. p. 473. — N. V. D. VII. p. 12. — Schinz. p. 293. — K. u. Bl. n. 294. — Schl. Rev. I. p. 79. — Degl. u. G. n. 311. — Br. Thierl. IV. p. 560. —

375. Otis tetrax. L.

Portugal. Süd-Spanien: A. Brehm. Süd-Frankreich. Süd-Russland. West-Asien. — [Ganz Süd-Europa. Verfliegt sich nicht allzuselten nach Mittel-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 10. — t. 25. — Gould. t. 269. — N. V. D. t. 169. f. 1—2. — Rchb. f. 2142—45. —

2) Eier: Thien. t. 56. f. 3. a b c. — Bäd. t. 45. f. 2. —

L. S. XII. p. 264. n. 3. — Briss. Orn. V. p. 24. n. 2. — Br. Lehrb. p. 476. — Schinz. p. 294. n. 1. — N. V. D. VII. p. 52. — K. u. Bl. n. 295. — Schl. Rev. I. p. 79. — Degl. u. G. n. 312. — Br. Thierl. IV. p. 565. —

376. Otis houbara. Gm.

Nord-Afrika. Arabien. — [Fast alljährlich in Süd-Spanien: Degland. Wurde in der Oberlausitz erlegt: Tobias. Im Herbst 1861 auf der Insel Drumsjö: von Nordmann.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 208. — N. V. D. t. 170. — Rchb. f. 2146—47.
2) Eier: Thien. t. 56. f. 4. a b. — Bäd. t. 45. f. 3. —
Gm. L. S. p. 725. n. 6. — Br. Lehrb. p. 477. — Schinz. p. 294. n. 2. — N. V. D. VII. p. 66. — XIII. p. 216. — K. u. Bl. n. 296. — Schl. Rev. I. p. 80. — Rüpp. S. Ueb. n. 394. — Degl. u. G. u. 313. — Br. Thierl. IV. p. 568. —
Cab. Journ. 1853. p. 213. —

377. Otis Macqueeni. Gray.

Asien. — [Im December 1844 und später noch einige Male bei Löwen erlegt: Dubois. Verfliegt sich bis nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Hardw. Ill. Zool. t. 47. — Rchb. f. 2148—49. — Cab. Journ. 1856. t. 3. —
2) Eier:
Degl. u. G. n. 314. — Br. Thierl. IV. p. 568. —
Cab. Journ. 1856. p. 301. —

378. Cursorius europaeus. Lath.

Nord-Afrika. Arabien. — [Ist schon zu wiederholten Malen in Europa beobachtet, und einige Male in Deutschland erlegt worden.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 795. — Gould. t. 266. — N. V. D. t. 171. f. 1—2. — Rchb. f. 2124.—26. —
2) Eier: Bäd. t. 59. f. 1. — N. 1854. t. 3 f. 6. —
Gm. L. S. p. 692. n. 27. — Lath. Ind. Orn. II. p. 751. n. 1. — Temm. Man. II. p. 513. — M. u. W. II. p. 328. — Br. Lehrb. p. 480. — Schinz. p. 296. — N. V. D. VII. p. 77. — K. u. Bl. n. 293. — Schl. Rev. I. p. 80. — Rüpp. S. Ueb. n. 397. — Degl. u. G. n. 318. — Br. Thierl. IV. p. 572. —
Cab. Journ. 1857. p. 335. —

379. Hyas aegyptiaca. Cab.

Afrika. — [In Europa von Herzog Ernst II. von Sachs.-Cob.-Gotha, in Süd-Spanien beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 918. — Gray. Gen. B. Déterm. t. 143. f. 1. — Rchb. f. 2120—23. —
2) Eier: Thien. t. 99. f. 18. — Bäd. t. 22. f. 1. — N. 1854. t. 3. f. 7. Rüpp. S. Ueb. n. 399. — Schl. Mus. Curs. p. 14. — Degl. u. G. n. 319. — Br. Thierl. IV. p. 575. —
Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 102. — 1854. p. 70. — 1855. p. 377. —

380. Glareola pratincola. L.

Donauländer. Griechenland. Süd-Russland. Provence: von Müller. Mittel-Asien. Nord-West-Afrika. — [Portugal: Du Bocage.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 822. — Gould. t. 265. — N. V. D t. 234. f. 1—3. — Rchb. f. 1619—22. —

2) Eier: Thien. t. 58. f. 1. a—k. — Bäd. t. 22. f. 4. —

L. S. XII. p. 345. n. 12. — Gm. L. S. p. 695. n. 1. — Briss. Orn. V. p. 141. — M. u. W. II. p. 404. — Br. Lehrb. p. 525. — Schinz. p. 292. — N. V. D. IX. p. 437. — K. u. Bl. n. 292. — Schl. Rev. I. p. 80. — Rüpp. S. Ueb. n. 400. — Hartl. W. Afr. n. 604. — Degl. u. G. n. 315. — Br. Thierl. IV. p. 578. —

381. Glareola melanoptera. Nordm.

Süd-Russland (an der Wolga). Nord-Afrika: A. Brehm. — [Mehrmals in Deutschland vorgekommen. Süd-Afrika (Port-Natal.)]

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 1623—24. — f. 2953—54. —

2) Eier: Thien. t. 58. f. 2. a b. — Bäd. t. 22. f. 3. —

Pall. Zoogr. II. p. 150. n. 269. — Bull. d. Mosc. 1842. p. 314. — Schl. Rev. I. p. 81. — II. p. 92. — Hartl. W. Afr. n. 605. — N. V. D. XIII. p. 262 — Degl. u. G. n. 316. —

N. 1857. p. 77. —

382. Oedicnemus crepitans. Temm.

Portugal. Spanien: A. Brehm. Balearen: A. v. Homeyer. Anhalt. Mark Brandenburg. Lausitz. Nord-Afrika, West-Asien: A. Brehm. — [Wurde schon in ganz Süd- und Mittel-Europa beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl 319. — Gould. t. 288. — N. V. D. t. 172. f. 1—2. — Rchb. f. 2439. —

2) Eier: Thien. t. 57. f. 4. a—d. — Bäd. t. 22. f. 2. —

L. S. XII. p. 255. n. 10. — Temm Man. II. p. 521. — M. u. W. II. p. 317. — Br. Lehrb. p. 482. — N. V. D. VII. p. 92. — Schinz. p. 297. — K. u. Bl. n. 309. — Schl. Rev. I. p. 81. — Rüpp. S. Ueb. n. 395. — Hartl. W. Afr. n. 600. — Degl. u. G. n. 317. — Br. Thierl. IV. p. 581. —

383. Hoplopterus spinosus. Bp.

Afrika. — [Einige Male in Süd-Europa (Griechenland: Lindermayer beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 801. — Gould. t. 293. — Gray. Gen. B. II. t. 145. f. 7. — Rchb. f. 697. — 698. —

2) Eier: Bäd. t. 6. f. 3. — Thien. t. 99. f. 20. —

Hasselq. It. p. 260. — L. S. XII. p. 256. n. 12. — K. u. Bl. n. 310. — Schl. Rev. I. p. 84. — Schinz. p. 302. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 407. — Degl. u. G. n. 329. — Br. Thierl. IV. p. 597. —

Cab. Journ. 1853. p. 102. — 1854. p. 79. —

384. Vanellus cristatus. M. u. W.

Mittel- und Nord-Europa. Nördlich bis Finnland: A. von Nordmann. Südlich bis Kiew: Göbel. Asien. — [Süd-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 242. — Gould. t. 291. — N. V. D. t. 179. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 58. f. 4. a—f. — Bäd. t. 6. f. 1. —

L. S. XII. p. 248. n. 2. — M. u. W. II. p. 400. — Br. Lehrb. p. 513. — Schinz. p. 303. — N. V. D. VII. p. 269. — K. u. Bl. n. 311. — Schl. Rev. I. p. 83. — Rüpp. S. Ueb. n. 402. — Degl. u. G. n. 332. — Br. Thierl. IV. p. 593. —

385. Vanellus gregarius. Vieill.

Süd-Russland (an der Wolga). — [Wurde einige Male in Frankreich erlegt. Einmal in Nord-Afrika (Cairo): von Heuglin.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 292. — Gray Gen. B. II. t. 145. f. 8. — Rchb. f. 2430—31. —

2) Eier: Bäd. t. 6. f. 2. — Thien. t. 99. f. 19. —

Vieill. Encycl. Orn. III. p. 1078. — n. 11. — Pall. It. I. app. n. 9. — Pall. Zoogr. II. p. 133. n. 256. — Temm. Man. III. p. 360. — Br. Lehrb. p. 512. — Schinz. p. 304. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 83. — Schl. Mus. Curs. p. 58. — Degl. u. G. n. 330. —

386. Vanellus leucurus. Glog.

Nord-Afrika. Asien. — [Wurde einmal auf Malta erlegt, und soll auch in Süd-Frankreich vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Sav. Descr. d. l'Eg. t. 6. f. 2. —

2) Eier:

Rüpp. S. Ueb. n. 404. — Hartl. W. Afr. n. 608. — Degl. u. G. n. 331. Cab. Journ. 1854. p. 78. — 1866. p. 386. —

387. Squatarola helvetica. K. u. Bl.

Sibirien (Byrrangá-Gebirge und an der Boganída: von Middendorff. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 853. — 854. — t. 923. — Wils. Am. Orn. t. 57. f. 4. — Gould. t. 290. — N. V. D. t. 178. f. 1—2. — Rchb. f. 673 —75. —

2) Eier: Midd. Sib. Reise II t. 19. f. 1. —

Gm. L. S. p. 682. n. 23. — Briss Orn. V. p. 100. n. 2. — p. 106. n. 4. — Bechst. Nat. D. IV. p. 356. — Cuv. Règne an. I. p. 502. — Pall. Zoogr. II. p. 142. n. 263. — M. u. W. II. p. 402. — Schinz. p. 304. n. 1. — N. V. D. VII. p. 249. — K. u. Bl. n. 313. — Schl. Rev. I. p. 84. — Schl. Mus. Curs. p. 53. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 13. — Midd. Sib. Reise II. p. 290. Fortpflanzung. — Degl. u. G. n. 322. — N. V. D. XIII. p. 230. —

Cab. Journ. 1855. p. 297. —

388. Charadrius pluvialis. L.

Island. Skandinavien. Lappland. Oldenburg: von Negelein. Bei Münster: Borggreve. — [Ganz Europa. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 904. — Gould. t. 294. — N. V. D. t. 173. f. 1—2. — Rchb. f. 687—89. —

2) Eier: Thien. t. 59. f. 1. a—f. — Bäd. t. 6. f. 4. —

L. S. XII. p. 254. n. 6. — n. 7. — Briss. Orn. V. p. 43. — Willugb. Orn. p. 229. — M. u. W. I. p. 318. — Br. Lehrb. p. 485. — Schinz. p. 300.

n. 1. — N. V. D. VII. p. 138. — K. u. Bl. n. 314. — Schl. Rev. I. p. 81. — Hartl. W. Afr. n. 616. — Degl. u. G. n. 320. — Br. Thierl. IV. p. 586.

389. Var. a. Charadrius virginianus. Borkh.

Nord-Amerika. — [Nach Gätke 1857 auf Helgoland vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 300. — Wils. Am. Orn. t. 59. f. 5.
2) Eier:
Bp. Syn. p. 297. — Wagl. Syst. Av. Charadr. n. 42. — N. V. D. XIII. p. 224. n. 2. —

390. Var. b. Charadrius fulvus. Gm.

Asien. Afrika. — [Nach Jardine auf Malta und nach Gätke auf Helgoland (Juni 1857) beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Schl. Faun. Jap. t. 62. —
2) Eier:
Pall. Zoogr. II. p. 141. n. 262. — Rüpp. S. Ueb. n. 401. — Degl. u. G. n. 321. — N. V. D. XIII. p. 225.

391. Charadrius morinellus. L.

Lappland. Sibirien (Byrrangá-Gebirge): von Middendorff. Im Riesengebirge 1865: A. von Homeyer. Einmal bei Mariahof: von Tschusi. — [Ganz Europa. Mittel-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 822. — Gould. t. 295. — N. V. D. t. 174. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 59. f. 2. ab. (?) — Bäd. t. 6. f. 5. —
L. S. XII. p. 254. n. 5. — Gessn. Av. p. 615. — Pall. It. II. app. p. 715. n. 32. — Briss. Orn. V. p. 54. — M. u. W. II. p. 320. — Br. Lehrb. p. 487. — Schinz. p. 300. n. 2. — N. V. D. VII. p. 163. — K. u. Bl. n. 315. — Schl. Rev. I. p. 82. — Degl. u. G. n. 323. — Br. Thierl. IV. p. 589. — Cab. Journ. 1860. p. 159. —

392. Charadrius asiaticus. Pall.

Kaspisches Meer. Tartarei: Pallas. — [Cap der guten Hoffnung: Schlegel. Einmal auf Helgoland: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Pall. Zoogr. II. t. 58. — N. V. D. t. 386. f. 1—?. —
2) Eier: Midd. Sib. Reise II. t. 19. f. 4. —
Pall. It. II. app. p. 715. n. 32. — Pall. Zoogr. II. p. 136. n. 258. — K. u. Bl. n. 316. — Schl. Rev. I. p. 82. — N. V. D. XIII. p. 225. — Degl. u. G. n. 324. —

393. Charadrius mongolicus. Pall.

Nord-Asien. — [Soll in Russland vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 299. — Rchb. f. 2840—41. — Midd. Sib. Reise II. t. 19. f. 2—3. —
2) Eier:

Temm. Man. IV. p. 355. — Schinz. p. 437. — K. u. Bl. n. 317. — Schl. Rev. I. p. 82. — Midd. Sib. Reise II. p. 211. — Degl. u. G. n. 328. —

394. Aegialites cantianus. Boie.

Schweden. Insel Hiddensee. Schleswig. Canaren: Bolle. Balearen: A. v. Homeyer. — [An allen Europäischen Küsten. Im Binnenlande nur als Irrling.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 298. — N. V. D. t. 176. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 59. f. 6. a—e. — Bäd. t. 22. f. 5.

Lath. Ind. Orn. Suppl. II. p. 66. — Hasselq. Reise p. 213. n. 30. — M. u. W. II. p. 323. — Bechst. Nat. D. IV. p. 430. — Br. Lehrb. p. 492. — Schinz. p. 302. n. 1. — N. V. D. VII. p. 210. — K. u. Bl. n. 318. — Schl. Rev. I. p. 82. — Degl. u. G. n. 327. —

395. Aegialites hiaticula. Boie.

Ganz Nord-Europa und Sibirien. Holstein. Mecklenburg. Pommern. Süd-Spanien: Vidal. Balearen: A. v. Homeyer. — [Ganz Europa. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 920. — Gould. t. 296. — N. V. D. t. 175. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 59. f. 4. a—e. — Bäd. t. 22. f. 7.

L. S. XII. p. 253. n. 1. — M. u. W. II. p. 322. — Br. Lehrb. p. 489. — Schinz. p. 301. — N. V. D. VII. p 191. — K. u. Bl. n. 320. — Schl. Rev. I. p. 83. — Rüpp. S. Ueb. n. 410. — Degl. u. G. n. 325. —

396. Aegialites semipalmatus. Bp.

Nord-Amerika (Labrador). — [Wohl nur irrthümlich als Europäisch bezeichnet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 230. — Wils. Am. Orn. t. 59. f. 3.
2) Eier: Thien. t. 59. f. 5. a b. —

Wils. Am. Orn. VII. p. 65. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 5. — Cab. Journ. 1856. p. 425. —

397. Aegialites minor. Boie.

Spanien: A. Brehm. Balearen: A. von Homeyer. Frankreich: Degland. Deutschland. Lappland: A. von Nordmann. Daurien: Dybowski. Süd-Russland: Göbel. — [Ganz Europa. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 921. — N. V. D. t. 177. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 59. f. 9. a b c. — Bäd. t. 22. f. 6. —

M. u. W. II. p. 324. — Bosecke V. Curl. p. 66. n. 134. — Bechst. N. D. IV. p. 422. — Gm. L. S. p. 692. n. 29. — Lath. Ind. Orn. II. p. 750. n. 31. — Temm. Man. II. p. 542. — Br. Lehrb. p. 491. — Schinz. p. 301. n. 2. — N. V. D. VII. p. 225. — K. u. Bl. n. 319. — Schl. Rev. I. p. 83. — Br. Thierl. IV. p. 591. — Degl. u. G. n. 326. —

398. Strepsilas interpres. Ill.

Island. Schweden. Norwegen. Finnland: A. von Nordmann. Dänemark. Pommern. Sibirien: von Middendorff. Provence: von Müller. Wahrscheinlich auf den Canaren: Bolle, und auf den Balearen: A. von Homeyer. — [Ganz Europa. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 856.—857. — Gould. t. 318. — N. V. D. t. 180. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 146. f. 1. — Rchb. f. 659—60. —

2) Eier: Thien. t. 61. f. 1. a—d. — Bäd. t. 5. f. 2. —

L. S. XII. p. 248. n. 4. — p. 249. n. 6. — Ill. Prodr. p. 263. — Temm. Man. II. p. 553. — Briss. Orn. V. p. 137. n. 2. — M. u. W. II. p. 382. — Br. Lehrb. p. 516. — Schinz. p. 305. — N. V. D. VII. p. 303. — K. u. Bl. n. 321. — Schl. Rev. I. p. 85. — Hartl. W. Afr. n. 621. — Degl. u. G. n. 334. — Br. Thierl. IV. p. 600. —

Cab. Journ. 1854. p. 49. —

399. Haematopus ostralegus. L.

Ganz Nord-Europa. Holstein. Mecklenburg. Pommern. — [An allen Küsten Europas. Im Binnenlande ziemlich selten.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 229. — Gould. t. 300. — N. V. D. t. 181. f. 1—3. — Rchb. f. 653—55. —

2) Eier: Thien. t. 57. f. 6. a—f. — Bäd. t. 5. f. 1. —

L. S. XII. p. 257. n. 1. — Pall. Zoogr. II. p. 129. n. 253. — M. u. W. II. p. 313. — Br. Lehrb. p. 501. — Schinz. p. 299. n. 2. — N. V. D. VII. p. 325. — K. u. Bl. n. 322. — Schl. Rev. I. p. 85. — Rüpp. S. Ueb. n. 417. — Hartl. W. Afr. n. 622. — Degl. u. G. n. 333. — Br. Thierl. IV. p. 602.

400. Phalaropus cinereus. Briss.

Island. Grönland. Loffoden: Barth. Lappland. Sibirien: von Middendorff. — [Fast ganz Europa. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 766. — Gould. t. 336. — N. V. D. t. 205. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 63. f. 4. a—m. — Bäd. t. 37. f. 2. —

L. S. XII. p. 249. n. 8. — n. 9. — Briss. Orn. VI. p. 15. n. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 775. n. 1. — p. 776. n. 4. — Pall. Zoogr. II. p. 203. n. 212. n. 213. — Cuv. Règne an. I. p. 532. — M. u. W. II. p. 417. — Br. Lehrb. p. 665. — Schinz. p. 344. — N. V. D. VIII. p. 240. — K. u. Bl. n. 335. — Schl. Rev. I. p. 94. — Schl. Mus. Scolop. p. 58. n. 2. — Degl. u. G. n. 370. — Br. Thierl. IV. p. 631. —

Cab. Journ. 1853. p. 310.

401. Phalaropus rufescens. Briss.

Grönland. Spitzbergen. Sibirien: von Middendorff. — [Nord-Europa. Nord-Amerika. In Mittel- und Süd-Europa sehr selten.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 337. — N. V. D. t. 206. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 63. f. 3. a b c. — Bäd. t. 37. f. 3. —

L. S. XII. p. 249. n. 10. — Briss. Orn. VI. p. 20. n. 4. — Bechst. Nat. D. IV. p. 381. — Temm. Man. II. p. 712. — M. u. W. II. p. 419. — Br. Lehrb. p. 663. — Schinz. p. 345. — N. V. D. VIII. p. 255. — K. u. Bl. n. 336. — Schl. Rev. I. p. 94. — Schl. Mus. Scolop. p. 58. n. 1. — Degl. u. G. n. 369. — Br. Thierl. IV. p. 630. —

Cab. Journ. 1853. p. 310. —

402. Himantopus rufipes. Bechst.

Ungarn. Süd Russland. Mittel-Asien. Egypten: A. Brehm. — [Ganz Süd-Europa. Seltener in Mittel-Europa beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 78. — Gould. t. 289. — N. V. D. t. 203. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 63. f. 5. a b c. Falsch. — t. 99. f. 21. — Bäd. t. 37. f. 5.

L. S. XII. p. 255. n. 11. — Bechst. Nat. D. IV. p. 446. — M. u. W. II. p. 315. — Br. Lehrb. p. 504. — p. 506. — p. 987. — Schinz. p. 299. n. 1. — N. V. D. VIII. p. 191. — K. u. Bl. n. 324. — Schl. Rev. I. p. 96. — Hartl. W. Afr. n. 672. — Degl. u. G. n. 372. — Br. Thierl. IV. p. 642. —

403. Recurvirostra avocetta. L.

Schleswig. Provence: von Müller. — [Küsten ganz Europas; aber im Süden selten. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 368. — N. V. D. t. 204. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 66. f. 2. a—h. — Bäd. t. 5. f. 3. —

L. S. XII. p. 256. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 786. n. 1. — Temm. Man. II. p. 590. — Bechst. Nat. D. IV. p. 450. — M. u. W. II. p. 415. — Br. Lehrb. p. 656. — Schinz. p. 318. — N. V. D. VIII. p. 213. — K. u. Bl. n. 323. — Schl. Rev. I. p. 96. — Rüpp. S. Ueb. n. 461. — Hartl. W. Afr. n. 670. — Degl. u. G. n. 371. — Br. Thierl. IV. p. 645. —

404. Calidris arenaria. Temm.

Lappland. Nord-Sibirien: von Middendorff. - [Ganz Europa. Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 59. f. 4. — t. 63. f. 3. — N. V. D. t. 182. f. 1—3. — Rchb. f. 605—7. — Gould. t. 335. —

2) Eier: Thien. t. 62. f. 2. a b c. — Bäd. t. 71. f. 5. —

Gm. L. S. p. 688. n. 21. — p. 680. n. 16. — Wils. Am. Orn. VII. p. 68. — p. 129. — M. u. W. II. p. 395. — Br. Lehrb. p. 579. — Schinz. p. 326. — N. V. D. VII. p. 372. — K. u. Bl. n. 344. — Schl. Rev. I. p. 88. — Schl. Mus. Scolop. p. 29. — Hartl. W. Afr. n. 674. — Degl. u. G. n. 348. —

405. Eurinorhynchus griseus. Nils.

Asien. — [Wird irrthümlich nach Exemplaren in Sammlungen als Europäisch aufgeführt.]

Abbild. 1) Vogel: Gray Gen. B. t. 156. — II. t. 156. f. 6. — Rchb. f. 653—54. —

2) Eier:

L. S. XII. p. 231. n. 3. — Nils. Orn. Suec. II. p. 29. — Temm. Man. I. p. 54. — II. p. 594. — Cuv. Règne an. I. p. 128. — Bp. List. B. p. 49. n. 344. — K. u. Bl. n. 351. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 97. —
Cab. Journ. 1859. p. 325. —

406. Limicola pygmaea. Koch.

Lappland. — [Ganz Europa; aber nicht häufig. Asien. Afrika. Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 331. — N. V. D. t. 207. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 62. f. 4. a b c. — Bäd. t. 53. f. 5. — N. 1858. t. 1. f. 3. —

Gm. L. S. p. 655. n. 20. — Temm. Man. II. p. 616. — Koch. Baier. Zool. I. p. 316. n. 197. — Lath. Ind. Orn. p. 713. n. 11. — Bechst. Nat. D. IV. 152. n. 6. — M. u. W. II. p. 359. — Br. Lehrb. p. 565. — Schinz. p. 323. — N. V. D. VIII. p. 271. — K. u. Bl. n. 352. — Schl. Rev. I. p. 90. — Schl. Mus. Scolop. p. 49. — Degl. u. G. n. 356. — Br. Thierl. IV. p. 620.

407. Tringa alpina. L.

Ganz Nord-Europa. Sibirien: von Middendorff. Oldenburg. Holstein. Mecklenburg. Pommern. Im Münsterlande: Borggreve. — [Ganz Europa. Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 329. — N. V. D. t. 186. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 62. f. 3. a—m. — Bäd. t. 72. f. 9. —

L. S. XII. p. 249. n. 11. — p. 251. n. 18. — Briss. Orn. V. p. 216. n. 11. — Bechst. Nat. D. IV. p. 141. — M. u. W. II. p. 397. — Br. Lehrb. p. 568. — Schinz. p. 321. — N. V. D. VII. p. 426. — K. u. Bl. n. 347. — Schl. Rev. I. p. 89. — Rüpp. S. Ueb. n. 465. — Degl. u. G. n. 351. —

408. Tringa Schinzi. Br.

Lappland: Schrader. Mecklenburg; häufig. Sibirien (Taimyrfluss und an der Boganida): von Middendorff. — [Ganz Europa. Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 329. — N. V. D. t. 187. f. 1—3. —
2) Eier: Bäd. t. 71. f. 10. —

Br. Beitr. III. p. 355. — Br. Lehrb. p. 571. — Schinz. p. 322. — p. 439. n. 3. — K. u. Bl. n. 347. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 89. — II. p. 99. — N. V. D. VII. p. 453. — XIII. p. 235. — Degl. u. G. n. 351. A.
N. 1856. p. 425. —

409. Tringa maritima. Temm.

Grönland. Island. Spitzbergen. Nördliches Lappland: A. von Nordmann. Nord-Amerika (Labrador). — [Schweden. Schottland. Selten in Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 344. — N. V. D. t. 188. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 62. f. 1. a—e. — Bäd. t. 71. f. 7. —
Gm. L. S. p. 678. n. 36. — Brünn. Orn. bor. n. 182. — Temm. Man. II.

p. 619. — Br. Lehrb. p. 573. — Schinz. p. 324. n. 1. — N. V. D. VII. p. 467. K. u. Bl. n. 345. — Schl. Rev. I. p. 88. — Schl. Mus. Scolop. p. 30. — Degl. u. G. n. 349. —

410. Tringa canutus. L.

Brutorte sind mir nicht bekannt. Wahrscheinlich im höchsten Norden. — [Ganz Europa. West-Afrika: Hartlaub.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 365—366. — Wils. Am. Orn. t. 57. f. 2—5. — Gould. t. 324. — N. V. D. t. 183. t. 1—3. — Rchb. f. 611—12. —

2) Eier: Thien. t. 61. f. 3. a—d. — Bäd. t. 71. f. 6. —

L. S. XII. p. 251. n. 15. — Brünn. Orn. bor. n. 179. — Gm. L. S. p. 682. n. 24. — Pall. Zoogr. II. p. 197. n. 307. — Briss. Orn. V. p. 229. n. 15. — p. 2 3. n. 16. — Wils. Am. Orn. VII. p. 4[1]. — M. u. W. II. p. 395. — Br. Lehrb. p. 579. — N. V. D. VII. p. 372. — Schinz. p. 326. — K. u. Bl. n. 344. — Schl. Rev. I. p. 88. — Schl. Mus. Scolop. p. 29. — Hartl. W. Afr. n. 674. — Degl. u. G. n. 348. —

411. Tringa subarquata. Temm.

Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Ganz Europa. Auf Hiddensee öfter im Sommerkleide.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 851. — Temm. pl. col. 510. — Gould. t. 328. — N. V. D. t. 185. f. 1—3. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 658. n. 25. — Cuv. Règne an. I. p. 527. — Temm. Man. II. p. 609. — Bechst. Nat. D. IV. p. 135. — Pall. Zoogr. II. p. 188. n. 298. — M. u. W. II. p. 356. — Br. Lehrb. p. 563. — Schinz. p. 320. — N. V. D. VII. p. 408. — K. u. Bl. n. 346. — Schl. Rev. I. p. 88. — Schl. Mus. Scolop. p. 31. — Rüpp. S. Ueb. n. 467. — Hartl. W. Afr. n. 675. — Degl. u. G. n. 350. —

412. Tringa pectoralis. Bp.

Nord-Amerika. — [Soll sich nach England verflogen haben: Keyserling und Blasius.]

Abbild. 1) Vogel: Audub B. Am. t. 294. — Gould. t. 327. — Rchb. f. 2800—2. —

2) Eier:

Bp. Am. Orn. IV. p. 43. — K. u. Bl. n. 348. — Schl. Rev. I. p. 89. — Schl. Mus. Scolop. p. 39. — Degl. u. G. n. 352. —

Cab. Journ. 1854. p. 430. — 1856. p. 421. —

413. Tringa melanotus. Vieill.

Nord-Amerika. — [Soll sich nach England und Frankreich verirrt haben.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 278. — Gould. t. 330. —

2) Eier:

Temm. Man. II. p. 401. — Schinz. p. 439. n. 3. — Schl. Rev. I. p. 89. — Schl. Mus. Scolop. p. 42. — Degl. u. G. n. 353. —
Cab. Journ. 1856. p. 421. —

414. Tringa minuta. Leisl.

Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Ganz Europa. Auf Rhodus im Sommerkleide. Klein-Asien im Uebergangskleide. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 332. — N. V. D. t. 184. f. 1—3. — Rchb. f. 615—17. —
2) Eier: Thien. t. 63. f. 1. ab. — Bäd. t. 71. f. 11. — N. 1858. t. 2. f. 4.

Pall. Zoogr. II. p. 201. — p. 310. — Leisl. Nachtr. zu Bechst. I. p. 74. n. 10. — M. u. W. II. p. 391. — Br. Lehrb. p. 577. — Schinz. p. 327. n. 2. — N. V. D. VII. p. 391. — XIII. p. 333. — K. u. Bl. n. 351. — Schl. Rev. I. p. 90. — Schl. Mus. Scolop. p. 43. — Rüpp. S. Ueb. n. 464. — Hartl. W. Afr. n. 677. — Degl. u. G. n. 354. —

415. Tringa Temmincki. Leisl.

Lappland, gemein. Sibirien (Taimyrfluss und Boganida): von Middendorff. — [Ganz Europa; wenn auch vielerorts nur selten. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 333. — N. V. D. t. 189. f. 1—3. — Rchb. f. 630—32. —
2) Eier: Thien. t. 63. f. 2. abc. — Bäd. t. 71. f. 12. —

Bechst. Nat. D. IV. p. 308. — Leisl. Nachtr. zu Bechst. I. p. 64. n. 9. — Br. Lehrb. p. 576. — Schinz. p. 327. n. 1. — N. V. D. VII. p. 483. — XIII. p. 234. — K. u. Bl. n. 350. — Schl. Rev. I. p. 90. — Schl. Mus. Scolop. p. 47. — Rüpp. S. Ueb. n. 466. — Hartl. W. Afr. n. 676. — Degl. u. G. n. 355. —
Cab. Journ. 1853. p. 308. —

416. Tringa semipalmata. Wils.

Nord-Amerika. — [Soll in Schweden erlegt worden sein.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 405. — Wils. Am. Orn. f. 63. f. 4. — Gray Gen. B. II. t. 156. f. 1. —
2) Eier:
Wils. u. Bp. Nat Hist. III. p. 63. — Schl. Mus. Scolop. p. 55. —
Cab. Journ. 1856. p. 419. —

417. Machetes pugnax. Cuv.

Jütland. Dänemark. Schweden. Norwegen. Lappland. Finnland. Nord- und Ost-Seeküste Deutschlands. Anhalt: Naumann. Oderbruch: Borggreve. Posen: Schwaitzer. Schlesien. Sibirien (Boganida) häufig: von Middendorff. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 300. — t. 305—306. — Gould. t. 328. — N. V. D. t. 190—193. — Rchb. f. 596. — 604. —
2) Eier: Thien. t. 61. f. 2. a—o. — Bäd. t. 37. f. 1. —

L. S. XII. p. 247. n. 1. — Pall. Zoogr. II. p. 190. n. 300. — Briss. Orn. V. p. 240. — Brünn. Orn. bor. p. 54. n. 181. — Lath. Ind. Orn. II. p. 730. n. 14. — n. 16. — Bechst. Nat. D. IV. p. 332. — Cuv. Règne an. I. p. 527. — M. u. W. II. p. 377. — Br. Lehrb. p. 582. — Schinz. p. 328. n. 2. — N. V. D. VII. p. 502. — K. u. Bl. n. 341. — Schl. Rev. I. p. 91. — Schl. Mus. Scolop. p. 51. — Rüpp. S. Ueb. n. 463. — Hartl. W. Afr. n. 673. — Degl. u. G. n. 358. — Br. Thierl. IV. p. 625. —

418. Actitis Bartrami. Naum.

Nord-Amerika. — [Soll am Rhein vorgekommen sein: Naumann.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 59. f. 2. — Gould. t. 313. — N. V. D. t. 196. f. 1—3. —

2) Eier: Bäd. t. 30. f. 1. —

Temm. Man. II. p. 650. — Wils. Am. Orn. VII. p. 63. — Bechst. Lath. Ind. Orn. p. 453. n. 46. — Br. Lehrb. p. 592. — Schinz. p. 332. n. 2. — N. V. D. VIII. p. 43. — K. u. Bl. n. 332. — Schl. Rev. I. p. 92. — Schl. Mus. Scolop. p. 78. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 86. — Degl. u. G. n. 367. —

419. Actitis rufescens. Bp.

Nord-Amerika. — [Im Mai 1847 nach Gätke auf Helgoland beobachtet. Auch in England vorgekommen: Degland und Gerbe.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 26. — Baird. u. Cass. t. 6. — Rchb. t. 2803—5. —

2) Eier:

Vieill. Gal. II. p. 105. — Temm. Man. IV. p. 408. — K. u. Bl. n. 349. — Schl. Rev. I. p. 92. — Schl. Mus. Scolop. p. 79. — N. V. D. XIII. p. 239. — Degl. u. G. n. 357. —

Cab. Journ. 1856. p. 418. —

420. Actitis macularia. Boie.

Nord-Amerika. — [Fast alljährlich an den Venetianischen Küsten: Blasius. (?) Soll auch in England und einmal in Hessen vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 310. — Wils. Am. Orn. t. 59. f. 1. — Gould. t. 317. — N. V. D. t. 105. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 154. f. 1. — Rchb. f. 2811—12. —

2) Eier: Thien. t. 65. f. 4. a—h. — Bäd. t. 30. f. 2. —

L. S. XII. p. 249. n. 7. — Briss. Orn. V. p. 255. n. 20. — Lath. Ind. Orn. II. p. 734. n. 29. — Temm. Man. I. p. 656. — Bechst. Nat. D. IV. p. 342. n. 16. — M. u. W. II. p. 385. — Br. Lehrb. p. 593. — Schinz. p. 334. n. 1. — K. u. Bl. n. 333. — N. V. D. VIII. p. 34. — XIII. p. 237. — Schl. Rev. I. p. 91. — Schl. Mus. Scolop. p. 83. — Degl. u. G. n. 366. —

Cab. Journ. 1856. p. 417. —

421. Actitis hypoleucos. Boie.

Nord-Europa. Nord-Deutschland. Balearen: A. von Homeyer. Süd-Russland (Kiew): Göbel. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 850. — Gould. t. 318. — N. V. D. t. 194. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 65. f. 3. a—e. — Bäd. t. 30. f. 3. —

L. S. XII. p. 250. n. 14. — Lath. Ind. Orn. II. p. 734. n. 28. — Temm. Man. II. p 657. — Bechst. Nat. D. V. p. 148. n. 23. — M. u. W. II. p. 389. — Br. Lehrb. p. 590. — Schinz. p. 334. n. 2. — N. V. D. VIII. p. 7. — K. u. Bl. n. 334. — Schl. Rev. I. p. 91. — Schl. Mus. Scolop. p. 80. — Rüpp. S. Ueb. n. 453. — Hartl. W. Afr. n. 669. — Degl. u. G. n. 365. — Br. Thierl. IV. p. 635. —

422. Totanus glottis. Bechst.

Lappland. Insel Gothland: L. Holz. Sibirien (Stanowoj-Gebirge): von Middendorff. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 876. — Gould. t. 312. — N. V. D. t. 201. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 64. f. 3. — Bäd. t. 71. f. 2. — N. 1858. p. 252. t. 1. f. 1. —

L. S. XII. p. 245. n. 10. — Bechst. Nat. D. IV. p. 249. n. 10. — M. u. W. II. p. 371. — Koch. Baier. Zool. I. p. 305. n. 190. — Br. Lehrb. p. 603. — Schinz. p. 335. — N. V. D. VIII. p. 145. — K. u. Bl. n. 325. — Schl. Rev. I. p. 92. — Schl. Mus. Scolop. p. 61. — Rüpp. S. Ueb. n. 454. — Hartl. W. Afr. n. 668. — Degl. u. G. n. 359. — Br. Thierl. IV. p. 637.

423. Totanus stagnatilis. Temm.

Ungarn. Süd-Russland. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Roux. Orn. Prov. t. 295. — Gould. t. 314. — N. V. D. t. 202. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 64. f. 4. a—d. — Bäd. t. 71. f. 4. —

L. S. XII. p. 245. n. 12. — Temm. Man. II. p. 647. — Bechst. Nat. D. p. 261. — M. u. W. II. p. 376. — Br. Lehrb. p. 599. — Schinz. p. 332. n. 1. — N. V. D. VIII. p. 171. — K. u. Bl. n. 326. — Schl. Rev. I. p 93. — Schl. Mus. Scolop. p. 68. — Rüpp. S. Ueb. n. 456. — Hartl. W. Afr. n. 664. — Degl. u. G. n. 362. —

424. Totanus calidris. Bechst.

Nord- und Mittel-Europa. Balearen: A. von Homeyer. Griechenland, einzeln: Krüper. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 827. — t. 845. — Gould. t. 310. — N. V. D. t. 199. f. 1 3. —

2) Eier: Thien. t. 64. f. 5. a—m. — Bäd. t. 37. f. 4. —

L. S. XII. p. 245. n. 11. — Gm. L. S. p. 671. n. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 728. n. 9. — p. 722. n. 25. — Temm. Man. II. p. 643. — Bechst. Nat. D. p. IV. p. 216. — M. u. W. II. p. 368. — Br. Lehrb. p. 601. — Schinz. p.

331. n. 2. — N. V. D. VIII. p. 95. — K. u. Bl. n. 328. — Schl. Rev. I. p. 93. — Schl. Mus. Scolop. p. 65. — Rüpp. S. Ueb. n. 459. — Hartl. W. Afr. n. 665. — Degl. u. G. n. 361. —

425. Totanus fuscus. Leisl.

Lappland. Sibirien (Boganida): von Middendorff. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 875. — Gould. t. 309. — Gray Gen. B. II. t. 154. f. 2. — N. V. D. t. 200. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 64. f. 2. a b. Unkenntlich. — Bäd. t. 71. f. 3. — N. 1858. t. 1. f. 2. —

Gm. L. S. p. 659. n. 29. — p. 673. n. 26. — Lath Ind. Orn. II. p. 721. n. 24. — Temm. Man. II. p. 639. — Briss. Orn. V. p. 276. n. 4. — Bechst. Nat. D. IV. p. 203. — p. 212. — p. 227. — Leisl. Nachtr. zu Bechst. p. 47. — M. u. W. II. p. 366. — Br. Lehrb. p. 597. — Schinz. p. 331. n. 1. — N. V. D. VIII. p. 123. — K. u. Bl. n. 327. — Schl. Rev. I. p. 92. — Schl. Mus. Scolop. p. 64. — Degl. u. G. n. 360. —

426. Totanus flavipes. Vieill.

Nord-Amerika. — [Soll in England vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 344. — Wils Am. Orn. t. 58. f. 4.

2) Eier:

Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 83. — Schl. Mus. Scolop. p. 69. — Cab. Journ. 1856. —

427. Totanus glareola. Temm.

Lappland. Skandinavien: Wallengreen. Sibirien: von Middendorff. Pommern. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Roux. Orn. Prov. t. 297. — Gould. t. 315. f. 2. — N. V. D. t. 198. f. 1—3. — Rchb. f. 587—88. —

2) Eier: Thien. t. 65. f. 2. a—e. Unkenntlich. — Bäd. t. 30. f. 4. —

L. S. XII. p. 251. n. 17. — Pall. Zoogr. II. p. 195. n. 305. — Temm. Man. II. p. 654. — Lath. Ind. Orn. II. p. 730. n. 13. — p. 731. n. 15. — Bechst. Nat. D. IV. p. 291. — M. u. W. II. p. 387. — Br. Lehrb. p. 596. — Schinz. p. 333. n. 2. — N. V. D. VIII. p. 78. — K. u. Bl. n. 329. — Schl. Rev. I. p. 93. — Schl. Mus. Scolop. p. 71. — Rüpp. S. Ueb. n. 457. — Hartl. W. Afr. n. 666. — Degl. u. G. n. 363. —

428. Totanus ochropus. Temm.

Schweden. Hannover. Oldenburg: von Negelein. Mark Brandenburg. Schlesien: A. von Homeyer. Pommern. Süd-Russland (Kiew): Göbel. — [Ganz Europa, aber mehr im Osten als im Westen. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 843. — Gould. t. 315. f. 1. — N. V. D. t. 197. f. 1—3. — Rchb. f. 585—86. —

2) Eier: Thien. t. 65. f. 1. a—e. — Bäd. t. 30. f. 5. —

L. S. XII. p. 250. n. 13. — Temm. Man. II. p. 651. — Lath. Ind. Orn. II. p. 729. n. 12. — Briss. Orn. V. p. 177. n. 16. — Bechst. Nat. D. IV. p. 283. — M. u. W. II. p. 386. — Br. Lehrb. p. 594. — Schinz. p. 594. — N. V. D. VIII. p. 59. — K. u. Bl. n. 330. — Schl. Rev. I. p. 93. — Schl. Mus. Scolop. p. 70. — Rüpp. S. Ueb. n. 460. — Hartl. W. Afr. n. 667. — Degl. u. G. n. 364. —

429. Catoptrophorus semipalmatus. Bp.

Nord-Amerika. — [Hat sich nach den Küsten Skandinaviens verflogen: Keyserling und Blasius.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 274. — Wils. Am. Orn. t. 56. f. 3. — Gould. t. 311. —

2) Eier: Thien. t. 64. f. 1. — Bäd. t. 30. f. 6. —

Gm. L. S. p. 659. n. 33. — Lath. Ind. Orn. II. p. 724. — Br. Lehrb. p. 606. — Schinz. p. 330. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 80. — K. u. Bl. n. 331. — Schl. Rev. I. p. 94. — Schl. Mus. Scolop. p. 76. — Degl. u. G. n. 368. —

Cab. Journ. 1856. n. 351. —

430. Telmatias major. Boie.

Jütland. Schleswig. Schweden. Gothland: L. Holz. Finnland: A. von Nordmann. Einzeln in Nord-Deutschland (Mecklenburg): von Preen. Oldenburg: von Negelein. Braunschweig: Blasius. — [Ganz Europa, im Westen seltener.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 320. — N. V. D. t. 208. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 60. f. 5. a—d. — Bäd. t. 53. f. 2. —

Gm. L. S. p. 661. n. 36. — Lath. Ind. Orn. II. p. 714. n. 4. — — Temm. Man. II. p. 675. — Bechst. Nat. D. IV. p. 180. — M. u. W. II. p. 362. — Br. Lehrb. p. 619. — Schinz. p. 340. n. 1. — N. V. D. VIII. p. 291. — K. u. Bl. n. 356. — Schl. Rev. I. p. 86. — II. p. 95. — Schl. Mus. Scolop. p. 7. — Rüpp. S. Ueb. n. 471. — Degl. u. G. n. 344. —

431. Telmatias gallinago. Boie.

Schweden. Norwegen. Schleswig. Finnland: A. von Nordmann. Deutschland. Süd-Russland (Kiew): Göbel. Sibirien (Boganída, häufig): von Middendorff. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 883. — Gould. t. 321. f. 2. — Rchb. f. 358—59. — N. V. D. t. 209. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 60. f. 2. a—k. — Bäd. t. 53. f. 3. —

L. S. XII. p. 244. n. 7. — Lath. Ind. Orn. II. p. 715. n. 6. — Temm. Man. II. p. 676. — Bechst. Nat. D. IV. p. 185. — M. u. W. II. p. 363. — Br. Lehrb. p. 625. — p. 621. = T. Brehmi. — Schinz. p. 341. n. 1. — p. 440. n. 2. = T. peregrina. — N. V. D. VIII. p. 310. — K. u. Bl. n. 355. — Anmerk. = T. Brehmi. — Schl. Mus. Scolop. p. 4. (part.) — Rüpp. S. Ueb. n. 470. — Hartl. W. Afr. n. 679. — E. v. Hom. Pög. Vom. p. 59. = F. Brehmi. — Degl. u. G. n. 345. part. —

432. Var.(?) Telmatias Sabinei. Leach.

Nord-Amerika(?) — [Soll sich nach England verflogen haben.]

Abbild. 1) Vogel: Jard. u. Selby. Zool. Ill. t. 27. — Gould. t. 321. f. 1.
2) Eier:
Vig. L. Trans. XIV. p. 556. — K. u. Bl. n. 354. — Schl. Rev. I. p. 86. — II. p. 96. — Schl. Mus. Scolop. p. 4. (part.) — Degl. u. G. n. 345. (part.)

433. Telmatias gallinula. L.

Lappland. Finnland: A. von Nordmann. Sibirien (Boganída): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 884. — Gould. t. 322. — N. V. D. t. 210. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 60. f. 1. abc. — Bäd. t. 53. f. 4. —
L. S. XII. p. 244. n. 8. — Lath. Ind. Orn. II. p. 715. n. 8. — Temm. Man. II. p. 678. — Bechst. Nat. D. IV. p. 196. — M. u. W. II. p. 364. — Br. Lehrb. p. 626. — Schinz. p. 341. n. 2. — N. V. D. VIII. p. 344. — K. u. Bl. n. 353. — Schl. Rev. I. p. 86. — Schl. Mus. Scolop. p. 14. — Degl. u. G. n. 346. — Br. Thierl. IV. p. 617. —

434. Macrorhamphus griseus. Leach.

Nord-Amerika. — [Soll sich nach England verflogen haben.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am Orn. t. 47. f. 1. — Gray. Gen. B. II. t. 157. f. 1. — Gould. t. 323. — Rchb. f. 2793.—95. —
2) Eier:
Gm. L. S. p. 658. n. 27. — n. 28. — Br. Lehrb. p. 628. — Schinz. p. 432. n. 3. — K. u. Bl. n. 340. — Schl. Rev. I. p. 86. — Schl. Mus. Scolop. p. 26. n. 1. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 93. — Degl. u. G. n. 342. — Cab. Journ. 1856. p. 350. — 1861. p. 214. —

435. Scolopax rusticola. L.

Schweden. Lappland, Finnland: A. von Nordmann. Oldenburg: von Negelein. Westphalen. Pommern. Schlesien. Ungarn. — [Ganz Europa. Klein-Asien. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 885. — Gould. t. 319. — N. V. D. t. 211. f. 1—3. —
2) Eier: Thien t. 60. f. 6. a—d. — Bäd. t. 53. f. 1. —
L. S. XII. p. 243. n. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 713. — Temm. Man. II. p. 673. — Bechst. Nat. D. IV. p. 158. — M. u. W. I. p. 361. — Br. Lehrb. p. 617. — Schinz. p. 339. — N. V. D. VIII. p. 361. — K. u. Bl. n. 357. — Schl. Rev. I. p. 85. — Schl. Mus. Scolop. p. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 473. — Degl. u. G. n. 343. — Br. Thierl. IV. p. 608. —

436. Xenus cinereus. Kaup.

Nördliches Russland (Archangel). Sibirien. — [Hat sich nach Deutschland (Braunschweig) verflogen: Blasius.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 307. — N. V. D. t. 386. f. 3. — Rchb. f. 2446—48. —

2) Eier: Bäd. t. 14. f. 4. —

Güld. Nov. Com. Petr. XIX. p. 473. n. 6. — Pall. Zoogr. II. p. 181. n. 293. — Lath. Ind. Orn. II. p. 724. n. 36. — Temm. Man. III. p. 426. — Schinz. p. 338. n. 1. — p. 440. — K. u. Bl. n. 337. — Schl. Rev. I. p. 87. — Schl. Mus. Scolop. p. 74. — N. V. D. XIII. p. 248. — Degl. u. G. n. 341.

437. Limosa rufa. Briss.

Lappland (Kyrrö). Sibirien (Taimyrfluss, häufig): von Middendorff. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 900. — Gould. t. 306. — N. V. D. t. 215. f. 1—3. — t. 214. f. 1—3 = L. Meyeri Leisl. —

2) Eier: Midd. Sib. Reise II. t. 19. (?) — Thien. t. 99. f. 22. —

L. S. XII. p. 246. n. 15. — Briss. Orn. V. p. 281. n. 5. — Lath Ind. Orn. II. p. 719. n. 17. — Temm. Man. II. p. 668. — Bechst. Nat. D. IV. p. 258. — M. u. W. II. p. 369. — Leisl. Nachtr. zu Bechst. II. p. 172. = L. Meyeri. — Schinz. p. 337. — p. 338. n. 2 = L. Meyeri. — N. V. D. VIII. p. 447. — p. 428. = L. Meyeri. — K. u. Bl. n. 339. — Anmerk. — L. Meyeri. — Schl. Rev. I. p. 87. — II. p. 97. = L. Meyeri. — Hartl. W. Afr. n. 663. — Schl. Mus. Scolop. p. 23. n. 2. — N. V. D. XIII. p. 246 = L. Meyeri. — Midd. Sib. Reise II. p. 217. — Degl. u. G. n. 340. — Br. Thierl. IV. p. 639.

438. Limosa melanura. Leisl.

Bremen. Marsch. Dänemark. Ober-Schlesien, einzeln: Borggreve. Süd-Russland. Sibirien (Schantar-Insel): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 894. — t. 916. — Gould. t. 305. — N. V. D. t. 212—213. —

2) Eier: Thien. t. 66. f. 1. a—h. — Bäd. t. 14. f. 3. —

L. S. XII. p. 245. n. 13. — p. 246. n. 16. — Temm. Man. II. p. 664. — Leisl. Nachtr. zu Bechst. II. p. 153. — M. u. W. II. p. 369. — Br. Lehrb. p. 609. — Schinz. p. 336. — N. V. D. VII. p. 406. — K. u. Bl. n. 338. — Schl. Rev. I. p. 87. — Schl. Mus. Scolop. p. 19. — Rüpp. S. Ueb. n. 455. — Degl. u. G. n. 339. —

439. Numenius phaeopus. Lath.

Island. Skandinavien. Lappland. Faröer. Dänemark. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 842. — Gould. t. 306. — N. V. D. t. 217. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 67. f. 2. a—h. — Bäd. t. 14. f. 2. — t. 71. f. 1 = N. melanorhynchos. Bp. —

L. S. XII. p. 243. n. 4. — Briss. Orn. V. p. 317. n. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 711. n. 6. — Temm. Man II. p. 604. — Bechst. Nat. D. IV. p. 129. — M. u. W. II. p. 355. — Br. Lehrb. p. 522. (part.) — Schinz. p. 319. n. 1. (part.) — N. V. D. VIII.

p. 506. — K. u. Bl. n. 358. — Schl. Rev. I. p. 95. — Schl. Mus. Scolop. p. 93. — Rüpp. S. Ueb. n. 453. — Hartl. W. Afr. n. 661. — Degl. u. G. n. 337.

440. Numenius borealis. Wils.

Nord-Amerika. — [Auf Island vorgekommen: Kjärbölling.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 356. — Wils. Am. Orn. t. 56. f. 1. — Rchb. f. 2818—19. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 654. n. 17. — Lath Ind. Orn. II. p. 712. n. 17. — Br. Lehrb. p. 522. (part.) — Schinz. p. 319. n. 1. (part.) — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 61. — Degl. u. G. n. 338. —

441. Numenius tenuirostris. Vieill.

Wahrscheinlich in Süd-Portugal (im Mai den Vogel beobachtet). Ebenso Süd-Spanien und auf den Balearen (der Vogel während des Sommers): A. von Homeyer. Kaukasus, Ural: Blasius. — [Algerien: Taczanowski.]

Abbild. 1) Vogel: Bp. Faun. Ital. t. 42. — N. V. D. t. 218. —

2) Eier:

Vieill. Nouv. Dict. VIII. p. 302. — Schinz. p. 319. n. 2. — K. u. Bl. n. 359. — Schl. Rev. I. p. 95. — Schl. Mus. Scolop. p. 92. — N. V. D. VIII. p. 527. — Degl. u. G. n. 336. —

Cab. Journ. 1862. p. 427. —

442. Numenius arquata. Lath.

Norwegen. Schweden. Dänemark. Mecklenburg. Pommern. Mark Brandenburg. Im Münsterlande: Borggreve. In Oldenburg: von Negelein. — [Ganz Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 818. — Gould. t. 302. — N. V. D. t. 216. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 67. f. 1. a—f. — Bäd. t. 14. f. 1. —

L. S. XII. p. 242. n. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 710. n. 1. — Temm. Man. II. p. 603. — Bechst. Nat. D. IV. p. 121. — M. u. W. II. p. 354. — Br. Lehrb. p. 520. — Schinz. p. 318. n. 2. — N. V. D. VIII. p. 478. — XIII. p. 248. — K. u. Bl. n. 360. — Schl. Rev. I. p. 95. — Schl. Mus. Scolop. p. 92. — Rüpp. S. Ueb. n. 452. — Hartl. W. Afr. n. 660. — Degl. u. G. n. 355. — Br. Thierl. IV. p. 649. —

443. Ibis religiosa. Cuv.

Afrika. — [Soll nach Temminck in Griechenland vorgekommen sein. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Sav. Descr. de l'Eg. t. 7. f. 1. — Rchb. f. 539—40. — Br. Thierl. IV. p. 660. —

2) Eier: Bäd. t. 60. f. 1. — Thien. t. 99. f. 24. —

Cuv. Règne an. I. p. 483. — Lath. Ind. Orn. p. 305. n. 12. — Schl. Rev. I. p. 100. — Temm. Man. IV. p. 392. — Bp. Consp. II. Gen. 136. n. 1. — Schl. Mus. Ibid. p. 12. — Degl. u. G. n. 402. — Br. Thierl. IV. p. 659. —

444. Plegadis falcinellus. Kaup.

Ungarn. Süd-Russland. — [Ganz Süd-Europa. Dann und wann auch in Mittel-Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 819. — Gould. t. 311. — N. V. D. t. 219. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 68. f. 4. abc. — Bäd. t. 60. f. 2. —

L. S. XII. p. 241. n. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 707. n. 14. — Briss. Orn. V. p. 326. u. 4. — Temm. Man. II. p. 598. — Br. Lehrb. p. 528. — Schinz. p. 317. n. 1. — N. V. D. VIII. p. 539. — K. u. Bl. n. 376. — Schl. Rev. I. p. 100. — Schl. Mus. Ibid. p. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 151. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 451. — Hartl. W. Afr. n. 655. — Degl. u. G. n. 403. — Br. Thierl. IV. p. 654. —

445. Ardea cinerea. Lath.

In Europa fast überall an geeigneten Localitäten, nur mit Ausschluss des höchsten Nordens. Afrika. Asien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 755. — Gould. t. 273. — N. V. D. t. 220. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 2. — Bäd. t. 60. f. 3. —

L. S. XII. p. 236. n. 11. — Lath. Ind. Orn. II. p. 691. n. 54. — Briss. Orn. V. p. 396. n. 2. — Temm. Man. II. p. 567. — Bechst. Tasch. II. p. 255. — M. u. W. II. p. 332. — Br. Lehrb. p. 546. — Schinz. p. 308. n. 1. — N. V. D. IX. p. 24. — K. u. Bl. n. 363. — Schl. Rev. I. p. 96. — Schl. Mus. Ard. p. 5. — Bp. Consp. II. Gen. 109. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 423. — Degl. u. G. n. 387. — Br. Thierl. IV. p. 697. —

446. Var.(?) Ardea atricollis. Wagl.

Afrika. — [Soll in Süd-Spanien vorgekommen sein: Schlegel. In Süd-Frankreich beobachtet: Degland.]

Abbild. 1) Vogel: O. d. Murs. Icon. t. 30. — Rchb. f. 1022—23. —

2) Eier:

Wagl. Syst. Av. n. 4. — Bp. Consp. II. Gen. 109. n. 4. — Hartl. W. Afr. n. 627. — Schl. Mus. Ard. p. 6. n. 2. — Degl. u. G. n. 388. —

447. Ardea purpurea. L.

Süd-Spanien: Vidal. Balearen: A. von Homeyer. Holland. Ungarn. Süd-Russland. — [Süd- und Mittel-Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 788. — Gould. t. 274. — N. V. D. t. 221. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 5. — Bäd. t. 59. f. 7. —

L. S. XII. p. 236. n. 10. — Lath. Ind. Orn. II. p. 698. n. 74. — n. 75. — Temm. Man. II. p. 570. — Bechst. Nat. D. IV. p. 27. — M. u. W. II. p. 334. — Br. Lehrb. p. 548. — Schinz. p. 309. n. 1. — N. V. D. IX. p. 63. — K. u. Bl. n. 362. — Schl. Rev. I. p. 97. — Schl. Mus. Ard. p. 8. — Bp.

Consp. II. Gen. 109. n. 9. — n. 10. — Rüpp. S. Ueb. n. 424. — Hartl. W. Afr. n. 628. = Degl. u. G. n. 389. —

448. Ardea alba. L.

Donauländer, Süd-Russland. Im Jahre 1863 bei Glogau: A. von Homeyer. — [Ganz Süd-Europa. In Mittel-Europa seltener.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 886. — Gould. t. 276. — N. V. D. t. 222. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 4. — Bäd. t. 60. f. 4. —

L. S. XII. p. 239. n. 24. — Lath. Ind. Orn. II. p. 695. n. 65. — Briss. Orn. V. p. 428. n. 15. — Wils. Am. Orn. VII. p. 106. — Temm. Man. II. p. 572. — Boie. Isis 1822. p. 559. — Bechst. Nat. D. IV. p. 35. — p. 38. — M. u. W. II. p. 335. — Br. Lehrb. p. 550. — Schinz. p. 309. n. 2. — N. V. D. IX. p. 85.* — K. u. Bl. n. 364. — Schl. Rev. I. p. 97. — II. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 111. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 426. — Degl. u. G. n. 390. — Br. Thierl. IV. p. 701. —

Cab. Journ. 1863. p. 440. —

449. Var. Ardea melanorhyncha. Wagl.

Afrika. — [Einzeln und zufällig in Süd-Ost-Europa: Hartlaub.]

Abbild. 1) Vogel: Macgil. Brit. B. IV. f. 38. —

2) Eier:

Wagl. Isis. 1832. — Macgil. Brit. B. IV. p. 460. — Schl. Rev. II. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 111. n. 9. — Hartl. W. Afr. n. 630. — Degl. u. G. n. 390. —

450. Ardea garzetta. L.

Ganz Süd-Europa. Canaren: Bolle. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 277. — N. V. D. t. 223. f. 1—2. — Rchb. f. 1033—35. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 6. — Bäd. t. 59. f. 8. —

L. S. XII. p. 237. n. 13. — Briss. Orn. V. p. 431. n. 16. — Temm. Man. II. p. 574. — Bechst. Nat. D. IV. p. 42—44. — M. u. W. II. p. 332. — Br. Lehrb. p. 546. — Schinz. p. 308. n. 1. — N. V. D IX. p. 24. — K. u. Bl. n. 363. — Schl. Rev. I. p. 96. — Schl. Mus. Ard. p. 5. — Bp. Consp. II. Gen. 109. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 423. — Degl. u. G. n. 387. — Br. Thierl. IV. p. 697. —

451. Var. Ardea orientalis. Gray.

Afrika. — [Soll nach Temminck auf Sicilien vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 2403—4. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 3. — Bäd. t. 60. f. 5. —

Schinz. p. 438. n. 2. — K. u. Bl. n. 365. — Schl. Rev. II. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 112. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 428. — Hartl. W. Afr. n. 629. — Degl. u. G. n. 391. —

52. Ardea Veranyi. Roux.

Süd-Portugal (höchst wahrscheinlich). Nord-Afrika. — [Soll in Griechenland und auf Sicilien vorgekommen sein. Einmal in der Walachei. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Roux. Orn. Prov. II. t. 136. — Audouin Descr. de l'Eg. t. 8. — Rchb. f. 1073. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 10. — Bäd. t. 59. f. 9. —

Hasselq. Itiner. Paläst. p. 248. — Briss. Orn. V. p. 438. — Audouin. Descr. de l'Eg. XXIII. p. 391. — Wagl. Syst. Av. I. n. 12. — Montag. L. Trans. IX. p. 197. — Roux. Orn. Prov. II. p. 316. — Cuv. Règne an. I. p. 512. Anmerk. — Licht. Verzeich. p. 73. n. 796. — Selby Brit. Orn. II. p. 24. — Schinz. p. 311. n. 1. — p. 438. n. 3. — K. u. Bl. n. 367. — Schl. Rev. I. p. 98. — II. p. 102. — Schl. Mus. Ard. p. 31. — Bp. Consp. II. Gen. 114. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 429. — Hartl. W. Afr. n. 636. — Degl. u. G. n. 392. — Br. Thierl. IV. p. 705. —

453. Ardea comata. Pall.

Süd-Frankreich. Ungarn. Türkei. Süd-Russland. Algerien. — [Verfliegt sich selten bis nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 348. — Gould. t. 275. — N. V. D. t. 224. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 9. — Bäd. t. 59. f. 4. —

Pall. It. II. p. 715. n. 32. — Gm. L. S. p. 632. n. 41. — p. 633. n. 46. — p. 634. n. 77. — n. 88. — p. 637. n. 52. — p. 644. n. 74. — Scop. Ann. I. p. 88. n. 121. — Temm. Man. II. p. 581. — Briss. Orn. V. p. 452. — Lath. Ind. Orn. II. p. 681. n. 20. — p. 683. n. 28. — p. 686. n. 36. — n. 38. — p. 687. n. 40. — Bechst. Nat. D. IV. p. 47. — M. u. W. II. p. 341. — Schinz. p. 311. n. 1. — K. u. Bl. n. 368. — Schl. Rev. I. p. 97. — Schl. Mus. Ard. p. 32. n. 1. — Bp. Consp. II. Gen. 115. n. 1. — Degl. u. G. n. 393. —

454. Ardea nycticorax. L.

Balearen: A. von Homeyer. Süd-Frankreich. Italien. Ungarn. Türkei. Süd-Russland. — [Ganz Süd-Europa. Auch in Mittel-Europa nicht gerade selten. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 758. — t. 759. — Gould. t. 279. — N. V. D. t. 225. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 13. a b. — Bäd. t. 59. f. 6. —

L. S. XII. p. 235. n. 9. — Briss. Orn. V. p. 493. — Aldrov. Orn. III. p. 271. — p. 380. — Gm. Nov. Com. Petrop. XV. p. 452. — Gessn. Av. p. 627. — Temm. Man. IV. p. 384. — Penn. Arct. Zool. II. p. 451. n. 356. — M. u. W. II. p. 339. — Br. Lehrb. p. 556. — Schinz. p. 310. n. 2. — Boie Isis. 1822. p. 560 — N. V. D. IX. p. 139. — K. u. Bl. n. 372. (part.) — Schl. Rev. I. p. 98. (part.) — Bp. Consp. II. Gen. 126. n. 4. — Rüpp. S. Ueb. n. 434. — Hartl. W. Afr. n. 643. — Schl. Mus. Ard. p. 56. n. 2. — Br. Thierl. IV. p. 707. — Degl. u. G. n. 398. (part.) —

455 Botaurus stellaris. Steph.

Balearen: A. von Homeyer. Mecklenburg. Oldenburg: von Negelein. Schleswig. Pommern. Ungarn. Süd-Russland. Griechenland (wahrscheinlich): Krüper. — [Ganz Süd- und Mittel-Europa. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 789. — Gould. t. 280. — N. V. D. t. 226. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 69. f. 8. a b c. — Bäd. t. 60. f. 6. —

L. S. XII. p. 239. n. 21. — Lath. Ind. Orn. II. p. 680. n. 18. — Temm. Man. II. p. 580. — Steph. Shaw. Zool. XI. 2. p. 593. — M. u. W. I. p. 338. — Br. Lehrb. p. 554. — Schinz. p. 312. n. 2. — N. V. D. IX. p. 159. — K. u. Bl. n. 370. — Schl. Rev. I. p. 98. — Schl. Mus. Ard. p. 47. — Bp. Consp. II. Gen. 120. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 433. — Degl. u. G. n. 396.

456. Botaurus lentiginosus. Steph.

Nord-Amerika. — [Hat sich nach Irland verflogen: Baird und Cassin.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 337. — Wils. Am. Orn. t. 65. f. 3. — Gray. Gen. B. II. t. 150. f. 6. — Gould. t. 281. —

2) Eier:

Vieill. Nouv. Dict. XIV. p. 440. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 35. — Briss. Orn. V. p. 449. — Richards. Faun. bor. II. p. 374. — Schinz. p. 312. n. 2. — K. u. Bl. n. 371. — Schl. Rev. I. p. 99. — Schl. Mus. Ard. p. 49. — Bp. Consp. II. Gen. 120. n. 3. = Degl. u. G. n. 397. —

457. Ardeola Sturmi. Degl.

Afrika. — [Soll nach einigen Angaben in Europa vorgekommen sein.] —

Abbild. 1) Vogel: Smith. Illust. Zool. S. Afr. t. 91. — Rchb. f. 1028. —

2) Eier:

Wagl. Syst. Av. n. 37. — Sw. Anim. in menag. p. 334. — Gray Gen. B. III. p. 556. — Bp. Consp. II. Gen. 118. n. 1—2. — Degl. u. G. n. 394.

458. Ardeola minuta. Br.

Ganz Deutschland. Ungarn. Galizien. Süd-Russland. — [Süd- und Mittel-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl enl. 323. — Gould. t. 282. — N. V. D. t. 227. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 70. f. 1. a b. — Bäd. t. 59. f. 5. —

L. S. XII. p. 240. n. 26. — Lath. Ind. Orn. II. p. 683. n. 27. — Briss. Orn. V. p. 500. n. 47. — Temm. Man. II. p. 584. — Bechst. Nat. D. IV. p. 71. — p. 78. — M. u. W. II. p. 343. — Br. Lehrb. p. 559. — Schinz. p. 313. — N. V. D. IX. p. 194. — K. u. Bl. n. 369. — Schl. Rev. I. p. 99. — Schl. Mus. Ard. p. 37. — Bp. Consp. II. Gen. 119. n. 3. — Rüpp. S. Ueb. n. 431. — Degl. u. G. n. 395. — Br. Thierl. IV. p. 711. —

459. Ciconia alba. Briss.

Europa, nördlich bis Schleswig und Süd-Schweden. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 866. — Gould. t. 283. — N. V. D. t. 228. f. 1—2. — Zool. Gart. 1864. p. 399. c. t.: Nestvogel. —

2) Eier: Thien. t. 70. f. 5. a b. — Bäd. t. 36. f. 1. —

L. S. XII. p. 235. n. 7. — Briss. Orn. V. p. 365. n. 2. — Temm. Man. II. p. 560. — Bechst. Nat. D. IV. p. 82. — M. u. W. II. p. 345. — Br. Lehrb. p. 535. — Schinz. p. 313. — N. V. D. IX. p. 231. — K. u. Bl. n. 374. — Schl. Rev. I. p. 99. — Bp. Consp. II. Gen. 98. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 440. — Hartl. W. Afr. n. 646. — Degl. u. G. n. 399. — Br. Thierl. IV. p. 675.

460. Ciconia nigra. Gessn.

Oldenburg. Jütland: Kjärbölling. Mark Brandenburg. Anhalt. Schlesien. Pommern. Ungarn. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 399. — Gould. t. 284. — N. V. D. t. 229. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 70. f. 6. a b. — Bäd. t. 36. f. 2. —

L. S. XII. p. 235. n. 8. — Gessn. Av. p. 273. — Lath. Ind. Orn. II. p. 677. n. 11. — Temm. Man. II. p. 561. — Bechst. Nat. D. IV. p. 96. — M. u. W. II. p. 348. — Br. Lehrb. p. 537. — Schinz. p. 314. — N. V. D. XI. p. 279. — K. u. Bl. n. 373. — Schl. Rev. I. p. 99. — Bp. Consp. II. Gen. 99. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 441. — Hartl. W. Afr. n. 647. — Degl. u. G. n. 400.

461. Tantalus ibis. L.

Mittel-Afrika: A. Brehm. — [Süd-Russland: Pallas.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 389. — Rchb. f. 516. — Br. Thierl. p. 674.

2) Eier:

L. S. XII. p. 241. n. 4. — Pall. Zoogr. II. p. 165. n. 280. — K. u. Bl. n. 376. — Schl. Rev. I. p. 100. — Bp. Consp. II. Gen. 135. n. 2. — Br. Thierl. IV. p. 673. —

462. Platalea leucerodius. Glog.

Ungarn. Türkei. Süd-Russland. Ob noch in Holland (?) — [Ganz Süd-Europa. Verfliegt sich nicht selten weit nach Norden. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 405. — Gould. t. 286. — N. V. D. t. 230. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 68. f. 6. a—f. — Bäd. t. 36. f. 3. —

L. S. XII. p. 231. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 667. n. 1. — Temm. Man. II. p. 595. — Glog. Schles. F. p. 50. n. 220. — Bechst. Nat. D. IV. p. 4. — M. u. W. II. p. 330. — Br. Lehrb. p. 531. — Schinz. p. 315. — N. V. D. IX. p. 312. — K. u. Bl n. 377. — Schl. Rev. I. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 133. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 436. — Degl. u. G. n. 401. — Br. Thierl. IV. p. 664. —

463. Rallus aquaticus. L.

Nord- und Mittel-Europa. Süd-Russland. Balearen (Mallorka): A. von Homeyer. Daurien: Dybowski. — [Ganz Europa. Nord-Afrika: A. Brehm.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 749. — Gould. t. 339. — N. V. D. t. 235. f. 1—2. —

2) Eier: Thien t. 72. f. 2. a—e. — Bäd. t. 44. f. 1. —

L. S. XII. p. 262. n. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 755. n. 1. — Willugb. Orn. p. 235. — Temm. Man. II. p. 683. — Bechst. Nat. D. IV. p. 464. — M. u. W. II. p. 406. — Br. Lehrb. p. 632. — Schinz. p. 346. — N. V. D. IX. p. 472. — K. u. Bl. n. 301. — Schl. Rev. I. p. 104. — Degl. u. G. n. 373. — Br. Thierl. IV. p. 744. —

464. Crex pratensis. Bechst.

Skandinavien: Wallengreen. Dänemark: Kjärbölling. Insel Gothland: L. Holz. Deutschland. Galizien. Ungarn. Süd-Russland (Wolga). — [Ganz Europa. Asien. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 750. — Gould. t. 341. — N. V. D. t. 236. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 72. f. 3. a—e. — Bäd. t. 44. f. 5. —

L. S. XII. p. 261. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 766. n. 1. — Temm. Man. II. p. 686. — Bechst. Nat. D. IV. p. 470. — M. u. W. II. p. 408. — Br. Lehrb. p. 636. — Schinz. p. 347. n. 1. — N. V. D. IX. p. 496. — K. u. Bl. n. 297. — Schl. Rev. I. p. 104. — Rüpp. S. Ueb. n. 475. — Degl. u. G. n. 374. — Br. Thierl. IV. p. 748. —

465. Ortygometra pusilla. Bp.

Baiern: Jäckel. Lausitz: Kutter. Schlesien. Galizien. Süd-Russland (Kiew, Sarepta, häufig). — (Mittel- und Süd-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Roux. Orn. Prov. t. 231. — Gould. t. 345. — N. V. D. t. 238. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 73. f. 3. — Bäd. t. 44. f. 4. —

Gm. L. S. p. 719. n. 30. — Pall. It. III. app. p. 700. n. 30. — Pall. Zoogr. II. p. 155. n. 273. — Lath. Ind. Orn. p. 761. n. 24. — Temm. Man. II. p. 690. — Bechst. Nat. D. IV. p. 484. — M. u. W. II. p. 414. — Br. Lehrb. p. 640. — Schinz. p. 348. n. 2. — N. V. D. IX. p. 547. — K. u. Bl. n. 299. — Schl. Rev. I. p. 103. — Degl. u. G. n. 377. —

Cab. Journ. 1865. p. 334. —

466. Ortygometra Bailloni. Temm.

Süd-Frankreich. Nach Naumann früher in Anhalt. Daurien: Dybowski. — [Süd- und Mittel-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Roux. Orn. Prov. t. 332. f. 1. — Gould. t. 344. — N. V. D. t. 239. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 73. f. 2. a b c. — Bäd. t. 44. f. 3. —

Temm. Man. II. p. 692. — Kaup. Thierr. II. p. 346. — Br. Lehrb. p. 641. — Schinz. p. 349. — N. V. D. IX. p. 576. — K. u. Bl. n. 300. — Rüpp. S. Ueb. n. 477. — Schl. Rev. I. p. 103. — Degl. u. G. n. 376. —

N. 1856. p. 402. Eier. —

467. Ortygometra porzana. Steph.

Dänemark: Kjärbölling. Ganz Deutschland. Süd-Russland (Kiew und an der Wolga). — [Süd- und Mittel-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 751. — Gould. t. 343. — N. V. D. t. 227. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 73. f. 1. a—e. — Bäd. t. 44. f. 2. —

L. S. XII. p. 262. n. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 772. n. 19. — Temm. Man. II. p. 688. — Kaup. Thierr. II. p. 346. — Bechst. Nat. D. IV. p 478. — M. u. W. II. p. 412. — Br. Lehrb. p. 638. — Schinz. p. 348. n. 1. — N. V. D. IX. p. 523. — K. u. Bl. n. 298. — Schl. Rev. I. p. 103. — Rüpp. S. Ueb. n. 476. — Degl. u. G. n. 375. —

468. Gallinula chloropus. Lath.

Süd- und Mittel-Europa. Canaren: Bolle, — [Asien. Afrika, selten: A. Brehm.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 877. — Gould. t. 342. — N. V. D. t. 240. f. 1—3. — Rchb. f. 1105—9. —

2) Eier: Thien. t. 73. f. 8. a—f. — Bäd. t. 44. f. 7. —

L. S. XII. p. 258. n. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 771. n. 15. — Briss. Orn. VI. p. 3. — Temm. Man. II. p. 693. — Bechst. Nat. D. IV. p. 489. — M. u. W. II. p. 410. — Br. Lehrb. p. 643. — Schinz. p. 347. n. 2. — N. V. D. IX. p. 587. — K. u. Bl. n. 302. — Schl. Rev. I. p. 103. — Rüpp. S. Ueb. n. 479. — Hartl. W. Afr. n. 693. — Degl. u. G. n. 378. — Br. Thierl. IV. p. 758. —

469. Porphyrio hyacinthinus. Temm.

Portugal (Ribatejo): du Bocage. Spanien. Balearen: A. von Homeyer. Sardinien: Salvadori. Nord-Afrika. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 340. — Bp. Faun. Ital. t. 44. — Br. Thierl. IV. p. 756. —

2) Eier: Thien. t. 72. f. 13. Unkenntlich. — Bäd. t. 44. f. 6. —

Barrère Orn. p. 61. — Briss. Orn. V. p. 522. — Pall. Zoogr. II. p. 156. n. 274. — Temm. Man. II. p. 698. — Br. Lehrb. p. 637. — Schinz. p. 350. — K. u. Bl. n. 304. — Schl. Rev. I. p. 102. — Rüpp. S. Ueb. n. 480. — Br. Thierl. IV. p. 755. — Degl. u. G. n. 379. —

Cab. Journ. 1862. p. 430. —

470. Fulica atra. L.

Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. In Griechenland noch nicht beobachtet. Klein-Asien: von Gonzenbach. — [Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 197. — Gould. t. 338. — N. V. D. t. 241. f. 1—3. — Rchb. f. 1082—87. —

2) Eier: Thien. t. 74. f. 1. a—d. — Bäd. t. 44. f. 9. —

L. S. XII. p. 257. n. 2. — n. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 777. n. 1. — Temm. Man. II. p. 706. — Bechst. Nat. D. IV. p. 511. — M. u. W. II. p. 423. — Br. Lehrb. p. 670. — Schinz. p. 351. — N. V. D. IX. p. 635. — K. u. Bl. n. 303. — Schl. Rev. I. p. 102. — Rüpp. S. Ueb. n. 481. — Degl. u G. n. 380. — Br. Thierl. IV. p. 762. —

471. Fulica cristata. Gm.

Portugal (Ribatejo): du Bocage. Spanien (Valencia): A. Brehm. Balearen: A. von Homeyer. Afrika (Algerien. Cap.) —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 797. — Bp. Faun. Ital. t. 44. — N. 1856. t. 3. —

2) Eier: Thien. t. 74. f. 4. a b c. — Bäd. t. 44. f. 8. —

Gm. L. S. p. 704. n. 25. — Lath. Ind. Orn. II. p. 779. — Schl. Rev. I. p. 102. — Rüpp. S. Ueb. n. 482. — Degl. u. G. n. 381. —

Cab. Journ. 1853. Erinnerungsschr. p. 79. — 1862. p. 430. —

472. Parra jacana. L.

Süd-Amerika. — [Wird in einigen Verzeichnissen Europäischer Vögel als in Süd-Frankreich vorgekommen aufgeführt. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 322. — pl. 846. — Gray. Gen. B. II. t. 159. f. 1. — Br. Thierl. IV. p. 753. —

2) Eier: Thien. t. 72. f. 11. a b c. — Bäd. t. 59. f. 2. —

L. S. I. p. 259. n. — Gm. L. S. I. 2. p. 708. — Lath. Ind. Orn. II. p. 762. — p. 763. (juv.) — Burm. Th. Bras. III. p. 394. — Br. Thierl. IV. p. 752. —

Cab. Journ. 1856. p. 425. — 1867. p. 419. —

VIII. NATATORES.

473. Phoenicopterus antiquorum. Temm.

Nord-Afrika. Spanien (Porta St. Maria. 1866.) Früher (1851) bei Nimes einmal häufig. — [Besucht das südlichste Europa häufig, besonders Portugal, Spanien, Italien und die Mittelmeer-Inseln. Hat sich mehrmals bis nach Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 63. — Gould. t. 287. — Gray. Gen. B. II. t. 163. f. 2. — N. V. D. t. 233. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 70. f. 7. a b c. — Bäd. t. 78. f. 1. —

L. S. XII. p. 230. n. 1. (part.) — Temm. Man. Orn. p. 587. Anmerk. — Pall. Zoogr. II. p. 207. n. 315. — Lath. Ind. Orn. II. p. 788. n. 1. — M. u. W. III. p. 173. — Br. Lehrb. p. 652. — Schinz. p. 316. — N. V. D. IX. p. 408. — K. u. Bl. n. 378. — Schl. Rev. J. p. 101. — Bp. Consp. II. Gen. 132. n. 3. — Rüpp. S. Ueb. n. 483. — Degl. u. G. n. 404. — Br. Thierl. IV. p. 771. —

474. Phoenicopterus erythacus. Verr.

Afrika. — [Nach Salvadori auf Sardinien vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier:

Verr. Rev. Mag. Zool. 1855. p. 221. — Bp. Consp. II. Gen. 132. n. 5. — Hartl. W. Afr. n. 695. —

Cab. Journ. 1865. p. 320. —

475. Cygnus olor. Gm.

Süd-Schweden: Wallengreen. Karelen: A. von Nordmann. Dänemark: Kjärbölling. Neuvorpommern: L. Holtz. Süd-Russland (Sarepta): Möschler. Vielfach gezähmt und oft mehr oder weniger verwildert. — [GanzEuropa. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 913. — Gould. t. 354. — N. V. D. t. 295. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 77. f. 1. — Bäd. t. 63. f. 1. —

L. S. XII. p. 194. n. 1. β. — Gm. L. S. p. 501. n. 2. — Briss. Orn. VI. p. 288. n. 11. — Pall. Zoogr. II. p. 215. n. 317. — Lath. Ind. Orn. II. p. 834. n. 2. — Temm. Man. II. p. 830. — IV. p. 529. — Bechst. Nat. D. IV.

p. 815. — M. u. W. II. p. 501. — Br. Lehrb. p. 759. — Schinz. p. 399. n. 1. — N. V. D. XI. p. 342. — K. u. Bl. n. 381. — Schl. Rev. I. p. 111. — p. 112. = C. immutabilis Yarr. — Degl. u. G. n. 467. n. 467. A. = C. immutabilis. — Br. Thierl. IV. p. 780. —

476. Cygnus musicus. Bechst.

Island. Skandinavien: Wallengreen. Süd-Russland (Sarepta). Sibirien: von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 355. — N. V. D. t. 296. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 76. f. 2. — Bäd. t. 47. f. 1. —

L. S. XII. p. 194. n. 1. *α.* — Gm. L. S. p. 501. n. 1. — Briss. Orn. VI. p. 292. n. 12. — Temm. Man. II. p. 828. — Bechst. Nat. D. IV. p. 830. — M. u. W. II. p. 498. — Br. Lehrb. p. 761. — Schinz. p. 388. — N. V. D. XI. p. 478. — K. u. Bl. n. 379. — Schl. Rev. I. p. 112. — Degl. u. G. n. 465. — Br. Thierl. IV. p. 780. —

477. Cygnus minor. Pall.

Island. — [Nord- und Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 356. — N. V. D. t. 297. f. 1—2. — Gray. Gen. B. II. t. 163. f. 1. — N. 1854. t. 1. — t. 2. — 1855. t. 4. —

2) Eier: Thien. t. 76. f. 1. — Bäd. t. 31. f. 1. —

Pall. Zoogr. II. p. 214. n. 316. *β.* — L. Trans. XVI. p. 445. — Br. Nat. V. D. p. 832. n. 2. — N. V. D. XI. p. 497. — XIII. p. 298. — K. u. Bl. n. 380. — Schl. Rev. I. p. 112. — Degl. u. G. n. 466. — Br. Thierl. IV. p. 780. N. 1854. p. 145. — p. 327. — 1855. p. 101. — Cab. Journ. 1861. p. 66.

478. Anser hyperboreus. Pall.

Nord-Amerika (Anderson River). Sibirien: Pallas. — [Soll in Deutschland vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 316. — Wils. Am. Orn. t. 68. f. 5. — N. V. D. t. 284. f. 1—3. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 504. n. 54. — Pall. Zoogr. II. p. 227. n. 322. — Briss. Orn. VI. p. 288. n. 10. — Lath. Ind. Orn. II. p. 837. n. 14. — Temm. Man. II. p. 816. — IV. p. 516. — Penn. Arct. Zool. II. p. 549. n. 477. — Bechst. Nat. D. IV. p. 906. — M. u. W. II. p. 551. — Br. Lehrb. p. 766. — Schinz. p. 401. n. 3. — N. V. D. XI. p. 213. — K. u. Bl. n. 384. — Schl. Rev. I. p. 109. — Degl. u. G. n. 477. — Br. Thierl. IV. p. 800. —

479. Anser cinereus. M. u. W.

Ganz Nord-Europa. Dänemark: Kjärbölling. Braunschweig. Anhalt. Mecklenburg. Pommern. Schlesien. Süd-Russland (Kiew). Türkei. Walachei. Sibirien. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 347. — N. V. D. t. 285. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 165. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 75. f. 5. — Bäd. t. 47. f. 4. —

L. S. XII. p. 197. n. 9. — Pall. Zoogr. II. p. 222. n. 320. — Gessn. Av. p. 158. — Temm. Man. II. p. 819. — IV. p. 517. — Bechst. Nat. D. IV. p. 842. a. — M. u. W. II. p. 552. — Br. Lehrb. p. 767. — Schinz. p. 400. n. 1. — N. V. D. XI. p. 229. — K. u. Bl. n. 387. — Schl. Rev. I. p. 109. — Degl. u. G. n. 468. — Br. Thierl. IV. p. 794. —

480. Anser segetum. Bechst.

Island. Lappland. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 287. f. 1– 2. —
2) Eier: Thien. t. 75. f. 9. —

L. Faun. Suec. p. 40. n. 114. — Gm. L. S. p. 512. n. 68. (?) — Lath. Ind. Orn. II. p. 843. n. 28. — Temm. Man. II. p. 820. — IV. p. 517. — M. u. W. II. p. 554. — Penn. Arct. Zool. II. p. 546. n. 472. — Schinz. p. 401. n. 2. — Br. Lehrb.. p. 770. (?) — N. V. D. XI. p. 302. — Degl. u. G. n. 470. N. 1855. p. 262. —

481. Var. Anser arvensis. Br.

Lappland. — [Nord- und Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 286. f. 1—2. — Isis 1828. t. 9. f. 4. —
2) Eier: Thien. t. 75. f. 7. —

Gm. L. S. p. 512. n. 68. (?) — Briss. Orn. VI. p. 265. — Br. Lehrb. p. 768. — Schinz. p. 401. n. 1. — N. V. D. XI. p. 277. — K. u Bl. n. 386. — Schl. Rev. I. p. 109. — Degl. u. G. n. 469. —

482. Anser albifrons. Bechst.

Nördliches Russland (Archangel). Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 289. — N. V. D. t. 289. f. 1—2. —
2) Eier: Thien. t. 75. f. 6. (?) — Bäd. t. 63. f. 3. —

Briss. Orn. VI. p. 269. — L. S. XII. p. 197. n. 11. — Gm. L. S. p. 509. n. 61. — Lath. Ind. Orn. II. p. 842. n. 27. — Temm. Man. II. p. 821. — IV. p. 518. — Bnchst. Nat. D. IV. p. 898. n. 272. — Bechst. Nat. V. D. IV. p. 898. — M. u. W. II. p. 555. — Br. Lehrb. p. 774. — Schinz. p. 400. n. 2. — N. V. D. XI. p. 351. — K. u. Bl. n. 385. — Schl. Rev. I. p. 110. — Midd. Sib. Reise II. p. 227. — Degl. u. G. n. 471. —
Cab. Journ. 1870. p. 292. —

483. Var. Anser intermedius. Naum.

Island: Faber. — [Von Naumann in Deutschland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 288. — N. 1858. t. 4. —
2) Eier:

Br. Nat. V. D. p. 841. n. 6. — Fab. Prodr. p. 79. — N. V. D. XI. p. 340. — Degl. u. G. n. 471. —
N. 1855. p. 261.

484. Anser erythropus. L.

Lappland (Ostfinnmarken). Sibirien (Boganída): von Middendorff. — [Hat sich schon öfter bis Ungarn und Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 290. f. 1—3. — Midd. Sib. Reise II. t. 20. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 75. f. 10. (?) —

L. S. XII. p. 197. n. 11. — Br. Nat. V. D. p. 844. n. 2. — p. 845. — Br. Beitr. III. p. 875. — Br. Lehrb. p. 772. — Schl. Rev. I. p. 110. — N. V. D. XI. p. 365. — XIII. p. 293. — Midd. Sib. Reise II. p. 228. — Degl. u. G. n. 472. —

Cab. Journ. 1870. p. 295. —

485. Anser bernicla. Ill.

Spitzbergen. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 342. — Wils. Am. Orn. t. 72. f. 1. — Gould. t. 351. — N. V. D. t. 292. f. 1—2. — Gray. Gen. B. II. t. 165. f. 2.

2) Eier: Thien. t. 75. f. 2. — Bäd. t. 78. f. 3. —

L. S. XII. p. 198. n. 13. — Pall. Zoogr. II. p. 229. n. 323. — Lath. Ind. Orn. II. p. 844. n. 32. — Temm. Man. II. p. 824. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 131. — Bechst. Nat. D. IV. p. 911. — M. u. W. II. p. 559. — Br. Lehrb. p. 777. — Schinz. p. 402. n. 2. — N. V. D. XI. p. 393. — K. u. Bl. n. 388. — Schl. Rev. I. p. 110. — Degl. u. G. n. 474. —

Cab. Journ. 1870. p. 304. —

486. Anser leucopsis. Bechst.

Spitzbergen. — [Nördliches Russland. Verfliegt sich bis Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 855. — Gould. t. 350. — N. V. D. t. 291. f. 1—2. —

2) Eier: Bäd. t. 63. f. 4. —

Gm. L. S. p. 512. n. 11. — Pall. Zoogr. II. p. 230. n. 324. — Lath. Ind. Orn. II. p. 843. n. 31. — Temm. Man. II. p. 823. — Bechst. IV. p. 921. — M. u. W. II. p. 557. — Br. Lehrb. p. 776. — Schinz. p. 402. n. 1. — K. u. Bl. n. 389. — Schl. Rev. I. p. 111. — N. V. D. XI. p. 378. — XIII. p. 296. — Degl. u. G. n. 473. —

Cab. Journ. 1870. 302. —

487. Anser ruficollis. Pall.

Sibirien (Boganída) nicht selten: von Middendorff. — [Süd-Russland. Verfliegt sich nur sehr selten bis nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 352. — N. V. D. t. 293. —

2) Eier: Midd. Sib. Reise II. t. 20. f. 3. —

Gm. It. II. p. 180. — Gm. L. S. p. 511. n. 67. — Lath. Ind. Orn. II. p. 841. n. 23. — Pall. Zoogr. II. p. 231. n. 326. — Temm. Man. II. p. 826.

— Bechst. Nat. D. IV. p. 916. — M. u. W. II. p. 561. — Br. Lehrb. p. 779. — Schinz. p. 403. n. 1. — N. V. D. XI. p. 408. — XIII. p. 297. — K. u. Bl. n. 390. — Schl. Rev. I. p. 111. — Midd. Sib. Reise II. p 229. — Degl. u. G. n. 475. —

Cab. Journ. 1870. p. 305. —

488. Anser aegyptiacus. Briss.

Afrika. — [Nach Naumann an den Donaumündungen und nach Degland und Gerbe 1833 auf der Mosel und 1835 bei Namur geschossen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 379. — t. 982.—983. — Gould. t. 353. — N. V. D. t. 294. f. 1—2. — Gray Gen. B. II. t. 164. f. 4. —

2) Eier: Thien. t. 75. f. 1. — Bäd. t. 31. f. 4. —

L. S. XII. p. 197. n. 10. — Briss. Orn. VI. p. 284. p. 9. — Lath. Ind. Orn. II. p. 840. n. 21. — Temm. Man. II. p. 523. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1043. — M. u. W. II. p. 562. — III. p. 232. — Br. Lehrb. p. 780. — N. V. D. XI. p. 416. — K. u. Bl. n. 391. — Schl. Rev. I. p. 111. — Degl. u. G. n. 478. — Br. Thierl. IV. p. 804. —

489. Erismatura mersa. L.

Süd-Russland (Wolga). — [Verfliegt sich selten nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Sav. Descr. de l'Eg. t. 10. f. 2. — Gould. t. 383. — N. V. D. t. 315. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 169. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 4. — Bäd. t. 23. f. 5. —

Gm. L. S. p. 520. n. 84. — Pall. It. I. p. 713. n. 29. — Scop. Ann. I. p. 65. n. 79. — Lath. Ind. Orn. II. p. 858. n. 64. — Temm. Man. II. p. 859. — Bechst. Nat. D. IV. p. 982. — Eyt. Anat. p. 170. — M. u. W. II. p. 506. — Br. Lehrb. p. 824. — Schinz. p. 413. n. 1. — N. V. D. XII. p. 149. — K. u. Bl. n. 408. — Schl. Rev. I. p. 118. — Rüpp. S. Ueb. n. 501. — Degl. u. G. n. 510. — Br. Thierl IV. p. 844. —

490. Anas tadorna. L.

Dänemark: Kjärbölling. Sylt. Rügen. Hiddensee. Rottum. Gothland. Lappland, Finnland: A. von Nordmann. — [Ganz Europa, im Binnenlande selten. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 53. — Gould. t. 357. — N. V. D. t. 298. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 11. — Bäd. t. 68. f. 1. —

L. S. XII. p. 195. n. 4. — Gm. It. II. p. 185. — Lath. Ind. Orn. II. p. 854. n. 56. — Temm. Man. II. p. 834. — Bechst. Nat. D. IV. p. 976. — M. u. W. II. p. 534. — Br. Lehrb. p. 784. — Schinz. p. 404. n. 2. — N. V. D. XI. p. 534. — K. u. Bl. n. 392. — Schl. Rev. I. p. 115. — Degl. u. G. n. 479. — Br. Thierl. IV. p. 815. —

491. Anas rutila. Pall.

Süd-Russland (Wolga). Daurien: Dybowski. — [Nord-Afrika. Klein-Asien. Soll sich bis nach Deutschland verflogen haben.]

Abbild. 1) Vogel: Sav. Descr. de l'Eg. t. 10. f. 1. — Gould. t. 358. — N. V. D. t. 299. f. 1—2. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 7. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 12. — Bäd. t. 56. f. 1. —

L. S. XII. app. p. 224. — Pall. Nov. Com. Petr. XIV. p. 579. — Lath. Ind. Orn. II. p. 841. n. 24. — Temm. Man. II. p. 832. — M. u. W. II. p. 532. — Br. Lehrb. p. 787. — Schinz. p. 404. n. 1. — N. V. D. XI. p. 564. K. u. Bl. n. 393. — Schl. Rev. I. p. 116. — Rüpp. S. Ueb. n. 490. — Degl. u. G. n. 480. Br. Thierl. IV. p. 812. —

492. Anas moschata. L.

Süd-Amerika. Nach Keyserling und Blasius am Kaspischen Meere verwildert. — [In fast ganz Europa und Amerika domesticirt.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 989. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 5. —

2) Eier: Bäd. t. 68. f. 2. —

L. S. XII. p. 199. n. 16. — Pall. Zoogr. II. p. 258. n. 342. — Lath. Ind. Orn. II. p. 846. n. 37. — Flem. Phil. Zool. II. p. 260. — K. u. Bl. n. 402. — Schl. Rev. II. p. 107. — Burm. Th. Bras. III. p. 440. — Br. Thierl. IV. p. 832. —

493. Anas boscas. L.

Ganz Europa. Asien. Nord-Afrika. Nord-Amerika. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 776—777. — Gould. t. 361. — N. V. D. t. 300. f. 1—4. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 8. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 4. — Bäd. t. 68. f. 5. — f. 6 = A. domestica. — f. 7. = A. adunca. L. —

L. S. XII. p. 205. n. 40. — p. 206. n. 41. Var. — Lath Ind. Orn. II. p. 850. n. 49. — Temm. Man. II. p. 833. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1046. — M. u. W. II. p. 538. — Br. Lehrb. p. 791. — Schinz. p. 405. n. 1. — N. V D. XI. p. 575. — K. u. Bl. n. 398. — Schl. Rev. I. p. 113. — Rüpp. S. Ueb. n. 497. — Degl. u. G. n. 482. — Br. Thierl. IV. p. 821. —

494. Anas acuta. L.

Schweden. Norwegen: Wallengreen. Lappland. Oldenburg. Dänemark: Kjärbölling. Mecklenburg. Hiddensee. Braunschweig: Blasius. Anhalt: Baldamus. Liegnitz: A. von Homeyer. Süd-Russland (Sarepta). Sibirien (Boganida): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 954. — Gould. t. 365. — N. V. D. t. 301. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 12. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 5. — Bäd. t. 61. f. 1. —

L. S. XII. p. 202. n. 28. — Gessn. Av. p. 117. — Briss. Orn. V. p. 369.

n. 16. — Lath. Ind. Orn. II. p. 864. — Temm. Man. II. p. 838. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1116. — M. u. W. II. p. 536. — Br. Lehrb. p. 796. — Schinz. p. 406. — N. V. D. XI. p. 638. — K. u. Bl. n. 397. — Schl. Rev. I. p. 115. — Rüpp. S. Ueb. n. 493. — Degl. u. G. n. 486. —

495. Anas falcata. Pall.

Nord-Asien (Stanowoj-Gebirge): von Middendorff. — [Nach Degland und Gerbe in Ungarn; nach Wallengreen bei Skellefteä (1853) erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 389. f. 1. — Midd. Sib. Reise II. t. 21. f. 2. (fem.) — Sharpe. und Dresser. t. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 521. n. 86. — Georgi Reise. p. 167. — Pall. It. III. app. p. 301. n. 34. — Pall. Zoogr. II. p. 359. n. 343. — Eyt. Anat. p. 126. n. 57. — N. V. D. XIII. p. 300. — Midd. Sib. Reise II. p. 231. — Degl. u. G. n. 491. —

N. 1854. p. 273. —

496. Anas formosa. Georgi.

Nord-Asien. An der Boganida: von Middendorff. — [Nach Keyserling und Blasius in England, nach Degland und Gerbe mehrmals auf der Saône (1836) erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 363. — Sharpe. u. Dresser. t. —

2) Eier: Bäd. t. 61. f. 8. — Midd. Sib. Reise II. t. 23. f. 1—2. —

Gm. L. S. p. 526. n. 96. — Georgi Reise p. 168. — Penn. Brit. Zool. II. p. 602. n. 287. — Pall. Zoogr. II. p. 261. — Vieill. Enc. méth. I. p. 158. — Trans. Lin. Soc. XIV. p. 559. — Schinz. p. 420. n. 2. — K. u. Bl. n. 400. — Schl. Rev. I. p. 113. — Midd. Sib. Reise II. p 230. — Degl. u. G. n. 490. —

497. Anas angustirostris. Ménétr.

Canaren: Bolle. Algerien. — [Süd-West-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Bp. Faun. Ital. t. 47. f. 1—2. — Gould. t. 373. —

2) Eier: Bäd. t. 61. f. 7. —

Ménétr. Cat. p. 58. n. 205. — Temm. Man. IV. p. 544. — Eyt. Anat. p. 114. n. 4. — Bp. List. B. p. 57. — Schinz. p. 417. — K. u. Bl. n. 397. Anmerk. — n. 400. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 113. — Degl. u. G. n. 492. —

498. Anas strepera. L.

Oldenburg: von Negelein. Dänemark: Kjärbölling. Braunschweig: Blasius. Anhalt: Baldamus. Schlesien: Gloger. Süd-Russland (Kiew, Sarepta). — [Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. Nord-Afrika. Asien. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Wils. Am. Orn. t. 71. — Gould. t. 366. — N. V. D. t. 302. f. 1 - 3. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 8. — Bäd. t. 61. f. 3. —

L. S. XII. p. 200. n. 20. — Gessn. Av. p. 117. — Lath. Ind. Orn. II. p. 859. n. 69. — Temm. Man. II. p. 837. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1096. — M. u. W. II. p. 533. — Br. Lehrb. p. 794. — Schinz. p. 405. n. 2. — N. V. D. XI. p. 659. — K. u. Bl. n. 396. — Schl. Rev. I. p. 115. — Degl. u. G. n. 483. —

499. Anas querquedula. L.

Finnland (Kuopio): Wright. Dänemark: Kjärbölling. Oldenburg, Braunschweig: Blasius. Mecklenburg. Gothland. Westphalen. Schlesien. Altenburg, Mähren. Galizien. Sicilien, Sardinien: Salvadori. Süd-Russland (Kiew, Sarepta). — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 946. — Gould. t. 364. — N. V. D. t. 303. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 11. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 1. — Bäd. t. 61. f. 5. —

L. S. XII. p. 203. n. 32. — Lath. Ind. Orn. II. p. 872. n. 99. — Temm. Man. II. p. 844. — Eyt. Anat. p. 130. n. 1. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1135. — p. 1150. — M. u. W. II. p. 545. — Br. Lehrb. p. 800. — Schinz. p. 408. n. 2. — N. V. D. XI. p. 677. — K. u. Bl. n. 395. — Schl. Rev. I. p. 114. — Degl. u. G. n. 487. —

500. Anas discors. L.

Nord-Amerika. — [Soll in England vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 393. — Buff. pl. enl. 966. — Wils. Am. Orn. t. 68. f. 4. —

2) Eier:

L. S. XII. p. 204. — Briss. Orn. VI. p. 452. — p. 455. — Audub. B. Am. IV. p. 287. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 205. — Baird. u. Cass. p. 779. — Degl. u. G. n. 488. —

501. Anas crecca. L.

Nord- und Mittel-Europa; selten im Binnenlande. Sardinien: Salvadori. Süd-Russland (Sarepta): Möschler. Am Ochotskischen Meere häufig: von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 947. — Gould. t. 362. — N. V. D. t. 304. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 167. f. 10. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 2. — Bäd. t. 61. f. 6. —

L. S. XII. p. 204. n. 33. — Lath. Ind. Orn. II. p. 872. n. 100. — Temm. Man. II. p. 846. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1143. — M. u. W. II. p. 547. — Br. Lehrb. p. 801. — Schinz. p. 409. n. 1. — N. V. D. XI. p. 701. — K. u. Bl. n. 399. — Schl. Rev. I. p. 113. — Rüpp. S. Ueb. n. 494. — Degl. u. G. n. 489. —

502. Anas penelope. L.

Island. Dänemark: Kjärbölling. Schweden. Norwegen. Lappland.

Finnland. Sibirien (Boganida): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 825. — Gould. t. 359. — N. V. D. t. 305. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 167. f. 6. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 6. — Bäd. t. 61. f. 4. —

L. S. XII. p. 202. n. 27. — Gessn. Av. p. 121. — Lath. Ind. Orn. II. p. 860. n. 71. — Temm. Man. II. p. 840. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1109. — M. u. W. II. p. 541. — Schinz. p. 407. n. 1. — N. V. D. XI. p 724. — K. u. Bl. n. 394. — Schl. Rev. I. p. 114. — Rüpp. S. Ueb. n. 492. — Degl. u. G. n. 484. —

503. Anas americana. L.

Nord-Amerika. — [In England beobachtet: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 955. — Audub. B. Am. t. 389. — Wils. Am. Orn. t. 69. f. 4. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 526. n. 97. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 198. — Baird u. Cass. p. 783. — Schl. Rev. I. p. 114. — Degl. u. G. n. 485. —

504. Anas Sponsa. L.

Nord-Amerika. — [In England angetroffen: Keyserling und Blasius. 1852 bei Berlin geschossen: Martin. 1857 auf dem Main erlegt: Jäger. Hier und da domesticirt.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 391. — Buff. pl. enl. 980—981. — Wils. Am. Orn. t. 70. f. 3. — Gray Gen. B. II. t. 167. f. 13. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 8. — Bäd. t. 68. f. 4. —

L. S. XII. p. 207. n. 43. — Schinz. p. 409. n. 2. — Schl. Rev. II. p. 108. — K. u. Bl. n. 393a. — Wils u. Bp. Nat. Hist. III p. 201. — Br. Thierl. IV. p. 825. —

N. 1857. H. 2. p. 84. — Cab. Journ. 1853. p. 156. —

505. Rhynchaspis clypeata. Leach.

Oldenburg von Negelein. Mecklenburg. Bei Hamburg. Dänemark. Gothland. Hiddensee. Oderbruch, häufig: Borggreve. Braunschweig: Blasius. Mansfelder Seen. Schlesien. Nord-Russland (Archangel): Göbel. Süd-Russland (Wolga). — [Europa. Asien. Afrika. Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 971—972. — Wils. Am. Orn. t. 67. — Gould. t. 360. — N. V. D. t. 306. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 167. f. 9.

2) Eier: Thien. t. 79. f. 7. — Bäd. t. 61. f. 2. —

L. S. XII. p. 200. n. 19. — Lath Ind. Orn. II. p. 853. n. 60. — Temm. Man. II. p. 842. — Boie. Isis. 1822. p. 564. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1101. — M. u. W. II. p. 543. — Br. Lehrb. p. 788. — Schinz. p. 408. n. 1. — N. V. D. XI. p. 747. — K. u. Bl. n. 401. — Schl. Rev. I. p. 115. — Rüpp. S. Ueb. n. 495. — Degl. u. G. n. 481. — Br. Thierl. IV. p. 830. —

506. Fuligula rufina. Steph.

Balearen (Mallorka): A. von Homeyer. Sardinien: Salvadori. Mecklenburg. Mansfelder Seen (nur bei Wanzleben). Süd-Russland

(Wolga). — [Mittel- und Süd-Europa; im äussersten Westen nur sehr selten. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 928. — Gould. t. 369. — N. V. D. t. 307. f. 1—2. — Gray. Gen. B. II. t. 168. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 3. — Bäd. t. 23. f. 4. —

Gm. L. S. p. 541. n. 118. — Pall. It. II. app. p. 713. n. 28. — Lath. Ind. Orn. II. p. 870. n. 94. — Temm Man. II. p. 864. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1021. — M. u. W. II. p. 518. — Br. Lehrb. p. 826. — Schinz. p. 416. — N. V. D. XII. p. 7. — XIII. p. 304. — K. u. Bl. n. 418. — Schl. Rev. I. p. 121. — Degl. u. G. n. 493. —

Cab. Journ. 1870. p. 278. —

507. Fuligula ferina. Steph.

Süd-Schweden: Wallengreen. Braunschweig. Mecklenburg, häufig. Pommern. Schlesien: Gloger, Mansfelder Seen (Wanzleben). Galizien. Süd-Russland (Kiew: Göbel. Wolga). — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 803. — N. V. D. t. 308. t. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 6. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 2. — Bäd. t. 23. f. 1. —

L. S. XII. p. 203. n. 31. — Flem. Phil. Zool. II. p. 260. — Lath. Ind. Orn. II. p. 862. n. 77. — p. 863. n. 78. — Temm. Man II. p. 868. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1028. — M. u. W. II. p. 527. — Br. Lehrb. p. 828. — Schinz. p. 419. n. 1. — N. V. D. XII. p. 21. — K. u. Bl. n. 417. — Schl. Rev. I. p 120. — Degl. u. G. n. 497. — Br. Thierl. IV. p. 842. —

508. Fuligula Homeyeri. Bäd.

Bastard von F. ferina und F. nyroca: Olph-Galliard. Blasius. —

[Wurde im Jahre 1850 in der Nähe von Rotterdam erlegt: Bädecker.]

Abbild. 1) Vogel: N. 1852. t. 1. —

2) Eier:

Bäd. N. 1852. p. 12. — 1856. p. 252. — Cab. Journ. 1853. Extrh. p. 7. — 1854. p. 280 — p. 408. — Beil. p. 14. — p. 66. — p. 69. — 1856. p. 272. — p. 354. — 1857. p. 144. —

509. Fuligula nyroca. Steph.

Braunschweig, häufig. Pommern. Preussen. Schlesien. Lausitz, häufig. Galizien, Ungarn, häufig. Süd-Russland (Kiew und Sarepta häufig. — [Süd- und Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 1000. — Gould. t. 368. — N. V. D. t. 309. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 3. — Bäd. t. 23. f. 2. —

Gm. L. S. p. 542. n. 119. — Güld. Nov. Com. Petrop. XIV. 1. p. 403. — Pall. Zoogr. II. p. 268. n. 349. — Lath. Ind. Orn. II. p. 875. n. 104. — p. 869. n. 91. — Temm. Man. II. p. 876. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1009. — M. u. W. II. p. 526. — Br. Lehrb. p. 834. — Schinz. p. 420. n. 1. — N. V. D. XII. p. 41. — K. u. Bl. n. 416. — Schl. Rev. I. p. 120. —

510. Fuligula marila. Steph.

Island. Grönland. Lappland. Schweden. Einmal bei Braunschweig: Blasius. Sibirien (Boganida): von Middendorff. — [Nord- und Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 1002. — Gould. t. 371. — N. V. D. t. 311. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 78. f. 4. ab. — Bäd. t. 48. f. 1. —

L. S. XII. p. 196. n. 8. — Lath. Ind. Orn. II. p. 853. n. 54. — Temm. Man. II. 865. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1016. — M. u. W. II. p. 524. — Br. Lehrb. p. 830. — Schinz. p. 418. n. 1. — N. V. D. XII. p. 88. — K. u. Bl. n. 414. — Schl. Rev. I. p. 120. — Degl. u. G. n. 496. —

511. Var. Fuligula mariloïdes. Glog.

Nord-Amerika. — [Soll in Grossbritannien vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 397. — Wils. Am. Orn. t. 69. f. 3.

2) Eier:

Yarrell. Brit. B. III. p. 247. — Eyt. Anat. p. 157. — Baird. u. Cass. p. 391. n. 2. — Schl. Rev I. p. 120. — Degl. u. G. n. 496. (part.) —

512. Fuligula cristata. Steph.

Lappland. Mecklenburg. Oldenburg, selten: von Negelein. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 1001. — Gould. t. 370. — N. V. D. t. 310. f. 1—5. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 1. — Bäd. t. 56. f. 4. —

L. S. XII. p. 207. n. 45. — Pall. Zoogr. II. p. 268. n. 349. — Lath. Ind. Orn. II. p. 869. n. 90. — Temm. Man. II. p. 873. — Bechst. Nat. D. IV. p. 997. — M. u. W. II. p. 519. — Br. Lehrb. p. 833. — Schinz. p. 419. n. 2. — N. V. D. XII. p. 64. — K. u. Bl. n. 415. — Schl. Rev. I. p. 119. — Rüpp. S. Ueb. n. 499. — Degl. u. G. n. 494. —

513. Fuligula collaris. Bp.

Nord-Amerika. — [In England geschossen: Bonaparte.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 398. — Wils. Am. Orn. t. 67. f. 5.

2) Eier: Bäd. t. 56. f. 5. —

Wils. Am. Orn. VIII. p. 60. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 229. — Schl. Rev. I. p. 119. — Baird. u. Cass. p. 792. — Degl. u. G. n. 495. —

514. Clangula glaucion. Boie.

Lappland. Schweden. Gothland: L. Holtz. Pommern. Mark Brandenburg (Joachimsthal): Borggreve. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 802. — Gould. t. 379. — N. V. D. t. 316. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 5. —

2) Eier: Thien. t. 78. f. 5. ab. — Bäd. t. 56. f. 3. —

L. S. XII. p. 201. n. 23. — n. 26. — Pall. Zoogr. II. p. 270. n. 350. — Lath. Ind. Orn. II. 867. n. 87. — Temm. Man. II. d. 870. — Bechst. Nat. D.

IV. p. 985. — M. u. W. II. p. 521. — Br. Lehrb. p. 837. — Schinz. p. 415. n. 1. — N. V. D. XII. p. 162. — K. u. Bl. n. 409. — Schl. Rev. I. p. 118. — Degl. u. G. n. 499.

515. Clangula islandica. Bp.

Island. Grönland. Labrador. — [Soll sich bis zur Nordküste Deutschlands verflogen haben.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 380. — N. V. D. t. 317. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 78. f. 6. a b. — Bäd. t. 56. f. 2. —

Gm. L. S. p. 541. n. 116. — Penn. Arct. Zool. II. p. 574. — Lath. Ind. Orn. II. p. 871. n. 95. — Temm. Man. VI. p. 551. — Schinz. p. 415. n. 2. — N. V. D. XII. p. 186. — K. u. Bl. n. 410. — Schl. Rev. I. p. 118. — Degl. u. G. n. 500. —

516. Clangula albeola. Jenyns.

Nord-Amerika. — [In England erlegt: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 948. — Wils Am. Orn. t. 67. f. 2—3. —

2) Eier:

Forst. Phil. Trans. I. 12. p. 416. n. 47. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 51. — Penn. Arct. Zool. p. 559. n. 489. — Schl. Rev. I. p. 119. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 232. — Baird. u. Cass. p. 797. — Degl. u. G. n. 501. —

517. Harelda glacialis. Leach.

Lappland. Island. Grönland. Labrador. Sibirien (Boganida): von Middendorff. — [Bis zu den Nordküsten Deutschlands vorkommend. Selten im Binnenlande. Mansfelder Seen: Naumann.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 999. — t. 1008. — Gould. t. 382. — N. V. D. t. 319. f. 1—5. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 79. f. 6. — Bäd. t. 23. f. 3. —

L. S. XII. p. 203. n. 30. — p. 202. n. 9. — Lath. Ind. Orn. II. p. 864. n. 82. — Steph. Shaw. Zool. XII. p. 175. — Temm. Man. II. p. 860. — Bechst. Nat. D. IV. p. 1124. — M. u. W. II. p. 509. — Br. Lehrb. p. 841. — p. 1001. — Schinz. p. 413. n. 2. — N. V. D. XII. p. 210. — K. u. Bl. n. 411. — Schl. Rev. I. p. 117. — Midd. Sib. Reise II. p. 236. — Degl. u. G. n. 503. —

518. Harelda histrionica. Leach.

Island. Grönland. Labrador. Sibirien (Stanowoj-Gebirge und Südküste des Ochotskischen Meeres): von Middendorff. — [Lappland und Schweden. Hat sich nach Naumann bis nach Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl enl. 796. — t. 798. — Wils. Am. Orn. t. 72. — Gould. t. 381. — N. V. D. t. 318. f. 1—3. — Midd. Sib. Reise II. t. 23. f. 3. (pull.) —

2) Eier: Thien. t. 80. f. 7. — Bäd. t. 48. f. 2. —

L. S. XII. p. 204. n. 35. — Lath. Ind. Orn. II. p. 849. n. 45. — Temm. Man. II. p. 878. — Penn. Arct. Zool. II. p. 560. — Bechst. Nat. D. IV. p.

1037. — M. u. W. II. p. 530. — Br. Lehrb. p. 845. — p. 848. — p. 1002. — Schinz. p. 414. — N. V. D. XII. p. 199. — K. u. Bl. n. 412. — Schl. Rev. I. p. 119. — Midd. Sib. Reise II. p. 237. — Degl. u. G. n. 502. —

519. Somateria Stelleri. Dubois.

In Europa zuerst von Nordvi 1859 in Ost-Finnmarken brütend gefunden. Nord-Amerika. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Lappland. Finnland. Nord-Russland. Verfliegt sich bis nach Deutschland.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 372. — N. V. D. t. 320. f. 1 - 2. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 9. —

2) Eier: Midd. Sib. Reise II. t. 23. f. 3—5. —

Gm. L. S. p. 535. n. 107. — Lath. Ind. Orn. II. p. 866. n. 83. — Pall. Spicil. Zool. fasc. VI. p. 35. — Pall. Zoogr. II. p. 238. n. 330. — Bp. List. B. p. 57. n. 418. — Br. Lehrb. p. 839. — Schinz. p. 407. n. 2. — N. V. D. XII. p. 240. — XIII. p. 313 = Fortpflanzung. — Temm. Man. II. p. 547. — M. u. W. III. p. 229. — K. u. Bl. n. 413. — Schl. Rev. I, p. 116. — Midd. Sib. Reise II. p. 234. Eier. — Degl. u. G. n. 504. — Br. Thierl. IV. p. 837. Cab. Journ. 1871. p. 208. —

520. Somateria mollissima. Leach.

Island. Spitzbergen. Grönland. Labrador. Faröer. Orkney-Inseln. Gothland: L. Holtz. Sylt. Schweden. Norwegen. Loffoden. Ost-Finnmarken. — [Verfliegt sich bis ins mittlere Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 208—209. — Gould. t. 374. — N. V. D. t. 321. — t. 322. f. 1. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 7. — Wils. Am. Orn. t. 91. f. 2—3. —

2) Eier: Thien. t. 76. f. 1. a b c. — Bäd. t. 8. f. 1. —

L. S. XII. p. 198. n. 15. — Briss. Orn. VI. p. 294. n. 13. — Pall. Spic. Zool. VI. p. 35. — Pall. Zoogr. II. p. 235. n. 328. — Lath. Ind. Orn. II. p. 845. n. 35. — Temm. Man. II. p. 848 — Steph. Shaw. Zool. XII. p. 224. — Penn. Arct. Zool. II. p. 553. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 122. — Bechst. Nat. D. IV. p. 926. — M. u. W. II. p. 507. — Br. Lehrb. p. 809. — p. 813. — p. 998. — Schinz. p. 410. — N. V. D. XII. p. 252. — K. u. Bl. n. 403. — Schl. Rev. I. p. 116. — Degl. u. G. n. 505. — Br. Thierl. IV. p. 836. —

521. Somateria spectabilis. Leach.

Spitzbergen. Grönland. Labrador. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Loffoden: Barth. Norwegen: Collett. Verfliegt sich bis zu den Norddeutschen Küsten: Boeck.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 404. — Gould. t. 375. — N. V. D. t. 322. f. 2. — t. 323. f. 1—3. — Midd. Sib. Reise II. t. 22. f. 1. (pull.) —

2) Eier: Thien. t. 78. f. 2. a b c. — Bäd. t. 6. f. 2. — Midd. Sib. Reise. II. t. 22. f. 2. —

L. S. XII. p. 195. n. 5. — Lath. Ind. Orn. II. p. 845. n. 36. — Temm. Man. II. p. 851. — IV. p. 541. — M. u. W. III. p. 227. — Br. Lehrb. p.

816. — p. 999. — Schinz. p. 411. n. 1. — N. V. D. XII. p. 285. — K. u. Bl. n. 404. — Schl. Rev. I. p. 116. — Midd. Sib. Reise II. p. 233. — Degl. u. G. n. 506. — Br. Thierl. IV. p. 837. —

Cab. Journ. 1863. p. 380. —

522. Oidemia perspicillata. Flem.

Nord-Amerika. — [Im October 1851 auf Helgoland vorgekommen: Gätke.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 995. — Audub. B. Am. t. 402. — Wils. Am. Orn. t. 67. f. 1. — Gould. t. 376. — N. V. D. t. 314. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 81. f. 2. — Bäd. t. 61. f. 9. —

L. S. XII. p. 196. n. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 847. n. 42. — Temm. Man. II. p. 853. — Penn. Arct. Zool. II. p. 556. — Wils. Am. Orn. VIII. p. — Bechst. Nat. D. IV. p. 973. — M. u. W. II. p. 514. — Br. Lehrb. p. 823. — Schinz. p. 412. n. 1. — N. V. D. XII. p. 140. — XIII. p. 312 = Eier. — K. u. Bl. n. 405. — Schl. Rev. I. p. 117. — Baird. u. Cass. p. 806. — Degl. u. G. n. 509. —

523. Oidemia fusca. Flem.

Schweden. Lappland. Finnland, häufig. — [Hiddensee, häufig. Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 956. — t. 1007. — Gould. t. 377. — N. V. D. t. 313. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 168. f. 4. — —

2) Eier: Thien. t. 81. f. 1. — Bäd. t. 8. f. 3. —

L. S. XII. p. 196. n. 6. — Pall. Zoogr. II. t. 244. n. 333. — Lath. Ind. Orn. II. p. 848. n. 44. — Temm. Man. II. p. 854. — Penn. Arct. Zool. II. p. 555. — Bechst. Nat. D. IV. p. 954. — M. u. W. II. p. 516. — Br. Lehrb. p. 822. — p. 1002. n. 2. — Schinz. p. 412. n. 2. — N. V. D. XII. p. 123. — K. u. Bl. n. 406. — Schl. Rev. I. p. 117. — Rüpp. S. Ueb. n. 500. — Degl. u. G. n. 508. — Br. Thierl. IV. p. 841. —

524. Oidemia nigra. Flem.

Island. Lappland. Sibirien (Boganida): von Middendorff. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 978. — Gould. t. 378. — N. V. D. t. 312. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 81. f. 3. — Bäd. t. 8. f. 4. —

L. S. XII. p. 196. n. 7. — Pall. Zoogr. II. p. 247. n. 334. — Phil. Zool. II. p. 260. — Lath. Ind. Orn. II. p. 848. n. 43. — Temm. Man. II. p. 856. — Penn. Arct. Zool. II. p. 556. — Bechst. Nat. D. IV. p. 963. — M. u. W. II. p. 503. — Br. Lehrb. p. 820. — Schinz. p. 411. n. 2. — N. V. D. XII. p. 108. — K. u. Bl. n. 407. — Schl. Rev. I. p. 117. — Degl. u. G. n. 507. —

525. Mergus albellus. L.

Nord-Russland. Sibirien (Schantar-Insel): von Middendorff. Nord-Amerika. — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 449—450. — Gould. t. 387. N. V. D. t. 324. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 170. f. 2. — Wils. Am. Orn. t. 91. f. 4.
2) Eier: Thien. t. 81. f. 6. —

L. S. XII. p. 209. n. 5. n. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 831. n. 6. — p. 832. n. 7. — Brünn. Orn. bor. n. 99. — Briss. Orn. VI. p. 252. n. 6. — Temm. Man. II. p. 887. — Penn. Arct. Zool. II. p. 539. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 126. — Bechst. Nat. D. IV. p. 804. n. 267. — M. u. W. II. p. 571. — Br. Lehrb. p. 858. — Schinz. p. 423. — N. V. D. XII. p. 314. — XIII. p. 313 = Fortpflanzung. — K. u. Bl. n. 422. — Schl. Rev. I. p. 122. — Degl. u. G. n. 514. — Br. Thierl. IV. p. 846. —

526. Mergus anatarius. Eimb.

Bastard von M. albellus. und Clangula glaucion. —

[Wurde 1825 bei Braunschweig erlegt: Eimbeck.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. XII. Titelkupfer. — Isis. 1831. t. 1. —
2) Eier:

Eimb. Isis. 1831. p. 299. — N. V. D. XII. p. 194. — Schl. Rev. II. p. 109. — Degl. u. G. II. p. 574. —

N. 1853. p. 327. — Cab. Journ. 1853. p. Extrh. p. 29. —

527. Mergus merganser. L.

Schweden. Lappland. Mecklenburg. Gothland: L. Holtz. Pommern: Borggreve. Mark Brandenburg. — [Ganz Europa. Asien. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 951. — t. 953. — Gould. t. 384. — N. V. D. t. 326. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 170. f. 3. —
2) Eier: Thien. t. 81. f. 9. — Bäd. t. 48. f. 4. —

L. S. XII. p. 208. n. 2. — p. 209. n. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 828. n. 1. — Temm. Man. II. p. 881. — Penn. Arct. Zool. II. p. 546. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 68. — Bechst. Nat. D. IV. p. 781. n. 265. — M. u. W. II. p. 565. — Br. Lehrb. p. 852. — Schinz. p. 422. — N. V. D. XII. p. 356. — K. u. Bl. n. 419. — Schl. Rev. I. p. 121. — Degl. u. G. n. 511. — Br. Thierl. IV. p. 449. —

528. Mergus serrator. L.

Island. Schweden. Norwegen. Lappland. Hiddensee: L. Holtz. — [Ganz Europa. Nord Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 207. — Gould. t. 385. — N. V. D. t. 325. f. 1—3. — Wils. Am. Orn. t. 69. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 81. f. 8. — Bäd. t. 48. f. 3. —

L. S. XII. p. 208. n. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 829. n. 4. — Briss. Orn. VI. p. 250. n. 4. — Temm. Man. II. p. 884. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 69. — Bechst. Nat. D. IV. p. 795. n. 266. — M. u. W. II. p. 568. — Br. Lehrb. p. 855. — Schinz. p. 423. n. 1. — N. V. D. XII. p. 333 — K. u. Bl. n. 420. — Schl. Rev. I. p. 121. — Degl. u. G. n. 512. —

529. Mergus cucullatus. L.

Nord-Amerika. — [Nach Temminck in Frankreich, und nach Selby in England erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 935—936. — Wils. Am. Orn. t. 69. f. 1.
2) Eier: Thien. t. 81. f. 7. —

L. S. XII. p. 207. n. 1. — Briss. Orn. VI. p. 258. n. 8. — Lath. Ind. Orn. II. p. 832. — Shaw. Zool. XII. p. 168. — Schinz. p. 424. — K. u. Bl. n. 421. — Schl. Rev. I. p. 121. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 243. — Baird. u. Cass. p. 816. — Degl. u. G. n. 513. —

530. Sterna caspia. Pall.

Sylt. Gothland, selten: L. Holtz. Klein-Asien (Smyrna). Caspisches Meer. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 414. — N. V. D. t. 248. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 83. f. 1. a—e. — Bäd. t. 24. f. 1. —

Gm. L. S. p. 603. n. 8. — Pall. Nov. Com. Petr. XIV. 1. p. 583. — Pall. Zoogr. II. p. 332. n. 390. — Lath. Ind. Orn. II. p. 803. n. 1. — Temm. Man. II. p. 733. — Penn. Arct. Zool. II. p. 526. — Bechst. Nat. D. IV. p. 674. — M. u. W. II. p. 457. — Br. Lehrb. p. 680. — p. 681. — Schinz. p. 370. n. 2. — N. V. D. X. p. 18. — K. u. Bl. n. 480. — Schl. Rev. I. p. 128. — Rüpp. S. Ueb. n. 516. — Hartl. W. Afr. n. 714. — Schl. Mus. Stern. p. 13. — Degl. u. G. n. 452. — Br. Thierl. IV. p. 856. —

531. Sterna cantiaca. Gm.

Ostfriesland. Jütland. Dänemark. Schlesien. Sardinien: Salvadori. — [Ganz Europa. West-Afrika: Hartlaub.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 431. — Gould. t. 415. — N. V. D. t. 250. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 83. f. 3. a—h. — Bäd. t. 24. f. 2. —

Gm. L. S. p. 606. n. 15. — p. 604. n. 9. — p. 605. n. 12. — p. 609. n. 24. — Lath. Ind. Orn. II. p. 805. n. 5. — p. 803. n. 10. — p. 807. n. 11. — Temm. Man. II. p. 735. — Bechst. Nat. D. IV. p. 679. — M. u. W. II. p. 458. — Br. Lehrb. p. 685. — Schinz. p. 371. — N. V. D. X. p. 50. — K. u. Bl. n. 485. — Schl. Rev. I. p. 129. — Schl. Mus. Stern. p. 5. — Hartl. W. Afr. n. 719. — Degl. u. G. n. 454. —

532. Sterna affinis. Rüpp.

Afrika. (Rothes Meer.) — [Indischer Archipelagus. Auf Sicilien nach Schlegel, und in Griechenland nach Degland und Gerbe vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 14. —
2) Eier: Bäd. t. 79. f. 3. —

Hors. Lin. Trans. XIII. p. 199. n. 3. — Schinz. p. 372. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 129. — Schl. Mus. Stern. p. 6. — Rüpp. S. Ueb. n. 518. — Rüpp. Atl. p. 23. — Degl. u. G. n. 455. —

533. Sterna anglica. Mont.

Dänemark. Nord-West-Jütland: Kjärbölling. Griechenland. Krim. Klein-Asien (Smyrna). — [Süd- und Mittel-Europa. Nord-Afrika. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 430. — Gould. t. 416. — N. V. D. t. 249. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 82. f. 7. a—i. — Bäd. t. 24. f. 3. —

Montagu Orn. Dict. Suppl. — Wils. Am Orn. VIII. p. 143. — Temm. Man. II. p. 744. — Bp. List. B. p. 61. — M. u. W. III. p. 188. — Br. Lehrb. p. 682. — p. 988. — Schinz. p. 374. n. 1. — N. V. D. X. p. 38. — K. u. Bl. n. 486. — Schl Rev. I. p. 130. — Schl. Mus. Stern. p. 34. — Rüpp. S. Ueb. n. 515. — Degl. u. G. n. 453. —

534. Sterna Bergei. Licht.

Afrika (Rothes Meer). — Zeigt sich dann und wann auf den Inseln des Mittelländischen Meeres: Degland und Gerbe.]

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 13. —

2) Eier: Bäd. t. 79. f. 4. —

Licht. Doubl. p. 80. — Less. Tr. d'Orn. p. 623. — Schinz. p. 376. n. 2. — Schl. Rev. II. p. 115. — Schl. Mus. Stern. p. 11. — Bp. Catal. p. 77. n. 485. — Rüpp. S. Ueb. n. 517. — Degl. u. G. n. 456. —

535. Sterna Dougalli. Mont.

Nord-Amerika. Bermuda-Inseln.: Hurdis. — [Wurde einige Male in Gross-Britannien erlegt. Je einmal in Holstein und in Dänemark: Kjärbölling.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 418. — N. V. D. t. 251. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 85. f. 2. a—d. —

Montag. Orn. Dict. suppl. — Temm. Man. II. p. 738. — M. u. W. III. p. 187. — Br. Lehrb. p. 688. — Schinz. p. 372. n. 2. — N. V. D. X. p. 78. — K. u. Bl. n. 484. — Schl. Rev. I. p. 130. — Schl. Mus. Stern. p. 24. — Degl. u. G. n. 459. —

536. Sterna paradisea. Brünn.

Küsten Nord- und Mittel-Europas. Nord-Amerika. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. —

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 424. — Gould. t. 419. — N. V. D. t. 253. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 182. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 84. f. 2. a—m. — Bäd. t. 7. f. 2. —

Brünn. Orn. bor. p. 46. — Naum. Isis. 1819. XII. p. 1847. — Temm. Man. II. p. 742. — Br. Beitr. III. p. 692. — M. u. W. III. p. 187. — Br. Lehrb. p. 689. — Schinz. p. 373. n. 2. — N. V. D. X. p. 114. — K. u. Bl. n. 482. — Schl. Rev. I. p. 129. — Schl. Mus. Stern. p. 15. n. 2. — Degl. u. G. n. 458. —

537. Sterna hirundo. L.

Ganz Europa. Klein-Asien. — [Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 417. — N. V. D. t. 252. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 84. f. 1. a—m. — Bäd. t. 7. f. 1. —

L. S. XII. p. 227. n. 2. — Lath. Ind. Orn. II. p. 807. n. 15. — Temm. Man. II. p. 740. — Bechst. Nat. D. IV. p. 682. — M. u. W. II. p. 459. — Br. Lehrb. p. 688. — Schinz. p. 373. n. 1. — N. V. D. X. p. 89. — K. u. Bl. n. 481. — Schl. Rev. I. p. 129. — Schl. Mus. Stern. p. 17. — Rüpp. S. Ueb. n. 511. — Degl. u. G. n. 457. — Br. Thierl. IV. p. 858. —

538. Sterna minuta. L.

Oldenburg: von Negelein. Dänemark: Kjärbölling. Schleswig. Holstein. Mecklenburg. Pommern. Rügen. Hiddensee. Anhalt (an der Elbe). Mark Brandenburg (an der Oder). Balearen: A. von Homeyer. Sardinien: Salvadori. Griechenland. Süd-Russland (Kiew, Sarepta, Krim). Klein-Asien. — [Ganz Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 996. — Gould. t. 420. — N. V. D. t. 254. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 85. f. 3. a—f. — Bäd. t. 7. f. 3. —

L. S. XII. p. 228. n. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 809. n. 19. — n. 22. — Temm. Man. II. p. 752. — Bechst. Nat. D. IV. p. 699. — M. u. W. II. p. 463. — Br. Lehrb. p. 692. — Schinz. p. 376. — N. V. D. X. p. 145. — K. u. Bl. n. 483. — Schl. Rev. I. p. 130. — Schl. Mus. Stern. p. 21. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 521. — Degl. u. G. n. 460. — Br. Thierl. IV. p. 860. —

539. Sterna hybrida. Pall.

Ungarn. Süd-Russland (Sarepta). Einmal (1854) in Baiern: Jäckel. — [Ganz Süd-Europa; aber im Westen nur sehr selten. Verfliegt sich bis Schleswig: Kjärbölling. Afrika. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 424. — N. V. D. t. 255. f. 1—4. —
2) Eier: Thien. t. 85. f. 1. a—f. Zu grün. — Bäd. t. 23. f. 1. —

Natt. Temm Man. II. p. 746. — Pall. Zoogr. II. p. 338. n. 395. — M. u. W. III. p. 189. — Br. Beitr. III. p. 92. — Br. Lehrb. p. 694. — Schinz. p. 374. n. 2. — N. V. D. X. p. 168. — K. u. Bl. n. 487. — Schl. Rev. I. p. 131. — Schl. Mus. Stern. p. 32. — Rüpp. S. Ueb. n. 513. — n. 512. = St. nilotica Rüpp. — Degl. u. G. n. 464. —

540. Sterna nigra. L.

Ungarn. Süd-Russland (Sarepta). — [Süd-Ost-Europa. Hat sich schon öfter bis nach Deutschland verflogen. Nach Nilson einmal in Schweden erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 423. — N. V. D. t. 257. f. 1—4. — Gray Gen. B. II. f. 2. —
2) Eier: Thien. t. 85. f. 4. a—f. — Bäd. t. 32. f. 2. —

L. S. XII. p. 227. n. 3. — Temm. Man. II. p. 747. — Meissn. u. Schinz. p. 264. n. 238. — M. u. W. III. p. 190. — Br. Lehrb. p. 697. — Schinz. p. 375. f. 1. — N. V. D. X. p. 215. — K. u. Bl. n. 488. — Schl. Rev. I. p. 131. Schl. Mus. Stern. p. 31. — Degl. u. G. n. 463. — Br. Thierl. IV. p. 862. —

541. Sterna fissipes. L.

Oldenburg: von Negelein. Dänemark, häufig: Kjärbölling. Schleswig. Bremer Marsch. Gothland. Pommern. Baiern: Jäckel. Balearen: A. von Homeyer. Sardinien (?): Salvadori. Ungarn. Süd-Russland (Kiew). — [Ganz Süd- und Mittel-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Aubub. B. Am. t. 438. — Buff. pl. enl. 333. — t. 924. Gould. t. 422. — N. V. D. t. 256. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 85. f. 5. a—f. — Bäd. t. 32. f. 3. —

L. S. XII. p. 228. n. 7. — Briss. Orn. VI. p. 211. n. 11. — p. 216. n. 6. — Pall. Zoogr. II. p. 337. n. 394. — Lath. Ind. Orn. II. p. 810. n. 23. — Temm. Man. II. p. 749. — Penn. Arct. Zool. p. 450. — Bechst. Nat. D. IV. p. 693. — n. 697. — M. u. W. II. p. 461. — Br. Lehrb. p. 695. — Schinz. p. 375. n. 2. — N. V. D. X. p. 189. — K. u. Bl. n. 489. — Schl. Rev. I. p. 130. — Schl. Mus. Stern. p. 29. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 514. — Hartl. W. Afr. n. 724. — Degl. u. G. n. 462. — Br. Thierl. IV. p. 861. —

542. Anous fuliginosus. (Gm.)

Nord-Amerika. Insel Ascension. — [Hat sich schon nach Deutschland (Magdeburg) verirrt.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 432. — Wils. Am. Orn. t. 72. f. 7. — Schl. Faun. Jap. t. 89. — N. V. D. t. 387. —

2) Eier: Thien. t. 82. f. 5. — Bäd. t. 32. f. 5. —

Gm. L. S. p. 605. n. 11. — Wils. Am. Orn. VIII. p. 145. — Wils. u. Bp Nat. Hist. III. p. 160. — Schl. Mus. Stern. p. 25. — Hartl. W. Afr. n. 718. — N. V. D. XIII. p. 267. — Degl. u. G. n. 461. —

543. Anous stolidus. Leach.

Nord-Amerika. — [Wurde nach Schlegel in England und im Mittelländischen Meere, nach Degland und Gerbe in Frankreich beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 440. — Buff. pl. enl. 997. — Gould. t. 421. — Gray Gen. B. II. t. 182. f. 4. —

2) Eier: Thien. t. 82. f. 4. — Bäd. t. 32. f. 4. —

L. S. XII. p. 227. n. 1. — Briss. Orn. VI. p. 199. — Shaw. Zool. XIII. p. 140. — Gray Gen. B. p. 100. — Schinz. p. 377. — K. u. Bl. n. 490. — Schl. Rev. I. p. 131. — Schl. Mus. Stern. p. 36. — Degl. u. G. n. 451. — Br. Thierl. IV. p. 865. —

544. Larus Rossi. Richards.

Nord-Amerika. — [Von Gätke auf Helgoland erlegt: (Februar 1858.)

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 388. f. 3—4. — Jard. u. Selby. t. 14. — Gray Gen. B. II. t. 180. f. 4. —

2) Eier:

Richards. Parry II. Voy. app. p. 359. — Bp. List. B. p. 62. — K. u. Bl. n. 462. — Schl. Rev. I. p. 138. — Bp. Consp. II. Gen. 211. n. 1. — N. V. D. XIII. p. 270. — Degl. u. G. n. 432. — Br. Thierl. IV. p. 885. —

N. 1858. p. 421. — Cab. Journ. 1855. p. 278. n. 1. — 1860. Beil. VIII. p. 65. —

545. Larus Sabinei. Leach.

Nord-Amerika. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Grönland. Im October 1847 auf Helgoland vorgekommen. Nach Blasius in England, Irland, Frankreich, Holland, am Rhein, in Westphalen und in der Schweiz beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 441. — Trans. Linn. Soc. XII. t. 29. — Gould. t. 429. — N. V. D. t. 388. f. 1—2. — Gray Gen. B. II. t. 180. f. 3. — Midd. Sib. Reise II t. 24. f. 5 (pull.) —

2) Eier: Midd. Sib. Reise II. t. 25. f. 1. — Thien. t. 99. f. 26. a b. (?)

Sabine Trans. Linn. Soc. XII. p. 250. — Leach., Ross. I. Voy. app. p. 57. — Richards. Faun. bor. Am. p. 428 n. n. 193. — Br. Lehrb. p. 699. — Schinz. p. 386. n. 2. — N. V. D. XIII. p. 272. — K. u. Bl. n. 463. — Schl. Rev. I. p. 128. — Schl. Mus. Larid. p. 44. n. 2. — Midd. Sib. Reise II. p. 244. —

546. Larus leucophthalmus. Licht.

Nord-Ost-Afrika. — [Griechenland: Schlegel.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 366. —

2) Eier:

Temm. Man. III. p. 486. — Schinz. p. 381. n. 1. — Schl. Rev. I. p. 126. — Schl. Mus. Larid. p. 39. — Rüpp. S. Ueb. n. 507. — Degl. u. G. n. 443. Cab. Journ. 1855. p. 278. n. 2. — Peterm. Geogr. Mitth. 1861. p. 29.

547. Larus atricilla. L.

Nord-Amerika. — [Gross-Britannien: Blasius. Frankreich: Degland und Gerbe.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 443. — Wils. Am. Orn. t. 74. f. 4. — Gould. t. 426. —

2) Eier: Bäd. t. 72. f. 21. —

L. S. XII. p. 225. n. 8. — Br. Lehrb. p. 722. — Schinz. p. 382. n. 2. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 161. — K. u. Bl. n. 473. — Temm. Man. II. p. 779. — Schl. Rev. I. p. 132. — II. p. 142. — Schl. Mus. Larid. p. 44. n. 1. — Degl. u. G. n. 444. —

548. Larus ridibundus. L.

Ganz Süd- und Mittel-Europa. Süd-Schweden. Nord-Afrika: A. Brehm. Asien. —

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 969—970. — Gould. t. 425. — N. V. D. t. 260. f. 1—5 —

2) Eier: Thien. t. 87. f. 2. a—k. — Bäd. t. 72. f. 3. —

L. S. XII. p. 225. n. 9. — Gm. L. S. p. 597. n. 4. — Pall. Zoogr. II. p. 324. n. 383. — p. 327. n. 385. — Boie. Isis. 1822. p. 563. — M. u. W. II. p. 482. (part.) — Br. Lehrb. p. 723. — Schinz. p. 383. — N. V D. X. p. 264. — K. u. Bl. n. 467. (part.) — Schl. Rev. I. p. 126. — Schl. Mus. Larid. p. 37. (part.) — Rüpp. S. Ueb. n. 508. — Degl. u. G. n. 446. (part.) — Br. Thierl. IV. p. 876. —

549. Var. Larus capistratus. Temm.

Die Verbreitung ist die nämliche wie die der Stammart. —

Abbild. 1) Vogel: Bp. Faun. Jap. t. 46. f. 1. —

2) Eier:

Temm. Man. II. p. 785. — M. u. W. II. p. 482. (part.) — Br. Lehrb. p. 725. — Schinz. p. 384. n. 1. — N. V. D. X. p. 265. Anmerk. — K. u. Bl. n. 467. (part.) — Schl. Rev. I. p. 127. — II. p. 113. — Schl. Mus. Larid. p. 37. (part.) — Degl. u. G. n. 446. (part.) —

550. Larus Bonapartei. Richards.

Nord-Amerika. — [Im Februar 1848 in England geschossen: Degland und Gerbe.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 442. — Richards. Faun. bor. t. 72.

2) Eier:

Richards. Faun. bor. II. p. 425. — Schl. Mus. Larid. p. 41. — Baird. u. Cass. p. 852. — Degl. u. G. n. 448. —

Cab. Journ. 1865. p. 371. —

551. Larus melanocephalus. Natt.

Italien (Venedig): Bädecker. Klein-Asien. — [Süd-Europa, im äussersten Westen fehlend.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 427. — N. V. D. t. 259. f. 1—3. — Bp. Faun. Ital. t. 47. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 87. f. 4. Falsch. — Bäd. t. 72. f. 4. —

Natt. Temm. Man. II. p. 777. — M. u. W. II. p. 201. — Br. Lehrb. p. 721. — Schinz. p. 382. n. 1. — N. V. D. X. p. 254. — XIII. p. 276. — K. u. Bl. n. 465. — Schl. Rev. I. p. 127. — Schl. Mus. Larid. d. 43. — Degl. u. G. n. 447. —

552. Larus minutus. Pall.

Russland (Nowaja-Ladoga). — [Scheint in Europa nur im Westen nicht vorzukommen. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 428. — N. V. D. t. 258. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 87. f. 4. a—e. — Bäd. t. 72. f. 5. —

Pall. It. III. p. 702. n. 35. — Gm. L. S. p. 595. n. 12. — Lath. Ind. Orn. II. p. 813. n. 5. — Pall. Zoogr. II. p. 331. n. 389. — Temm. Man. II. p.

787. — M. u. W. II. p. 488. — III. p. 205. Br. Lehrb. p. 727. — Schinz. p. 386. n. 1. — N. V. D. X. p. 242. — XIII. p. 275 = Fortpflanzung. — K. u. Bl. n. 464. = Schl. Rev. I. p. 127. — Schl. Mus. Larid. p. 42. n. 2. — Degl. u. G. n. 449. —

553. Larus ichtyaëtos. Pall.

Süd-Russland (Krim). Caspisches Meer (Astrachan). — [Süd-Ost-Europa. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 435. —

2) Eier: Thien. t. 87. f. 1. a—c. — c. unkenntlich. —

Pall. It. II. app. p. 713. n. 27. — Pall. Zoogr. II. p. 322. n. 382. — Br. Lehrb. p. 720. — Schinz. p. 378. n. 3. — K. u. Bl. n. 466. — Schl. Rev. I. p. 128. — Schl. Mus. Larid. p. 34. — Rüpp. S. Ueb. n. 506. — Degl. u. G. n. 445. —

554. Larus tridactylus. L.

Grönland. Island. Spitzbergen. Faröer. Shetlands-Inseln. Orkney-Inseln. Norwegen. Ostfinnmarken (Vardö). Nord-Amerika (Labrador). — [Ganz Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 444. — Buff. pl. enl. 253. — t. 387. — Gould. t. 435. — N. V. D. t. 262. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 180. f. 6.

2) Eier: Thien. t. 90. f. 1. a—h. — Bäd. t. 40. f. 2. —

L. S. XII. p. 224. n. 2. — Brünn. Orn. bor. n. 140. — Pall. Zoogr. II. p. 328. n. 386. — p. 329. n. 387. — p. 330. n. 388. — Lath. Ind. Orn. II. p. 817. n. 11. — Briss Orn. VI. p. 185. n. 11 — Temm. Man. II. p. 774. — Bechst. Nat. D. IV. p. 628. — M. u. W. II. p. 486. — Br. Lehrb. p. 705. — Schinz. p. 385. — N. V. D. X. p. 322. — K. u. Bl. n. 469. — Schl. Rev. I. p. 126. — Schl. Mus. Larid. p. 30. — Bp. Consp. II. Gen. 207. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 712. — Degl. u. G. n. 442. — Br. Thierl. IV. p. 874. —

555. Larus gelastes. Licht.

Afrika (Rothes Meer). — [Süd-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Bp. Faun. Ital. t. 45. f. 1. — Bullet. Soc. Imp. osc. 1854. II. t. 4. — Cab. Journ. 1855. t. 4. f. 10. —

2) Eier: Thien. t. 90. f. 4. — Bäd. t. 72. f. 1. —

Guérin. Rev. Zool. 1839. p. 321. — Temm. Man. IV. p. 478. — Schinz. p. 381. n. 2. — K. u. Bl. n. 468. — Schl. Rev. I. p. 127. — Schl. Mus. Larid. p. 28. n. 1. — Bp. Consp. II. Gen. 207. u. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 509. — Hartl. W. Afr. n. 711. — Degl. u. G n. 440. —

Cab. Journ. 1853. p. 102. n. 24. — 1855. p. 26. n 43. —

556. Larus canus. L.

Ganz Nord-Europa. Nord- und Ostseeküsten. — [Ganz Europa, im Süden selten. Sibirien.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 977. — Gould. t. 437. — N. V. D. t. 261. f. 1—4. — Cab. Journ. 1855. t. 4. n. 7. = L. Heinei. v. Hom. —

2) Eier: Thien. t. 90. f. a—f. — Bäd. t. 39. f. 3. —

L. S. XII. p. 224. n. 3. — Gm. L. S. p. 596. n. 3. — n. 13. — Briss. Orn. VI. p. 182. n. 10. — p. 189. n. 12. — Temm. Man. II. p. 771. — Penn. Arct. Zool. II. p. 530. — Bechst. Nat. D. IV. p. 645. — M. u. W. II. p. 480. — p. 475. — Br. Lehrb. p. 707. — Schinz. p. 384. n. 3. — N. V. D. X. p. 301. — K. u. Bl. n. 475. — Schl. Rev. I. p. 125. — Bp. Consp. II. Gen. 206. n. 1. — n. 2. — Schl. Mus. Larid. p. 23. — p. 26. — Degl. u. Gerbe n. 441. — n. 441. A. = L. Heinei. —

N. 1853. p. 129. = L. Heinei. — 1856. p. 479. — Cab. Journ. 1855. p. 283., p. 1859. p. 155., 1865. p. 380. = L. Heinei. —

557. Larus Audouini. Payr.

Das Brutvaterland ist mir nicht bekannt. Gewöhnlich findet man das Mittelmeer als Heimath angegeben, doch dürfte sie schwerlich in Europa brüten. — [A. von Homeyer sah sie auf den Balearen.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 480. — Gould. t. 438. —

2) Eier: Thien. t. 88. f. 3. (?) —

Payr. Ann. Soc. Nat. VIII. 1826. Août. p. 460. — Schinz. p. 380. n. 3. — K. u. Bl. n. 474. — Schl. Rev. I. p. 125. — Schl. Mus. Lavid. p. 22. — Bp. Consp. I. Gen. 205. n. 1. — Degl. u. G. n. 439. —

Cab. Journ. 1855. p. 282. n. 29. —

558. Larus argentatus. Brünn.

Küsten ganz Europas. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. Nord-Amerika. — [Ganz Europa, auch im Binnenlande. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 448. — Buff. pl. enl. 253. — Gould. t. 434. — Gray. Gen. B. II. t. 180. f. 5. — N. V. D. t. 266. f. 1—5. —

2) Eier: Thien. t. 89. f. 4. a—i. — Bäd. t. 40. f. 1. —

Brünn. Orn. bor. p. 44. n. 149. — Gm. L. S. p. 600. n. 18. — Briss. Orn. VI. p. 160. n. 2. — Temm. Man. II. p. 764. — Penn. Arct. Zool. II. p. 533. c. — Lath. Ind. Orn. II. p. 814. n. 6. — Bechst. Nat. D. IV. p. 658. — M. u. W. II. p. 471. n. 3. — III. p. 195. — Br. Lehrb. p. 710—713. Schinz. p. 379. n. 2. — N. V. D. X. p. 379. — K. u. Bl. n. 476. — Schl. Rev. I. p. 124. — II. p. 112. — Schl. Mus. Larid. p. 16. — Bp. Consp. II. Gen. 203. n. 1—3. — Hartl. W. Afr. n. 709. — Degl. u. G. n. 438. — Br. Thierl. IV. p. 870. —

N. 1856. p. 483. — Cab. Journ. 1855. p. 282. —

559. Var. (?) Larus leucophaeus. Licht.

Mittelländisches und Schwarzes Meer. — [Algerien.]

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier: Thien. t. 89. f. 1. a—c. — Bäd. t. 79. f. 2. —

Pall. Zoogr. II. p. 318. n. 377. (?) — Bruch. Isis. 1832. p. 1107. — Schinz. p. 380. n. 1. — K. u. Bl. n. 477. — Schl. Rev. I. p. 124. — Schl. Mus. Larid. p. 16. — Bp. Consp. II. Gen. 204. n. 3. —

560. Larus fuscus. L.

Faröer. Orkney-Inseln. Schweden. Gothland. — [Ganz Europa. Klein Asien. Insel Rhodus. Nord-Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 990. — Gould. t. 431. — N. V. D. t. 267. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 88. f. 4. a—f. — Bäd. t. 62. f. 2. —

L. S. XII. p. 225. n. 7. — Gm. L. S. p. 599. n. 7. — Lath. Ind. Orn. II. p. 815. n. 8. — Temm. Man. II. p. 767. — Penn. Arct. Zool. II. p. 527. n. 452. — Bechst. Nat. D. IV. p. 658. — M. u. W. II. p. 469. — Br. Lehrb. p. 717. — Schinz. p. 380. n. 2. — N. V. D. X. p. 419. — K. u. Bl. n. 478. — Schl. Rev. I. p. 124. — Schl. Mus. Larid. p. 14. — Bp. Consp. II. Gen. 204. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 505. — Degl. u. G. n. 437. — Br. Thierl. IV. p. 870. —

Cab. Journ. 1855. p. 281. n. 15. —

561. Larus glaucus. Brünn.

Spitzbergen. Grönland. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. Nord-Amerika (Labrador). — [Nord- und Mittel-Europa. Selten in Süd-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 449. — Gould. t. 432. — N. V. D. t. 264. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 91. f. 1. a—d. — Bäd. t. 39. f. 1. — Midd. Sib. Reise II. t. 24. f. 3. —

Brünn. Orn. bor. p. 44. n. 148. — Gm. L. S. p. 600. n. 17. — Lath. Ind. Orn. II. p. 814. n. 7. — Temm. Man. II. p. 757. — Penn. Arct. Zool. II. p. 532. — Bechst. Nat. D. IV. p. 662. — M. u. W. III. p. 191. — Br. Lehrb. p. 729. — p. 731. — Schinz. p. 378. n. 1. — N. V. D. X. p. 350. — K. u. Bl. n. 472. — Schl. Rev. I. p. 125. — Schl. Mus. Larid. p. 4. — Bp. Consp. II. Gen. 202. n. 1. — Midd. Sib. Reise II. p. 241. Degl. u. G. n. 434. — Br. Thierl. IV. p. 870. —

Cab. Journ. 1855. p. 281. n. 18. —

562. Larus leucopterus. Faber.

Grönland. — [Nord- und Mittel-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 447. — Gould. t. 433. — N. V. D. t. 265. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 91. f. 2. a—h. — Bäd. t. 39. f. 2. —

Faber Prodr. Isl. Orn. p. 91. n. 2. — Linn. Trans. XII. p. 546. — Mem. Wern. Soc. IV. p. 506. — V. p. 268. — M. u. W. III. p. 197. — Br. Lehrb. p. 715. — Br. Beitr. It. p. 817. — Br. Nat. V. D. p. 744. — Schinz. p. 378. n. 2. — N. V. D. X. p. 367. — K. u. Bl. n. 471. — Schl. Rev. I. p. 125. — Schl. Mus. Larid. p. 5. — Bp. Consp. II. Gen. 205. n. 5. — Degl. u. G. n. 435. — Br. Thierl. IV. p. 870. —

Cab. Journ. 1855. p. 221. n. 20. —

563. Larus marinus. L.

Grönland. Island. Faröer. Schweden (Hartsoe). Loffoden: Barth. Oldenburg: von Negelein. Dänemark: Kjärbölling. Gothland, selten. Frankreich: Degland u. Gerbe. — [Ganz Europa; aber im Süden selten. Nord-Afrika, einzeln.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 450. — Buff. pl. enl. 266. — Gould. t. 430. — N. V. D. t. 268. — t. 269. —

2) Eier: Thien. t. 88. f. 1. a—d. — Bäd. t. 62. f. 1. —

L. S. XII. p 225. n. 6. — Gm. L. S. p. 598. n. 6. — Brünn. Orn. bor. n. 145. — Lath. Ind. Orn. II. p. 813. n. 6. — Temm. Man. II. p. 150. — Penn. Arct. Zool. II. p. 453. — p. 527. n. 451. — Bechst. Nat. D. IV. p. 653. — M. u. W. II. p. 465. — Br. Lehrb. p. 733. — p. 735. — Schinz. p. 379. n. 1. — N. V. D. X. p. 438. — K. u. Bl. n. 479. — Schl. Rev. I. p. 124. — Schl. Mus. Larid. p. 10. — Bp. Consp. II. Gen. 201. n. 1. — Rüpp. S. Ueb. n. 503. — Degl. u. G. n. 436. — Br. Thierl. IV. p. 870. —

Cab. Journ. 1855. p. 281. —

564. Larus eburneus. Gm.

Spitzbergen. Grönland. Labrador. — [Ganz Nord-Europa. Dänemark: Kjärbölling. Pommern: Th. Holland.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 445. — Buff. pl. enl. 994. — Gould. t. 436. — N. V. D. t. 263. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 180. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 90. f. 2. a b c. —

Gm. L. S. p. 596. n. 14. — Lath. Ind. Orn. II. p. 816. n. 10. — Temm. Man. II. p. 769. — Fabr. Faun. Grönl. p. 103. n. 67. — Penn. Arct. Zool. II. p. 457. — M. u. W. III. p. 200. — Br. Lehrb. p. 703. — Schinz. p. 384. n. 2. — N. V. D. X. p. 341. — K. u. Bl. n. 470. — Schl. Rev. I. p. 126. — Bp. Consp. II. Gen. 210. n. 1—2. — Schl. Mus. Larid. p. 6. — Degl. u. G. n. 433. — Br. Thierl. IV. p. 872. —

565. Lestris catarrhactes. Ill.

Grönland. Island. Faröer. — [Küsten Nord- und Mittel-Europa's. Selten im Binnenlande.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 439. — N. V. D. t. 270. —

2) Eier: Thien t. 84. f. 1. a—d. — Bäd. t. 64. f. 4. —

L. S. XII. p. 226. n. 11. — Illig. Prodrom. p. 273. — Temm. Man. Orn. II. p. 792. — Brünn. Orn. bor. p. 33. n. 125. — Penn. Arct. Zool. II. p. 531. n. 460. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 102. — M. u. W. III. p. 207. — Br. Lehrb. p. 739. — Br. Nat. V. D. p. 715—716 — Schinz. p. 387. — N. V. D. X. p. 470. — K. u. Bl. n. 458. — Schl. Rev. I. p. 134 — Schl. Mus. Larid. p. 45. — Bp. Consp. II. Gen. 196. n. 1. — Degl. u. G. n. 428. — Br. Thierl. IV. p. 880. —

566. Lestris pomarina. Temm.

Grönland. Sibirien (Taimyrfluss): von Middendorff. — [Verfliegt sich bis Süd-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. P. Am. t. 451. — Gould. t. 440. — N. V. D. t. 271. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 84. f. 2. a—d. — Bäd. t. 64. f. 1. — Midd. Sib. Reise II. t. 24. f. 1. —

Pall. Zoogr. II. p. 312. — Temm. Man. II. p. 793. — M. u. W. II. p. 490. — III. p. 210. n. 2. — Br. Lehrb. p. 741. — Br. Nat. V. D. p. 718. — N. V. D. X. p. 487. — K. u. Bl. n. 459. — Schl. Rev. I. p. 134. — Schl. Mus. Larid. p. 47. n. 1. — Bp. Consp. II. Gen. 197. n. 1. — Midd. Sib. Reise II. p. 240. — Degl. u. G. n. 429. —

567. Lestris parasitica. III.

Grönland. Island. Spitzbergen. Faröer. Sibirien (Taimyrfluss und Boganída): von Middendorff. — [Ganz Europa. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 452. — Buff. pl. enl. 991. — Gould. t. 441. — N. V. D. t. 272. — t. 273. — Gray. Gen. B. II. t. 180. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 86. f. 3. a—f. — Bäd. t. 64. f. 2. —

Gm. L. S. p. 601. n. 10. — Brünn. Orn. bor. p. 36. n. 126. — Lath. Ind. Orn. II. p. 819. n. 15. — n. 14. — Temm. Man. II. p. 796. — Briss. Orn. VI. p. 150 n. 1. — Penn. Arct. Zool. II. p. 531. n. 460. — Bechst. Nat. D. IV. p. 665. — M. u. W. III. p. 214. n. 4. — Br. Beitr. III. p. 853. — Br. Lehrb. p. 744. — p. 995. — Br. Nat. V. D. p. 719—723. — N. V. D. X. p. 506. — K. u. Bl. n. 461. — Schl. Rev. I. p. 135. — Schl. Mus. Larid. p. 47. n. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 197. n. 2. — n. 3. — Degl. u. G. n. 430. — Br. Thierl. IV. p. 883. —

568. Lestris Buffoni. Boie.

Spitzbergen. Lappland. Sibirien (Taimyrfluss und Boganída, häufig): von Middendorff. — [Grönland. Nord-Amerika. Oefter in Mittel-Europa beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 453. — N. V. D. t. 274. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 68. f. 4. a—d. — Bäd. t. 64. f. 3. — Midd. Sib. Reise II. t. 24. f. 2. —

M. u. W. III. p. 212. — Briss. Orn. VI. p. 155. n. 3. — Br. Beitr. III. p. 861. — Br. Lehrb. p. 747. — Schinz. p. 391. n. 1. — n. 2. — N. V. D. X. p. 534. — K. u. Bl. n. 460. — Schl. Rev. I. p. 135. — II. p. 116. — Schl. Mus. Larid. p. 49. — Bp. Consp. II. Gen. 197. n. 3. — Degl. u. G. n. 431.

569. Diomedea exulans. L.

Insel Auckland: Cornick. Prinz Edwards-Insel: Hutton. Erfrischungs-Inseln (Tristan d'Acunha): Earle. — [Südliche Meere beider Welten. Hat sich einige Male nach Europa verflogen. So z. B. 1833 bei Antwerpen erlegt: Drapiez.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 237. — Gould. Austr. VII. t. 38. — Rchb. f. 801—802. —

2) Eier: Thien. t. 92. f. 1. — Bäd. t. 80. f. 2. —

L. S. XII. p. 214. n. 1. — Gm. L. S. p. 567. — Briss. Orn. VI. p. 126. — Pall. Spic. Zool. V. p. 28. — Penn. Arct. Zool. II. p. 506. n. 413. — Steph. Shaw. Zool. XIII. p. 259. — Schl. Rev. II. p. 111. — Schl. Mus. Proc. p. 31. — Bp. Consp. II. Gen. 172. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 708. — N. V. D. XIII. p. 278. — Degl. u. G. n. 413. — Br. Thierl. IV. p. 886. —

570. Diomedea chlororhynchus. L.

Neu-Seeland: Hutton. — [Südliche Meere beider Welten. Ist ebenfalls schon in Europa beobachtet worden. So z. B. bei Kongksberg in Norwegen im April 1837: Esmark.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 468. — Gould. Austr. VII. t. 42. — Rchb. f. 794—795. —

2) Eier:

Gm. L. S. p. 568. — Schl. Rev. II. p. 111. — Schl. Mus. Proc. p. 35. — Bp. Consp. II. Gen. 172. n. 8. — Degl. u. G. n. 414. — Br. Thierl. IV. p. 886. —

571. Ossifraga gigantea. Rchb.

Prinz Edwards-Insel: Hutton. — [Küsten und Inseln der südlichen Meere. Soll auf dem Rhein erlegt worden sein.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. Austr. VII. t. 45. — Rchb. f. 332. —

2) Eier: Thien. t. 92. f. 3. —

Gm. L. S. p. 563. n. 18. — Less. Tr. d'Orn. II. p. 611. — Schl. Mus. Proc. p. 18. n. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 173. — N. V. D. XIII. p. 282. — Br. Thierl. IV. p. 893. — Ibis 1869. p. 352. —

572. Procellaria glacialis. L.

Spitzbergen. Island. Grönland. Nord-Amerika (Davis-Strasse). — [Nord-Europa. Verfliegt sich bis zu den Deutschen Küsten.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 455. — Buff. pl. enl. 59. — Gould t. 446. — N. V. D. t. 276. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 178. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 92. f. 2. — Bäd. t. 55. f. 1. —

L. S. XII. p. 213. n. 3. — Gm. L. S. p. 562. n. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 823. n. 9. — Temm. Man. II. p. 802. — Penn. Arct. Zool. II. p. 534. n. 461. — Faber. Prodr. Isl. Orn. p. 107. — M. u. W. III. p. 217. — Br. Lehrb. p. 751. — Schinz. p. 393. n. 1. — N. V. D. X. p. 589. — K. u. Bl. n. 453. — Schl. Rev. I. p. 132. — Schl. Mus. Proc. p. 21. — p. 22. — Bp. Consp. II. Gen. 174. n. 1. — Degl. u. G. n. 415. — Br. Thierl. IV. p. 895. —

573. Procellaria capensis. L.

Tristan d'Acunha: Gould. Inseln der Peruanischen Küste: Tschudi. — [Soll in Frankreich vorgekommen sein.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 964. — Gould. Austr. VII. t. 53. — Rchb. f. 2300—2301. —

2) Eier:

L. S. XII. p. 213. — Briss. Orn. VI. p. 146. — Shaw. Zool. XIII. — Schl. Mus. Proc. p. 14. — Bp. Consp. II. Gen. 176. n. 1. — Baird. u. Cass. p. 828. — Degl. u. G. n. 416. — Br. Thierl. IV. p. 897. —

Ibis. 1863. p. 245. —

574. Procellaria diabolica. l'Herm.

Antillen. Guadalupe. Florida. — [In England und Frankreich beobachtet: Degland und Gerbe.]

Abbild. 1) Vogel: Temm. pl. col. 416. — Rchb. f. 336. —

2) Eier:

Kuhl. Procell. p. 142. n. 11. — Less. Tr. d'Orn. p. 611. — Schl. Mus. Proc. p. 13. n. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 177. n. 1. — Baird. u. Cass. p. 827. — Degl. u. G. n. 417. —

575. Procellaria leucocephalus. Forst.

Neu-Seeland: Hutton. — [Wird von Gloger in Keitel's Verzeichniss der Vögel Europa's mit aufgeführt.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. Austr. t. 49. —

2) Eier:

Ann. Sc. Nat. VII. — Bp. Consp. II. Gen. 177. n. 4. —

Cab. Journ. 1870. p. 373. n. 125. —

576. Thalassidroma pelagica. Vig.

Island. Faröer. Orkney-Inseln. — [An allen Europäischen Küsten. Dann und wann im Binnenlande. Algerien.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 461. — Gould. t. 447. f. 2. — N. V. D. t. 275. f. 1. — Gray. Gen. B. II. t. 178. f. 4. —

2) Eier: Thien. t. 92. f. 8. — Bäd. t. 55. f. 13. —

L. S. XII. p. 212. n. 1. — Gm. L. S. p. 561. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 826. n. 19. — Briss. Orn. VI. p. 140. n. 1. — Temm. Man. II. p. 810. — Penn. Arct. Zool. II. n. 464. — Bechst. Nat. D. IV. p. 704. — M. u. W. II. p. 495. — Br. Lehrb. p. 755. — Schinz. p. 396. n. 2. N. V. D. X. p. 557. — K. u. Bl. n. 450. — Schl. Rev. I. p. 133. — Schl. Mus. Proc. p. 7. — Bp. Consp. II. Gen. 187. n. 2. — Degl. u. G. n. 424. — Br. Thierl. IV. p. 901. —

577. Thalassidroma Bulweri. Gould.

Amerika. — [Wurde in England erlegt. Zeigt sich auf den Azoren und auf Madeira: du Bocage.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 448. — Jard. u. Selby Zool. illustr. t. 56. —

2) Eier: Bäd. t. 55. f. 4. —

Jard u. Selby Zool. illustr. II. p — Macgil. Brit. B. V. p. 449. — K. u. Bl. n. 449. — Schl. Rev. I. p. 134. — Schl. Mus. Proc. p. 9. n. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 184. — Degl. u. G. n. 427. —

578. Thalassidroma leucorhoa. Degl.

Insel St. Kilda: Brehm. Nord-Amerika (Labrador). — [Oefter in Portugal: du Bocage. Nord- und Ostsee, selten. Grönland: Prinz Max von Wied. Auch in Deutschland (Münster) beobachtet: Altum.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 459. — Gould. t. 447. f. 1. — N. V. D. t. 275. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 92. f. 9. — Bäd. t. 55. f. 2. —

Temm. Man. II. p. 812. — Bp. List. B. p. 64. — Pall. Zoogr. II. p. 316. — Br. Lehrb. p. 754. — Schinz. p. 397. n. 1. — N. V. D. X. p. 575. — — XIII. p. 277 = Fortpflanzung. — K. u. Bl. n. 451. — Schl. Rev. I. p. 133. — Schl. Mus. Proc. p. 3. n. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 186. n. 1. — Degl. u. G. n. 426. — Br. Thierl. IV. p. 901. —

579. Thalassidroma oceanica. Schinz.

Mittel Amerika. — [In England vorgekommen: Blasius.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 460. — Wils. Am. Orn. t. 60. f. 6. — Gould. t. 65. — Rchb. f. 2723—24. —

2) Eier:

Wils. Am. Orn. VII. p. 90. — Kuhl. Procell. p. 136. — Licht. Catal. p. 83. n. 764. Anmerk. — Bp. List. B. p. 64. n. 483. — Schinz. p. 397. n. 2—3. — Wils. u. Bp. Nat. Hist. III. p. 164. — K. u. Bl. n. 452. — Schl. Rev. I. p. 133. — II. p. 116. — Schl. Mus. Proc. p. 6. n. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 190. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 707. — Degl. u. G. n. 425. —

580. Nectris cinerea. Kuhl.

Balearen: A. von Homeyer. Cykladen. Canaren: Bolle. — [Mittelländisches Meer. Verfliegt sich bis Deutschland (Danzig: Borggreve).]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl enl. 962. — Gould. t. 445. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 92. f. 4. — Bäd. t. 55. f. 7. —

Gm. L. S. p. 563. n. 17. (part.) — Temm. Man. III. p. 806. — IV. p. 506. — Br. Lehrb. p. 897. (part.) — Schinz. p. 393. n. 2. — K. u. Bl. n. 454. (part). — Schl. Rev. I. p. 132. — Bp. Consp. II. Gen. 194. n. 1. — Degl. u. G. n. 418. —

Cab. Journ. 1863. p. 326. —

581. Nectris major. Glog.

Nord-Amerika. — [Faröer: Sysselmaand Müller. Wurde in England und in der Normandie erlegt.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 456. — Gould. t. 445. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 99. f. 28. — Bäd. t. 55. f. 5. —

Faber. Prodr. Isl. Orn. p. 56. n. 2. — Br. Lehrb. p. 897. (part.) — Schinz. p. 394. n. 2. — Schl. Rev. I. p. 132. — Schl. Mus. Proc. p. 27. — Bp. Consp. II. Gen. 193. n. 3. — Degl. u. G. n. 419. —

582. Nectris anglorum. Glog.

Island. Orkney-Inseln. Faröer. — [Selten an den Küsten Mittel Europa's.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 457. — Gould. t. 443. — N. V. D. t. 277. f. 1—2. — Gray. Gen. B. II. t. 178. f. 5. —

2) Eier: Thien. t. 99. f. 5. — Bäd. t. 55. f. 6. —

Faber. Prodr. Isl. Orn. p. 56. n. 1. — Temm. Man. II. p. 806. — Brünn. Orn. bor. p. 29. n. 119. — Briss Orn. VI. p. 131. — Penn Arct. Zool. II. p. 535. n. 462. - M. u. W. III. p. 220. n. 3. — Br. Lehrb. p. 898. — Schinz. p. 395. n. 1. — N. V. D. X. p. 618. — K. u. Bl. n. 455. — Schl. Rev. I. p. 132. — Bp. Consp. II. Gen. 194. n. 4. — Degl. u. G. n. 420. — Br. Thierl. IV. p. 904. —

Cab. Journ. 1863. p. 326. —

583. Nectris obscura. K. u. Bl.

Cykladen. Auf dem Tejo: du Bocage. — [Süd-Europa. Klein-Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 458. — Gould. t. 444. —

2) Eier: Bäd. Nachtr. zu t. 55.

Gm. L. S. p. 559. n. 7. — Kuhl. Procell. p. 148. n. 26. — Br. Lehrb. p. 900. — Schinz. p. 395. n. 2. — K. u. Bl. n. 456. — Schl. Rev. I. p. 133. — Schl. Mus. Proc. p. 30. — Bp. Consp. II. Gen. 194. n. 6. — Degl. u. G. n. 422. —

Cab. Journ. 1863. p. 326. —

584. Nectris Baroli. Glog.

Im Bosporus und an den Küsten des Schwarzen Meeres: Acerbi. — [Sardinien: Salvadori.]

Abbild. 1) Vogel:

2) Eier:

Acerb. Bibl. Ital. 1827. Agost. p. 294. — Bull. Sc. Nat XVI. 1829. p. 463. — Temm. Man. II. p. 808. — IV. p. 510. — Schl. Rev. II. p. 116. — Schl. Mus. Proc. p. 29. — Bp. Consp. II. Gen. 194. n. 5—7. — Degl. u. G. n. 421. —

Cab. Journ. 1865. p. 429. —

585. Nectris fuliginosa. K. u. Bl.

Nord-Amerika. — [Auf der Tees vorgekommen: Schlegel. In der der Normandie: Degland und Gerbe.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 445. f. 2. — Macgil. Brit. B. III. f. 88. —

2) Eier:

Stricl. Proceed. Zool. Soc. 1832. p. 129. — Temm. Man. IV. p. 508. — Macgil. Brit. p. III. p. 438. — Schinz. p. 395. n. 3. — K. u. Bl. n. 457. — Schl. Rev. I. p. 132. — Schl. Mus. Proc. p. 26. n. 1. — Bp. Consp. II. Gen. 193. n. 2—4. — Degl. u. G. n. 423. —

586. Phaëton aethereus. L.

Bermuda-Inseln: Hurdis. Bahama-Inseln: Wedderburn. — [Azoren. Canaren. Rothes Meer. Das Vorkommen in Europa (Helgoland) ist nicht genügend constatirt.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 998. — Rchb. f. 349. — Gray Gen. B. II. t. 183. f. 2. —

2) Eier: Thien. t. 95. f. 2. — Bäd. t. 38. f. 5. — Jard. Contrib. 1852. t. 84. f. 2. —

L. S. XII. p. 219. n. 1. — Briss. Orn. VI. p. 480. — Aldrov. Orn. XX. p. 544. — Willugb. Orn. p. 331. — Schl. Mus. Proc. p. 43. n. 1. — Bp. Consp. II. Gen. 169. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 727. — N. V. D. XIII. p. 284. — Degl. u. G. n. 412. — Br. Thierl IV. p. 909.

587. Sula bassana. Briss.

Island. Orkney-Inseln. Faröer. — [Capverden: Dohrn. Canaren: Bolle. West-Afrika: Hartlaub. Portugal, gemein: du Bocage. Oefter in Deutschland beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 425. — Buff. pl. enl. 278. — t. 987. — Gould. t. 412. — N. V. D. t. 278. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 185. f. 3.

2) Eier: Thien. t. 93. f. 4. — Bäd. t. 38. f. 3. —

L. S. XII. p. 217. n. 5. — Gm. L. S. p. 577. n. 5. — p. 579. n. 32. — Briss. Orn. VI. p. 503. n. 5. — Temm. Man. II. p. 905. — Lath. Ind. Orn. II. p. 891. n. 26. — Penn. Arct. Zool. II. p. 582. n. 510. — Bechst. Nat. D. IV. p. 765. — M. u. W. II. p. 582. — Br. Lehrb. p. 675. — Schinz. p. 369. — N. V. D. XI. p. 14. — K. u. Bl. n. 431. — Schl. Rev. I. p. 123. — Schl. Mus. Pelec. p. 37. — Bp. Consp. II. Gen. 156. n. 1. — Hartl. W. Afr. n. 729. Degl. u. G. n. 407. — Br. Thierl. IV. p. 911. —

588. Sula melanura. Temm.

Süd-Afrika. — [Soll auf Island vorgekommen sein: Schlegel. (?)]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 413. —

2) Eier: Thien. t. 93. f. 6. — Bäd. t. 54. f. 1. —

Temm. Man. IV. p. 569. — K. u. Bl. n. 431. Anmerk. — Schl. Rev. II. p. 111. — Schl. Mus. Pelec. p. 38. — Bp. Consp. II. Gen. 156. n. 2. — Baird. u. Cassin. p. 176. n. 239. — Proceed. Zool. Soc. 1860. p. 142. — N. 1851. p. 37. —

589. Tachypetes aquilus. Vieill.

Bahama-Inseln: Bryant. — [Tropen. Soll auf der Weser im Jahre 1792 erlegt worden sein: Bechstein. Nach Meyer und Wolf, so wie nach Schinz ebenfalls in Europa vorgekommen.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 421. — Buff. pl. enl. 961. — Gould. Austr. VII. t. 71. — Gray Gen. B. II. t. 185. f. 1. —

2) Eier: Thien. t. 93. f. 10. — Bäd. t. 38. f. 4. —

L. S. XII. p. 216. n. 2. — Briss. Orn. VI. p. 506. — M. u. W. II. p. 580. — Schinz. p. 370. n. 1. — Schl. Rev. II. p. 109. — Schl. Mus. Pelec. p. 2. — Bp. Consp. II. Gen. 158. n. 1. — N. V. D. XIII. p. 287. — Hartl. W. Afr. n. 736. — Degl. u. G. n. 411. — Br. Thierl. IV. p. 913. —

590. Halieus carbo. Ill.

Faröer. Loffoden: Barth. West- und Ost-Finnmarken: Wallengreen. Orkney-Inseln. Holland: Schlegel. Mecklenburg. Pommern. Bei Landsberg a/W.: Borggreve. Ungarn. Süd-Russland (Sarepta). Frankreich: Degland u. Gerbe. Sardinien: Salvadori. — [Ganz Europa mit Ausschluss des höchsten Nordens. Asien. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. A. Am. t. 415. — Buff. pl. enl. 927. — Gould. t. 407. — N. V. D. t. 279. f. 1—4. — Gray. Gen. B. II. t. 185. f. 2. —
2) Eier: Thien. t. 93. f. 1. — Bäd. t. 54. f. 2. —

L. S. XII. p. 216. n. 3. — Cuv. Règne an. I. p. 562. — Ill. Prodr. p. 279. — Temm. Man. I. p. 589. — II. p. 894. — Lath. Ind. Orn. II. p. 886. — Gessn. Av. p. 683. — Brünn. Orn. bor. p. 31. n. 120. — n. 122. — Penn. Arct. Zool. II. p. 581. n. 509. — Bechst. Nat. D. IV. p. 750. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 53. — M. u. W. II. p. 576. — Br. Lehrb. p. 903. — p. 906. — Schinz. p. 366. — N. V. D. XI. p. 52. — Schl. Rev. I. p. 122. — II. p. 110. — K. u. Bl. n. 423. — Schl. Mus. Pelec. p. 6. — Bp. Consp. II. Gen. 159. n. 4. — Rüpp. S. Ueb. n. 531. — Hartl. W. Afr. n. 733. — Degl. u. G. n. 408. — Br. Thierl. IV. p. 923. —

591. Halieus cristatus. Glog.

Orkney-Inseln. Faröer. Schetlands-Inseln. Westliches Norwegen: Wallengreen. Loffoden: Barth. — [Nord-Europa. Einzeln bis Süd-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 410. — N. V. D. t. 280. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 93. f. 2. — Bäd. t. 54. f. 2. —

L. S. XII. p. 217. n. 4. — Gm. L. S. p. 574. n. 4. — Pall. Zoogr. II. p. 299. n. 363. — Lath. Ind. Orn. II. p. 887. n. 15. — Temm. Man. II. p. 900. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 53. — Fabric. Faun. Grönl. n. 58. — Brünn. Orn. bor. p. 31. n. 123. — Penn. Arct. Zool. II. p. 581. n. 508. — p. 583 a. — Bechst. Nat. D. IV. p. 762. — M. u. W. II. p. 578. — Br. Lehrb. p. 908. — p. 910. — Schinz. p. 367. n. 2. — N. V. D. XI. p. 88. — K. u. Bl. n. 425. — Schl. Rev. I. p. 123. — II. p. 110. — Schl. Mus. Pelec. p. 18. n. 2. (part.) — Bp. Consp. II. Gen. 160. n. 1. — Degl. u. G. n. 409. —

592. Var. Haliens Desmaresti. Glog.

Mittelländisches Meer. —

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 411. — N. V. D. t. 280. f. 3: wird von Schlegel citirt. — Rchb. f. 2644. —
2) Eier:
Payr. Ann. Soc. Nat. 1826. p. 460. — Cara Orn. Sard. p. 199. n. 261.

K. u. Bl. n. 424. — Schl. Rev. I. p. 123. Schl. Mus. Pelec. p. 18. n. 2. (part.) — Bp. Consp. II. Gen. 160. n. 1 a. — Degl. u. G. n. 409.

Ibis 1859. p. 107. — Cab. Journ. 1857. p. 5. — p. 14. = H. leucogaster. — 1858. p. 237. — 1865. p. 415. —

593. Halieus pygmaeus. Ill.

Ungarn. Nord-Afrika (Algerien.) — [Süd-Ost-Europa. Verfliegt sich bis nach Deutschland (Görlitz: A. von Homeyer. Asien.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 409. — N. V. D. t. 281. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 93. f. 3. — Bäd. t. 54. f. 4. —

Pall. It. II. app. p. 712. n. 26. — Pall. Zoogr. II. p. 300. n. 364. — Temm. Man. II. p. 901. — Licht. Catal. p. 86. n. 910. — Lath. Ind. Orn. II. p. 890. n. 25. — M. u. W. III. p. 235. — Br. Lehrb. p. 913. — Schinz. p. 368. — N. V. D. XI. p. 112. — K. u. Bl. n. 427. — Schl. Rev. I. p. 123. — Schl. Mus. Pelec. p. 13. n. 2. — Bp. Consp. II, Gen. 165. n. 6—9. — Rüpp. S. Ueb. n. 530. — Degl. u. G. n. 410. —

594. Pelecanus onocrotalus. L.

An der untern Donau. — [Süd-Europa. Asien. Afrika. Hat sich öfter bis nach Deutschland verflogen.]

Abbild. 1) Vogel: Büff. pl. enl. 87. — Gould. t. 405. — N. V. D. t. 282. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 93. f. 7. — Bäd. t. 38. f. 2. —

L. S. XII. p. 215. n. 1. — Gm. L. S. p. 569. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 882. n. 1. — p. 883. n. 2. — Pall. Zoogr. II. p. 296. n. 1. — Temm. Man. II. p. 891. — IV. p. 560. — Bechst. Nat. D. IV. p. 738. — M. u. W. II. p. 574. — Br. Lehrb. p. 915. — Schinz. p. 365. n. 1. — N. V. D. XI. p. 150. — K. u. Bl. n. 429. — Schl. Rev. I. p. 122. — Schl. Mus. Pelec. p. 30. (part.) — Bp. Consp. II. Gen. 152. n. 5. — Rüpp. S. Ueb. n. 525. — Hartl. W. Afr. n. 732. — Degl. u. G. n. 405. (part.) — Br. Thierl. IV. p. 929. —

595. Var (?). Pelecanus minor. Rüpp.

Afrika. — [Nach Naumann in der Moldau und am Schwarzen Meere.]

Abbild. 1) Vogel: Rüpp. Atl. t. 49. — Rchb. f. 2321—22. —

2) Eier:

Mus. Senk. II. p. 185. — K. u. Bl. n. 430. — Schl. Rev. II. p. 109. — Schl. Mus. Pelec. p. 30 (part). — Bp. Consp. II. Gen. 152. n. 5. a. — N. V. D. XI. p. 161. — Rüpp. S. Ueb. n. 526. — p. 131. — Degl. u. G. n. 405 (part). —

596. Pelecanus crispus. Bruch.

Donauländer. Griechenland. Süd-Russland (Wolga). Caspisches Meer. — [Afrika. Asien. Hat sich bis Danzig verflogen: Boeck.]

Abbild. 1) Vogel: Gould. t. 406. — N. V. D. t. 283. —

2) Eier: Thien. t. 93. f. 8. — Bäd. t. 38. f. 1. —

L. S. XII. p. 215. n. 1 a. — Pall. Zoogr. II. p. 292. n. 361. — Eversm. Add. Zoogr. p. 30. — Bruch. Isis. 1822. p. 1109. — Schinz. p. 365. n. 2. — N. V. D. XI. p. 180. — XIII. p. 291 = Fortpflanzung. — K. u. Bl. n. 428. — Schl. Rev. I. p. 122. — Schl. Mus. Pelec. p. 32. — Bp. Consp. II. Gen. 152. n. 2. — Rüpp. S. Ueb. n. 527. — Degl. u. G. n. 406. — Br. Thierl. IV. p. 930. —

597. Colymbus cristatus. L.

Ganz Süd- und Mittel-Europa. In Nord-Europa bis Süd-Schweden (60°) — [Nord-Afrika. Asien. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 479. — Buff. pl. enl. 400. — t. 941. t. 944. — Gould. t. 388. — N. V. D. t. 242. f. 1—4. — Gray. Gen. B. II. t. 171. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 74. f. 5. a b. — Bäd. t. 16. f. 1. —

L. S. XII. p. 222. n. 7. — Briss. Orn. VI. p. 45. n. 4. — Lath. Ind. Orn. II. p. 780. n. 1. — Temm. Man. II. p. 717. — Pall. Zoogr. II. p. 353. n. 407. — Bechst. Nat. D. IV. p. 533. — M. u. W. II. p. 426. — Br. Lehrb. p. 865. — Schinz. p. 352. — N. V. D. IX. p. 686. — K. u. Bl. n. 436. — Schl. Rev. I. p. 104. — Hartl. W. Afr. n. 703. — Degl. u. G. n. 515. — Br. Thierl. IV. p. 939. —

Cab. Journ. 1870. p. 312 = C. Widhalmi (Göbel). —

598. Colymbus rubricollis. Gm.

Deutschland. Ungarn. Süd-Russland (Kiew und Sarepta). — [Mittel- und Süd-Europa; aber im Westen nur selten.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 480. — Gould. t. 389. — N. V. D. t. 243. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 74. f. 6. a b. — Bäd. t. 16. f. 2. —

Gm. L. S. p. 592. n. 21. — n. 23. — p. 590. n. 18. — Lath. Ind. Orn. II. p. 783. n. 6. — Pall. Zoogr. II. p. 355. n. 408. — p. 356. n. 409. — Temm. Man. II. p. 720. — Bechst. Nat. D. IV. p. 546. — M. u. W. II. p. 429. — Br. Lehrb. p. 865. — Schinz. p. 352. — N. V. D. IX. p. 720. — K. u. Bl. n. 436. — Schl. Rev. I. p. 104. — Hartl. W. Afr. n. 703. — Degl. u. G. n. 516. — n. 516 A. = C. Holbölli. — n. 517. = C. longirostris. (Bp.) —

599. Colymbus cornutus. Gm.

Jütland. Nach Naumann auch Island, Grönland, Nord-Amerika. — [Die Angaben über das Vorkommen dieses und des nächstfolgenden Tauchers sind schwer zu sondern.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 481. — Buff. pl. enl. 404. f. 2. — t. 942. — Gould. t. 390. — N. V. D. t. 244. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 74. f. 8. a b. — Bäd. t. 16. f. 4. —

Gm. L. S. p. 592. n. 25. — p. 593. n. 27. — Lath. Ind. Orn. II. p. 782. n. 5. — n. 7. — Temm. Man. II. p. 721. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 61. — M. u. W. II. p. 431. — Br. Lehrb. p. 869. — Schinz. p. 353. n. 2. — N. V. D. IV. p. 739. — K. u. Bl. n. 434. — Schl. Rev. I. p. 105. — Degl. u. G. n. 518. (part.) —

600. Var. Colymbus arcticus. Naum.

Grönland. Island. Schweden. Norwegen. — [Ganz Nord-Europa. Nord-Amerika.]

Abbild. 1) Vogel: N. V. D. t. 245. f. 1—4. —
2) Eier: Bäd. t. 16. f. 5. —

L. S. XII. p. 222. n. 8.? — L. Faun. Suec. p. 54. n. 152. — Boie. Tageb. p. 97. — p. 308. — p. 337. — Br. Lehrb. p. 872. — Br. Nat. V. D. p. 961. — Schinz. p. 354. n. 1. — N. V. D. IX p. 755. — XIII. p. 265. — K. u. Bl. n. 434. Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 105 β. — Degl. u. G. n. 518. (part.)

601. Colymbus auritus. Gm.

Skandinavien: Wallengreen. Pommern: Th. Holland. Bei Breslau: A. von Homeyer. Bei Görlitz: Tobias. Ungarn. Süd-Russland (Sarepta). Süd-Frankreich, gemein; im Norden selten: Degland und Gerbe. — [Europa. mit Ausschluss des höchsten Nordens.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 482. — Gould. t. 391. — N. V. D. t. 246. f. 1—3. —
2) Eier: Thien. t. 74. f. 7. abc. — Bäd. t. 16. f. 3. —

L. S. XII. p. 222. Var. B. — Gm. L. S. p. 590. n. 8. — Briss. Orn. VI. p. 50. n. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 781. n. 3. — Temm. Man. II. p. 725. — Bechst. Nat. D. IV. p. 552. — M. u. W. III. p. 435. — Br. Lehrb. p. 873. — Br. Nat. V. D. p. 962. — Schinz. p. 354. n. 2. — N. V. D. IX. p. 768. — K. u. Bl. n. 433. — Schl. Rev. I. p. 105. — Degl. u. G. n. 519. —

602. Colymbus minor. Gm.

Süd-Schweden. Deutschland. Ungarn. Süd-Russland (Kiew, selten. Sarepta). Frankreich: Degland und Gerbe. — [Europa mit Ausschluss des nördlichsten Theiles. Afrika.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 905. — Gould. t. 392. — N. V. D. t. 247. f. 1—5. —
2) Eier: Thien. t. 74. f. 10. ab. — Bäd. t. 16. f. 6. —

Gm. L. S. p. 591. n. 20. — p. 594. n. 28. — Lath. Ind. Orn. II. p. 785. n. 11. — Briss. Orn. VI. p. 62. Var. a. — Temm. Man II. p. 727. — Bechst. Nat. D. IV. p. 565. — M. u. W. II. p. 436. — Br. Lehrb. p. 875. — Br. Nat. V. D. p. 964.—966. — Bp. List. B. p. 64. — Schinz. p. 355. — N. V. D. IX. p. 785. — K. u. Bl. n. 432. — Schl. Rev. I. p. 105. — Rüpp. S. Ueb. n. 502. — Hartl. W. Afr. n. 704. — Degl. u. G. n. 520. — Br. Thierl. IV. p. 942.

603. Eudytes septentrionalis. Ill.

Grönland. Island. Schweden. Norwegen. Loffoden: Barth. Sibirien: von Middendorff. — [Verfliegt sich nicht selten bis Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 308. — t. 992. — Audub. B. Am. t. 478. — Gould. t. 395. — N. V. D. t. 329. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 94. f. 1. a—c. — Bäd. t. 58. f. 3. —

L. S. XII. p. 220. n. 3. — Gm. L. S. p. 586. n. 3. — p. 587. n. 17. — Lath. Ind. Orn. II. p. 801. n. 5. — Pall. Zoogr. II. p. 342. n. 399. — Brünn. Orn. bor. p. 39. n. 132. — Temm. Man. II. p. 916. — Penn. Arct. Zool. II. p. 519. n. 441. — p. 520. n. 443. — Bechst. Nat. D. IV. p. 609. — M. u. W. II. p. 453. — III. p. 185. n. 3. — Br. Lehrb. p. 892. — Schinz. p. 357. n. 2. — N. V. D. XII. p. 434. — K. u. Bl. n. 439. — Schl. Rev. I. p. 106. — Degl. u. G. n. 523. — Br. Thierl. IV. p. 945. —

604. Eudytes arcticus. Ill.

Schweden, Norwegen, häufig. Pommern. Sibirien: von Middendoff. — [Verfliegt sich bis Süd-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 477. — Buff. pl. enl. 914. — Gould. t. 394. — N. V. D. t. 328. f. 1—2. — Gray Gen. B. II. t. 171. f. 1. — Ill. t. 171. —

2) Eier: Thien. t. 94. f. 2. — Bäd. t. 58. f. 2. —

L. S. XII. p. 221. n. 4. — Gm. L. S. p. 587. n. 4. — L. Faun. Suec. p. 52. n. 150. — Lath. Ind. Orn. II. p. 800. n. 4. — Temm. Man. II. p. 913. — Penn. Arct. Zool. II. p. 520. n. 444. — Pall. Zoogr. II. p. 341. n. 398. — Bechst. Nat. D. IV. p. 600. — M. u. W. III. p. 183. — Br. Lehrb. p. 885. — p. 888. — Schinz. p. 357. n. 1. — N. V. D. XII. p. 418. — K. u. Bl. n. 437. — Anmerk. — Schl. Rev. I. p. 106. — II. p. 106. — Degl. u. G. n. 522. —

605. Eudytes glacialis. Ill.

Island. Grönland. Labrador. Sibirien (Taimyrfluss, sehr selten): von Middendorff. — [Einzeln an den Küsten der Nord- und Ostsee. Verfliegt sich bis Süd Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 476. — Buff. pl. enl. 952. — Gould. t. 393. — N. V. D. t. 327. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 94. f. 3. abc. — Bäd. t. 58. f. 1. —

L. S. XII. p. 221. n. 5. — Gm. L. S. p. 588. n. 5. — n. 6. — Lath. Ind. Orn. II. p. 799. n. 1. — p. 800. n. 2. — Brünn. Orn. bor. II. p. 41. n. 134. — Pall. Zoogr. II. p. 340. n. 397. — Temm. Man. II. p. 910. — Ill. Prodr. p. 282. — Penn. Arct. Zool. II. p. 518. n. 439. — Bechst. Nat. D. IV. p. 595. — p. 621. — M. u. W. II. p. 449. — III. p. 180. — Br. Lehrb. p. 881. — p. 883. — Schinz. p. 356. — N. V. D. XII. p. 397. — K. u. Bl. n. 438. — Schl. Rev. I. p. 106. — Degl. u. G. n. 521. — Br. Thierl. IV. p. 945.

606. Mergulus alle. Vieill.

Spitzbergen. Island (Grimsey). Grönland. — [Nord-Europa. Nord-Amerika. Verfliegt sich bis Holland und Frankreich.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 339. — Buff. pl. enl. 917. — Gould. t. 402. — N. V. D. t. 334. f. 1—3. — Gray Gen. B. II. t. 177. f. 3. —

2) Eier: Thien. t. 95. f. 1. a—c. — Bäd. t. 70. f. 2. —

Vieill. An. d'Orn. p. 67. — L. S. XII. p. 211. n. 5. — Gm. L. S. p. 554. n. 5. — Lath. Ind. Orn. II. p. 795. n. 10. — Brünn. Orn. bor. p. 26. n. 106. — Fabric. Faun. Grönl. p. 84. n. 54. — Temm. Man. II. p. 928. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 44. — Briss. Orn. VI. p. 73. n. 2. — Penn. Arct. Zool. II. p. 512. n. 429. — Bechst. Nat. D. IV. p. 732. — M. u. W. II. p. 443. — III. p. 178. — Br. Lehrb. p. 935. — Schinz. p. 358. — N. V. D. XII. p. 552. — K. u. Bl. n. 443. — Schl. Rev. I. p. 108. — Degl. u. G. n. 527. — Br. Thierl. IV. p. 954. —

607. Cepphus grylle. Cuv.

Grönland. Island. Faröer. Norwegen. Schweden. Insel Åland. Dänemark (Lassö). Gothland: L. Holtz. Labrador. — [Küsten Mittel-Europas. Im Binnenlande nur als Irrling.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 219. — Gould. t. 399. — N. V. D. t. 330. f. 1—3. —

2) Eier: Thien. t. 97. f. 1. a—e. — Bäd. t. 70. f. 1. —

L. S. XII. p. 220. n. 1. — Pall. Zoogr. II. p. 348. n. 404. — Lath. Ind. Orn. II. p. 797. n. 2. — Briss. Orn. VI. p. 76. n. 3. — Temm. Man II. p. 925. — Penn. Arct. Zool. II. p. 516. n. 437. — Bechst. Nat. D. IV. p. 586. — M. u. W. II. p. 446. — Br. Lehrb. p. 920. — 933. — p. 1006. — 1008. — Schinz. p. 360. — p. 361. n. 2. — N. V. D. XII. p. 461. — K. u. Bl. n. 444. — Schl. Rev. I. p. 107. — Degl. u. G. n. 526. — Br. Thierl. IV. p. 948.

608. Var. Cepphus Mandti. Bp.

Spitzbergen. Grönland. — [Scheint sich nur sehr selten nach den Küsten Mittel-Europas zu verfliegen.]

Abbild. 1) Vogel: Rchb. f. 47. —

2) Eier: Thien. t. 97. f. 2. a b. —

Licht. Catal. p. 88. n. 926. — Br. Lehrb. p. 924. — p. 1008. — K. u. Bl. n. 445. — Schl. Rev. I. p. 107. — Baird. u. Cass. p. 912. — Degl. u. G. n. 526. A. —

Cab. Journ. 1863. p. 382. n. 19. — p. 457. n. 15. — 1865. — p. 393.

609. Uria troile. Lath.

Island. Shetland-Inseln. Faröer. Orkney-Inseln. Schweden. Norwegen. Loffoden. Gothland: L. Holtz. Helgoland. — [Nord- und Ostsee. Canal. Portugal (Peniche und Cezimbra, gemein): du Bocage.]

Abbild. 1) Vogel: Buff. pl. enl. 903. — Gould. t. 396. — N. V. D. t. 331. f. 1—3. — Gray. Gen. B. II. t. 177. f. 1. —

Brünn. Orn. bor. p. 27. n. 108. — Temm. Man. II. p. 921. — IV. p. 573. — Gm. L. S. p. 585. n. 2. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 42. — M. u. W. II. p. 445. — Br. Lehrb. p. 926. — Schinz. p. 360. n. 1. — N. V. D.

XII. p. 508. — K. u. Bl. n. 447. — Schl. Rev. I. p. 107. — Degl. u. G. n. 524. — Br. Thierl. IV. p. 950. —

610. Uria hringvia. Brünn.

Spitzbergen: Malmgreen. Island: Thienemann. Orkney-Inseln. — [Wurde nur selten an den Deutschen Küsten beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 218. — Gould. t. 397. — N. V. D. t. 332. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 100. f. 1. a—c. — Bäd. t. 69. f. 1. —

Brünn. Orn. bor. p. 28. n. 111. — n. 112. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 42. — Br. Beitr. III. p. 880. — Br. Lehrb. p. 928. — Temm. Man. IV. p. 574. — Schinz. p. 359. — N. V. D. XII. p. 524. — K. u. Bl n. 448. — Schl. Rev. I. p. 107. — Degl. u. G. n. 524. A. —

611. Uria arra. K. u. Bl.

Spitzbergen. Faröer. Grönland. Nord-Amerika. — [Noch seltener als die vorhergehende an den Küsten Mittel-Europas beobachtet.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 345. — Gould. t. 398. — N. V. D. t. 333. f. 1—2. —

2) Eier: Thien. t. 98. f. 2. a—f. — Bäd. t. 69. f. 2. —

Pall. Zoogr. II. 347. n. 403. — Brünn. Orn. bor. p. 27. n. 109. — n. 110. — Sabine Trans. Linn. Soc. XII. p. 528. — Faber Prodr. Isl. Orn. p. 41. Fabric. Faun. Grönl. p. 79. — Temm. Man. II. p. 924. — M. u. W. III. p. 178. — Br. Lehrb. p. 929. — p. 931. — Br. Nat. V. D. p. 984. n. 4—5. — Schinz. p. 360. n. 3. — N. V. D. XII. p. 535. — K. u. Bl. n. 446. — Schl. Rev. I. p. 106. — Degl. u. G. n. 525. —

Cab. Journ. 1853. p. 324. — 1855. p. 417. — 1856. p. 305. — 1857. p. 252. — p. 368. — 1863. p. 382. — 1864. p. 380. n. 21. —

612. Alca torda. L.

Schweden. Åland. Norwegen. Loffoden. Lappland. Dänemark (Bornholm): Kjörbölling. Gothland: L. Holtz. Island. Grönland. Labrador. — [Küsten Mittel-Europas. Verfliegt sich bis zum äussersten Süden (Portugal): du Bocage.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 214. — Buff. pl. enl. 1003. — 1004. — Gould. t. 401. — N. V. D. t. 336. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 97. f. 3. a—g. — Bäd. t. 15. f. 2. —

L. S. XII. p. 210. n. 1. — L. Faun. Suec. p. 49. n. 139. — Gm. L. S. p. 551. n. 1. — Lath. Ind. Orn. II. p. 793. n. 5. — Brünn. Orn. bor. p. 25. n. 100. — 103. — Briss Orn. VI. p. 92. — Temm. Man. II. p. 936. — Penn. Arct. Zool. II. p. 509. n. 425. — p. 510. n. 426. — Bechst. Nat. D. IV. p. 711. — M. u. W. II. p. 439. — Br. Lehrb. p. 946. — 949. — Schinz. p. 363. n. 1. — N. V. D. XII. p. 606. — K. u. Bl. n. 441. — Schl. Rev. I. p. 108. — Degl. u. G. n. 530. — Br. Thierl. IV. p. 961. —

613. Alca impennis. L.

Auf Island wurden die letzten Eier im Jahre 1834 gefunden. Früher brütete er in Neufundland und, wie es scheint, auch auf den Faröer. — [Ausser Island, wo der Vogel häufig gewesen sein muss, und wo noch im Jahre 1830 einige 20 Exemplare geschossen wurden, kennt man folgende sicher constatirte Vorkommnisse: Hafen von Kiel 1790. Hebriden 1812. St. Kilda 1822. Normandie (todtes Exemplar) 1830. Das letzte glaubwürdig festgestellte Vorkommen ist die von Newton mitgetheilte Erbeutung von zwei Exemplaren auf Island (Eldey) am 3. Juni 1844.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 341. — Büff. pl. enl. 367. — Gould. t. 400. — N. V. D. t. 337. f. 1—2. — Gray Gen. B. II. t. 175. f. 3. — Br. Thierl. IV. p. 863. —

2) Eier: Thien. t. 96. f. 1—3. — Bäd. t. 70. f. 3. —

L. S. XII. p. 210. n. 3. — L. Faun. Suec. p. 49. — Gm. L. S. p. 550. n. 3. — Lath. Ind. Orn. II. p. 791. n. 1. — Briss. Orn. VI. p. 85. n. 1. — Temm. Man. II. p. 939. — Penn. Arct. Zool. II. p. 509. n. 424. — M. u. W. III. p. 176. — Br. Lehrb. p. 951. — Schinz. p. 363. n. 2. — N. V. D. XII. p. 630. — K. u. Bl. n. 440. — Schl. Rev. I. p. 107. — Degl. u. G. n. 531. — Br. Thierl. IV. p. 963. —

Cab. Journ. 1860. p. 58. Eier. — p. 60. — 1862. p. 77. — p. 110. — p. 208. — p. 337. — p. 461. — 1863. p. 296. — 1866. p. 70. — p. 310. — p. 394 = In Sammlungen vorhandene Exemplare. —

614. Mormon arcticus. Ill.

Island. Grönland. Orkney-Inseln. Faröer. Finnmarken: Malmgreen. Bis 1840 auf Helgoland: Naumann. — [Hat sich schon bis Süd-Europa verirrt.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 213. — Buff. pl. enl. 275. — Gould. t. 403. — N. V. D. t. 335. f. 1—4. —

2) Eier: Thien. t. 95. f. 7. a—e. — Bäd. t. 80. f. 6. —

L. S. XII. p. 211. n. 4. — Pall. Zoogr. II. p. 365. n. 416. — Ill. Prodr. p. 283. — Licht. Catal. p. 88. — Temm. Man. II. p. 933. — Faun. Suec. p. 49. n. 141. — Lath. Ind. Orn. II. p. 792. n. 3. — p. 793. n. 4. — Boie Tageb. p. 199. — Penn. Arct. Zool. II. p. 511. n. 427—428. — Brünn. Orn. bor. p. 25. n. 103. — Bechst. Nat. D. IV. p. 723. — M. u. W. II. p. 442. — III. p. 177. — Br. Lehrb. p. 940. — Schinz. p. 362. n. 1. — N. V. D. XII. p. 576. — K. u. Bl. n. 442. — Schl. Rev. I. p. 108. — Degl. u. G. n. 528. — Br. Thierl. IV. p. 957. —

615. Var. Mormon glacialis. Leach. Naum.

Spitzbergen. Grönland. Nord-Amerika (Labrador). — [Nord-Europa.]

Abbild. 1) Vogel: Naum. Isis. 1821. t. 7. f. 2. —

2) Eier:

Naum. Isis. 1821. p. 282. — Steph. Shaw. Zool. XIII. 1826. p. 40. — Br. Lehrb. p. 943. — Schinz. p. 362. n. 2. — K. u. Bl. n. 442. Anmerk. — Schl Rev. I. p. 108. — N. V. D. XIII. p. 314. — Degl. u. G. n. 529. — Cab. Journ. 1865. p. 267. — p. 394. — Ibis. 18 9. April. —

616. Mormon corniculata. Naum.

Nord-Asien (am Ochotskischen Meere): von Middendorff. Russisch-Amerika: von Kittlitz. — [Wird von Gloger ohne nähere Angabe als Europäisch aufgeführt.]

Abbild. 1) Vogel: Audub. B. Am. t. 463. — Gray Gen. B. t. 174. — Isis. 1821. t. 7. f. 1. — Gould. t. 404. —

2) Eier:

Brandt. Bull. Soc. Acad. Imp. Sienc. II. p. 340. — Temm. Man. IV. p. 579. — Aubub. B. Am. t. VII. p. 236. — Naum. Isis. 1821. p. 282. — Baird. u. Cass. p. 902. —

Synonymik.

Die Zahlen beziehen sich auf die laufenden Nummern des systematischen Verzeichnisses.

Acanthis. Blyth.
— borealis. K. u. Bl. 312
— canescens. Bp. 312
— cannabina. Blyth. 309
— carduelis. K. u. Bl. 313
— citrinella. Glog. 308
— groenlandica. Br. 311
— Holbölli. Bp. 311
— linaria. K. u. Bl. 311
— montium. Blyth. 310
— pistacina. Glog. 316
— rufescens. Bp. 311
— spinus. K. u. Bl. 315

Acanthopneuste. Blas.
— borealis. Blas. 225
— validirostris. Gray. 225

Accentor. Bechst.
— *alpinus. Bechst. 203
— calliope. Temm. 206
— major. Br. 203
— *modularis. Cuv. 204
— *montanellus. Temm. 205
— pinetorum. Br. 204
— subalpinus. Br. 203
— Temmincki. Brandt. 205

Accipiter. Briss.
— auladarius. Briss. 18
— astur. Pall. 21
— badius. Alléon. 22
— brachydactylus. Sw. 22
— brevipes. Tristr. 22
— buteo. Pall. 39
— circus. Pall. 48
— dukhunensis. Syk. 22
— Dussumieri. Syk. 22
— erythrorhynchus. Sw. 24
— ferox. Gm. 42
— fringillarius. Gesn. 23
— fringillarius. Jerd. 22
— fringillaroïdes. Hodgs. 22
Accipiter gabar. Schl. 24
— gallinarum. Br. 21
— Gurneyi. Bree. 22
— hypoleuos. Pall. 36
— ichtyaëtos. Pall. 37
— lacertarius. Pall. 38
— lagopus. Pall. 40
— maculatus. Briss. 23
— major. Degl. 23
— milvus. Pall. 45
— minor. Gesn. 23
— niger. Gould. 24
— nisosimilis. Tick. 23
— nisus. Pall. 23
— polyzonoïdes A. Smith. 22
— scutarius. Hodgs. 22
— sphenurus. Gurn. 22
— subtypicus. Hodgs. 23

Acnemis. Kaup = Scops. Savig.

Acnemius. Gray.
— gymnopodius. Gray. 67

Acredula. Koch.
— caudata. Koch. 123

Acredula. Rzac = Agrodroma. Sw.

Acridotheres. Ranz.
— roseus. Ranz. 157

Acrobates. Jerd.
— familiaris. Br. 241
— galactodes A. Br. 241
— minor. Br. 241
— rubiginosus. Dub. 241

Acrocephalus. Naum.
— agricolus. Blyth. 247
— aquaticus. (Lath.) 244
— arundinaceus. Gr. 245
— arundinaceus. Naum. 246
— fluviatilis. Heugl. 238
— fluviatilis. Naum. 237
— lacustris. Naum. 245
— luscinioïdes. Heugl. 240

Acrocephalus palustris. Cab. 247
— phragmitis. Naum. 243
— salicarius. Blyth. 246
— salicarius. Naum. 244
— schoenobaenus. Heugl. 243
— stagnatilis. Naum. 238
— turdoïdes. Cab. 245

Actitis. Ill. Schl.
— *Bartrami. Naum. 418
— Bartramius. Schl. 418
— cinclus. Br. 421
— empusa. Gould. 421
— *hypoleucus. Boie. 421
— longicaudus (Bechst.) 418
— *macularia. Boie. 420
— megarhynchos. Br. 421
— notatus. Bp. 420
— pugnax. Ill. 417
— *rufescens. Schl. 419
— Schlegeli. Bp. 421
— stagnatilis. Br. 421
— Wiedi. Bp. (Br) 420

Actiturus. Bp.
— Bartramius. Bp. 418
— longicaudus. (Bechst.) 418
— macularius. Gr. 420
— naevius. Heerm. 419
— rufescens. Bp. 420

Actodromas(a)(us). Kaup.
— albescens. Bp. 414
— australis. Bp. 414
— Bairdi. Coues. 412
— Bonapartei. Cass. 413
— brevirostris. Bp. 419
— Cooperi. Coues. 412
— maculata. Cass. 412
— melanotos. Bp. 413
— minuta. Kaup. 414
— minutilla. Baird. 414
— Temmincki. Kaup. 415

Adamastor. Bp.
— haesitata. Bp. 574
— typus. Bp. 580

Adelarus. Bp.
— leucophthalmos. Bp. 546

Adophoneus. Kaup.
— longirostris. Br. 211
— nisorius. Kaup. 211

Adophoneus undatus. Br. 211
— undulatus. Br. 211

Adornis. Gray.
— hortensis. Gr. 212

Aëdon. Boie.
— Bruchi. Br. 241
— familiaris. Br. 241
— *galactodes. Boie. 241
— minor. Cab. 241
— rubiginosus. Wright. 241

Aëdonopsis. Br.
— fluviatilis. Br. 238
— luscinioïdes. Br. 240

Aegialeus. Rchb. = Aegialites. Vieill.

Aegialites. Vieill.
— albifrons. (Meyer.) 394
— *cantianus. Boie. 394
— curonicus. Boie. 397
— fluviatilis. Br. 397
— gigas. Br. 397
— gracilis. Br. 397
— *hiaticula. Boie. 395
— Homeyeri. Br. 394
— *minor. Boie. 397
— mongolicus (Pall.) 393
— pecuarius. Br. 394
— pygmaeus. Br. 397
— pyrrhothorax. K. u. Bl. 393
— ruficollis. Br. 394
— *semipalmatus. Bp. 396
— septentrionalis. Br. 395

Aegiothus. K. u. Bl.
— exilipes. Coues. 312
— Holbölli. Cab. 311
— linaria. Cab. 311
— rufescens. Cab. 311

Aegithalus. Boie.
— barbatus. (Briss.) 121
— biarmicus. Boie. 121
— caudatus. Boie. 123
— macrurus. Br. 122
— medius. Br. 122
— *pendulinus. Boie. 122

Aegolius. Kaup. K. u. Bl.
— brachyotus. K. u. Bl. 64
— otus. K. u. Bl. 63
— Tengmalmi. Kaup.

Aegypius. Savig. Kaup.
— cinereus. Bp. 4
— niger. Savig. 4
— tinnunculus. Kaup. 18
Aesalon. Kaup.
— concolor. Kaup. 16
— lithofalcao. Kaup. 19
— orientalis. Br. 19
Aestrelata. Bp.
— diabolica. Bp. 574
— haesilata. Bp. 574
— Lessoni. Coues. 575
Aëtochelinon. Kaup. = Sterna. L.
Aëtos. Nitzsch. = Aquila. Briss.
Agelaeus. (Vieill.)
— phoeniceus. (Vieill.) 160
Agelaius. Vieill.
— *phoeniceus. Vieill. 160
Agrobates. Sw.
— familiaris. Br. 241
— galactodes. A. Br. 241
— minor. Br. 241
— rubiginosus. Dub. 241
Agrodroma. Sw.
— campestris. Sw. 267
Aix. Boie.
— promissa. Br. 504
— sponsa. Boie. 504
Alaemon. K. u. Bl.
— desertorum. K. u. Bl. 269
— Jessei. Hartl. u. F. 269
Alauda. Briss. L.
— agrestis. Br. 271
— alba. Briss. 271
— albigula. Brandt. 281
— albigularis. Br. 271
— alpestris. Gm. 281
— *alpestris. L. 280
— anthirostris. Landb. 272
— arborea. Briss. 266
— *arborea. L. 272
— arenaria. Steph. 278
— arenicola. Blanf. 274
— *arvensis. L. 271
— bicornis. Hempr. 281
— bifasciata. Licht. 269
— bilopha. Temm. 281
Alauda bimaculata. Ménétr. 277
— *brachydactyla. Leisl. (Temm.) 278
— bugiensis. Br. 271
— Cairi. Gerbe. 271
— *calandra. L. 275
— calandra. Pall. 277
— calandrella. Bonell. 278
— campestris. Br. 271
— campestris. Briss. 267
— campestris spinoletta. Gm. 261
— cantarella. Bp. 271
— chendola. Frankl. 274
— coelipeta. Pall. 271
— collaris. v. Müll. 275
— cornuta. Wils. (Amerika). 280
— crassirostris. Br. 271
— *cristata. L. 274
— cristata. Pall. 272
— cristatella. Lath. 272
— deserti. Licht. 273
— *desertorum. Stanl. 269
— deva. Jerd. 274
— dukhunensis. Syk. 278
— dulcivora. (Hodgs.) 271
— dulcivox. Hodgs. 271
— *Duponti. Vieill. 270
— ferruginea. v. d. M. (teste Degl.) 270
— flava. Gm. L. 280
— galerita. Pall. 274
— galeritaria. Br. 271
— glacialis. Licht. 281
— grandior. Pall. 267
— gulgula. Syk. 274
— intermedia. Swinh. 271
— isabellina. Mumm. 271
isabellina. Rüpp. 271
— *isabellina. Temm. 273
— italica. Gm. 271
— japonica. Swinh. 271
— Kollyi. Temm. 278
— leucoptera. Pall. 277
— longipes. Lath. 271
— louisiana. Lark. 263
— ludoviciana. Gm. L. 263
— lusitanica. Lath. 273
— lusitana. Gm. L. 273
— marginipennis. Pr. Württ. (J. Kl.) 274
— matutina. Bodd. 275
— minor. Bew. Lath. 266

Alauda minor. Br. 271
— minor. Giraud. 281
— montana. Br. 271
— montana. Cresp. 271
— moreotica. v. d. M. 278
— mosellana. Gm 267
— mutabilis. Gm. 276
— nemorosa. L. 272
— nigra. Steph. 276
— nivalis. Pall. 280
— obscura. Penn· 262
— obsoleta. Br. 279
— pekinensis. Swinh. 271
— *penicillata. Gould. 281
— pennsylvanica. Gm. L. 263
— petrosa. Mont. 262
— picta. Harmann. 272
— *pispoletta. Pall. 279
— pratensis. Briss. 266
— pratensis. L. 264
— pratorum. Br. 271
— raytal. Horsf. 279
— robusta. Br. 271
— rubra. Gm. L. 263
— rubens. Merr. 263
— rufa. Audub. 281
— rufa. Wils. 263
— saxicoloïdes. Boie. (?) 276
— segetum. Br. 271
— sepiaria. Briss. 264
— *sibirica. L. 277
— sibirica. Pall. 275
— spinoletta. L. 261
— *tatarica. Pall. 276
— tenuirostris. Br. 271
— testacea. Pall. 261
— Theclae (Br.) 274
— torquata. Briss. 275
— tracal. Voigt. Cuv. 276
— triborhynchus. Hodgs. 271
— trivialis. Gm. L. 266
— turdina. Scop. 266
— undata. Gm. L. 274
— vulgaris. Leach. 271
— yeltoniensis. Forst. 276
Albatros. Briss. = Diomedea. L.
Alca. L.
— alle. Brünn. (W. u. J. Kl.) 606
— alle. Gm. L. 606
Alca arctica. L. 614
— baltica. Brünn. 612
— Brünnichi. (Sabine.) 611
— candida. Brünn. 606
— canogularis. M. u. W. 614
— deleta. Brünn. (J. Kl.) 614
— glacialis. Br. 612
— grylle. L. 607
— hringvia. (Brünn.) 610
— *impennis. L. 613
— islandica. Br. 612
— labradorica. Gm. L. 614
— lacrymans. Malm. 610
— leucophthalmus Fab. 610
— lomvia. L. 611
— longvigia. Olaf. 610
— major. Briss. 613
— microrhynchos. Br. 612
— minor. Briss. 612
— pica. Fabric. 611
— pica. L. 612
— rhingvia. Malm. 610
— ringvia. Brünn. 610
— *torda. L. 612
— troile. Malm. 609
— unisulcata. Brünn. 612
Alcedo. L.
— advena. Br. 97
— aegyptia. Vieill. 97
— albigularis. Blyth. 98
— *alcyon. L. 100
— arabica. Hempr. u. Ehr. 98
— bella. Br. 97
— bengalensis. Schomb. 99
— brachyrhynchos. Br. 97
— cristata. Sand. 97
— fusca. Bodd. 98
— guacu. Vieill. 100
— gularis. Kuhl. 98
— hispida. Pall. Less. 97
— *ispida. L. 97
— jaguacate. Dum. 100
— leucomelana. Dub. 99
— melanoptera. Temm. 98
— Pallasi. Rchb. 97
— pallida. Br. 97
— *rudis. L. 99
— *smyrnensis. L. 98
Alectoris. Kaup.

Alectoris petrosus. Kaup. 362
Alectornis = Alectoris. Kaup.
Aluco. Flemm. = Syrnium. Savig.
Ammomanes. Cab.
— deserti. Cab. 273
— isabellina. Bp. 273
— lusitanica. Jerd. 273
Ammoptila. Sw.
— charadrioïdes. Sw. 379
Amnicola. Gerbe.
— melanopogon. Gerbe. 242
Ampelis. L.
— garrula. L. 131
Anas. L.
— *acuta. L. 494
— adunca. var. a. L. 493
— aegyptiaca. Gm. L. 488
— africana. Gm. L 509
— albeola. Gm. 516
— albifrons. Gm. 482
— *americana. L. 503
— *angustirostris. Ménétr. 497
— anser. L. (part.) 479
— anser. L. (part.) 480
— anser. L. (part.) 481
— anser ferus. Temm. 479
— archiboschas. Br. 493
— arctica. Leach. 512
— atra. Pall. 524
— baikal. Bonnat. 496
— Barrowi. Temm. 515
— Beringi. Lath. 519
— bernicla. Gm. L. 485
— bicolor. Donav. (Bastard von A. domestica und A. moschata.)
— bimaculata. Penn. 496
— *boscas. Glog. 493
— boschas. L. 493
— brachyrhynchos. Beseck. 517
— bucephala. Penn. 516
— carbo. Pall. 523
— casarca. Gm. L. 491
— caudacuta. Gesn. 494
— cinerascens. Bechst. 524
— cinerea. Gm. 524
— circia. L. 499
— clangula. L. 505
— clypeata. Gm. 509
Anas coerulescens. Gm. 478
— colaris. Donav. 513
— colymbis. Pall. 512
— cornuta. Gm. 490
— *crecca. L. 501
— cristata. Ray. 512
— Cutberti. Pall. 520
— cygnus. L. (part.) 475
— cygnus. L. (part.) 476
— *discors. L. 500
— dispar. Sparm. 519
— domestica. L. 493
— drepanopteros. Messer. 495
— erythropus. Gm. 486
— erythropus. L. 484
— falcaria. Pall. 495
— *falcata. Georgi. 495
— fera. Briss. 493
— ferina. L. 507
— ferroënsis. (Buff.) 517
— ferruginea. Retz. 509
— fistularis. Gesn. 502
— fistularis, cristata. Briss. 506
— *formosa. Georgi. 496
— frenata. Sparm. W. u. J. Kl. 510
— fretihudsonis. Briss. 522
— fuliginosa. Licht. (W. u. J. Kl.) 523
— fuligula. Gm. 512
— fuligula. Wils. 513
— fusca. L. 523
— glacialis. L. 517
— glaucion. L. (W. u. J. Kl.) 514
— glaucion. Pall. 509
— glaucion minor. Briss. 512
— glaucoptera. Dub. 499
— glocitans. Pall. 496
— histrionica. L. 518
— Homeyeri. Bäd. 508
— hyberna. Briss. 516
— hyemalis. Gm. (♂ S. Kl.) 517
— hyemalis. Pall. 514
— hyperboreus. Gm. 478
— islandica. Gm. 515
— kagolka. Gm. 502
— kekuschka. Gm. 498
— lanuginosus. Briss. 520
— latirostra. Brünn. 512
— leucocephala. Scop. 489

Anas leucocephalos. Bechst. 517
— leucophthalmos. Bechst. 509
— longicauda. Briss. 494
— longicauda islandica. Briss. (♂ S. Kl.) 517
— major. Br. 493
— marila. Forst, Wils. 511
— marila. Gm. 510
— marila americana. Schl. 511
— marilοïdes. Vig. 511
— marmorata. Temm. 497
— maxima. Gosse (Bastard von A. domestica und A. moschata.)
— merganser. Naum. 488
— mergοïdes. Kjärb. 526
— mersa. Pall. 489
— minuta. Gm. (♀ u. J. Kl.) 518
— mollissima. L. 520
— monachus. Besecke. 485
— *moschata. L. 492
— nigra. L. 524
— nigra major. Briss. 523
— nivalis. Gm. 478
— nyroca. Güldst. 509
— occidua. Bonnat. 519
— olor. L. 475
— *penelope. L. 502
— perspicillata. Gm. 522
— picta. Stell. 496
— platyrhynchos. Retz. 505
— purpureoviridis. Br. (Bastard von A. domestica und A. moschata.)
— *querquedula. L. 499
— rubens. Gm. 505
— rubra. Gm. 491
— rufa. Gm. 507
— ruficollis. Gm. 487
— ruficollis. Scop. 507
— rufina. Pall. 506
— rufitorques. Schl. 513
— *rutila. Pall. 491
— scandiaca. Gm. 509
— scandina. Gm. 512
— scapularis. Briss. 515
— scapularis. S. Müll. 499
— segetum. Gm. 481
— spectabilis. L. 521
— *sponsa. L. Wils. 504
Anas Stelleri. Pall. 519
— *strepera. L. 498
— subboschas. Br. 493
— sylvestris. Maregr. 492
— *tardorna. L. 490
— torquata. Aldrov. 485
— torquata. Briss. 518
— torquata. Messer. 496
— varia. Bechst. 488
— wigeon. Bonnat. 503
Ancychlocheilus. Kaup.
— subarquata. Kaup. 411
Annomanes. Bp. = Ammomanes. Cab.
Anorthura. Renn.
— troglodytes. Renn. 249
Anous. Steph.
— *fuliginosus (Gm.) 542
— niger. Steph. 543
— pilatus. Bp. 543
— Rousseaui. Hartl. 543
— *stolidus. Leach. 543
— unicolor. Erm. (juv.) 543
Anser. Barrère.
— *aegyptiacus. Briss. 488
— *albifrons. Bechst. 482
— albifrons. Faber. 483
— albifrons rosiceps. Schl. 482
— *arvensis. Br. 481
— Bruchi. Br. 483
— casarca. Vieill. 491
— bernicla. Pall. 486
— *bernicla. Ill. 485
— brachyrhynchos. Baill. 480
— brevirostris. Heckel. 484
— brevirostris. Thien. 480
— brenta. Pall. 485
— Bruchi. Br. 483
— cineraceus. Br. 484
— *cinereus. M. u. W. 479
— erythropus. (Gm.) 476
— erythropus. (L.) 484
— *erythropus. Newt. 484
— erythropus. Steph. 482
— erythropus. Flem. 482
— fereus. Gesn. 479
— ferus. Flem. 481
— ferus. Steph. 479
— finnmarchicus. Gunner. 484

*Anser hyperboreus. Pall. 478
— *intermedius. Naum. 483
— languinosus. Leach. 520
— *leucopsis. Bechst. 486
— medius. Temm. 483
— minutus. Naum. 484
— minutus. Nils. 484
— niveus. Briss. 478
— pallipes. Selys. 482
— palustris. Flem. 479
— phoenicopus. Bartl. 480
— roseïpes. (Schl.) 482
— rosiceps. Glog. 482
— rufescens. Br. 481
— *ruficollis. Pall. 487
— segetum. (Gm.) 481
— segetum. M. u. W. 481
— *segetum. Bechst. Naum. 480
— sylvestris. Br. 479
— sylvestris. Briss. 481
— sylvestris fretihudsonis. Briss. 478
— Temmincki. Boie. 484
— torquatus. Frisch. 485
— varius. M. u. W. 488
— vulgaris. Pall. 479
— vulgaris ferus. Bechst. 479
Anthropoïdes. Vieill.
— pavonia. Vieill. 373
— virgo. Vieill. 370
Anthus. Bechst.
— acutirostris. Br. 264
— alpinus. Br. 261
— alticeps. Br. 264
— *aquaticus. Bechst. 261
— aquaticus. Richards. 263
— aquaticus. Selby. 262
— *arboreus. Bechst. 266
— brumalis. Sepp. 264
— *campestris. Bechst. 267
— campestris. Bew. 262
— Cecili. Audub. 265
— *cervinus. K. u. Bl. 265
— Coutelli. Audoin. 261
— danicus. Br. 264
— desertorum. Br. 264
— foliorum. Br. 266
— herbarum. Br. 266
— hyemalis. Br. 261
— immutabilis. Degl. 262
Anthus juncorum. Br. 266
— Lichtensteini. Br. 264
— littoralis. Br. 262
— longipes. Hollandre. 268
— *ludovicianus. Licht. 263
— luteigularis. Br. 266
— macronyx. Glog. 268
— major. Br. 261
— minor. Br. 261
— montanellus. Br. 264
— montanus. Koch. 261
— musicus. Br. 264
— nigriceps. Hempr. u. Ehrenb. 262
— nigripes Hempr. u. Ehrenb. 261
— obscurus. K. u. Bl. 262
— orientalis. A. Br. 261
— palustris. Meisn. Br. 264
— pensylvanicus. Thien. 263
— petrosus. Flem. 262
— pipiens. Audub. 263
— pratensis. Eversm. 265
— *pratensis. Bechst. 264
— pratensis rufogularis. Schl. 265
— pratorum. Br. 264
— *Richardi. Vieill. 268
— rosaceus. Hodgs. (?) 265
— rufescens. Temm. 267
— ruficollis. Vieill. 265
— rufigularis. Br. 265
— rufus. Vieill. 267
— rupestris. Ménétr. 268
— *rupestris. Nils. 262
— saxorum. Br. 266
— sepiarius. Vieill. 264
— spinoletta. Bp. 261
— stagnatilis. Br. 264
— tenuirostris. Br. 264
— tristis. Baill. 264
— virescens. Br. 264
Antigone. Rchb.
— leucogeranos. Rchb. 372
— torquata. Bp. 371
Apiaster. Briss.
— brevirostris. Briss. 101
— icterocephalus. Briss. (J. Kl.) 101
— madagascarensis. Briss. 102
Apternus. Swains.
— longirostris. Br. 90
— montanus. Br. 90

Apternus septentrionalis. Br. 90
— tridactylus. Sw. 90

Apus. Scop.
— melba. Cuv. 72
— apus. Scop. 73

Aquila. Briss.
— Adalberti. Br. 27
— albicans. Rüpp. 27
— albicilla. Briss. 32
— aurea. Briss. 25
— balbuzardus. Dum. 37
— barbata. Schrank. 7
— Barthelemyi. Jaub. 25
— belisarus. Le Vaill. 27
— bifasciata. Hornsch. 28
— Bonellii. Bp. 30
— brachydactyla. M. u. W. 36
— Brehmi. v. Müll. (Spec. africana.)
— choka. A. Smith. 27
— chrysaëtos. Leisl. 26
— chrysaëtos. Pall. 25
— *clanga. Pall. 29
— deserticola. Eversm. 34
— *fasciata. Vieill. 30
— *fulva. M. u. W. 25
— fulvescens. Hardw. u. Gr. 27
— fulviventris. Br. 28
— fusca. Br. 28
— fusca. Hardw. u. Gr. 27
— fuscoatra. Br. 28
— haliaëtos. M. u. W. 37
— heliaca. Savig. 26
— *imperialis. K. u. Bl. 26
— intermedia. Boit. 30
— isabellina. Heugl. 27
— lestris. Br. 27
— leucamphomma. Borkh. 36
— leucocephala. Briss. 33
— leucocephala. M. u. W. 32
— leucorypha. Pall. 34
— marina. Briss. 37
— melanaëtos. L. 25
— melanaëtos. Savig. 28
— minima. Cetti. 30
— minuta. Br. 31
— mogilnik. Gr. 26
— *naevia. Briss. 28
— naevia var. pallida. Cab. Journ. 28
*Aquila naevioïdes. Cuv. 27
— nepalensis. Hodgs. 30
— nigra. Briss. 25
— nobilis. Pall. 25
— nudipes. Br. 31
— pallida. (Cab. Journ.) 28
— paradoxa. Br. 31
— *pennata. Br. 31
— planga. Vieill. 28
— pomarina. Br. 28
— punctata. Gr. 27
— pygargus. Briss. 36
— rapax. Temm. 27
— raptor. Br. 27
— regia. Less. 25
— riparia. Pr. Max. 26
— rubriventris. Hodgs. 30
— senegalla. Gr. 27
— subnaevia. Br. 28
— substriata. Heugl. 27
— unicolor. Br. 28
— variabilis. Koch. 38
— variegata. Br. 27
— vindhiana. Frankl. 27
— vocifera. Dumér. 35
— Wiedi. Br. 30

Aquilastur. Br.
— Bonellii. Br. 30
— ducalis. Br. 30

Arcuthornis. Kaup.
— iliacus. Kaup. 177
— musicus. Kaup. 178
— pilaris. Kaup. 172

Archibuteo. Br.
— alticeps. Br. 40
— lagopus. Br. 40
— planiceps. Br. 40

Arctica. Gray.
— alle. Gr. 606

Ardea. L.
— aequatorialis. Mont. 452
— *alba. L. 448
— alba minor. Briss. 450
— antigone. L. 371
— *atricollis. Wagl. 446
— audax. Lapeyr. 453
— badia. Gm. L. (J. Kl.) 454
— botaurulus. Schr. 453

Ardea botaurus. Gm. L. 447
— bubulcus. Savig. 452
— candida. Briss. 448
— candida minor. Briss. 452
— candidissima. L. 450
— caspia. Gm. Br. 447
— castanea. Lepech. 453
— ciconia. L. 459
— cineracea. Br. 445
— *cinerea. Lath. 445
— *comata. Pall. 453
— coromandelicus. Licht. 452
— cristata. Briss. 445
— cristata purpurascens. Briss. 447
— danubialis. Gm. 458
— egretta. Bechst. 448
— egretta. Briss. 450
— egretta. Rüpp. 449
— egrettoïdes. Gm. 448
— egrettoïdes. Temm. 451
— erythropus. Gm. (J. Kl.) 453
— flavirostris. Wagl. 451
— fretihudsonis. Schl. 456
— *garzetta. L. 450
— gigantea. Gm. Cuv. 372
— grisea. Gm. (J. Kl.) 454
— grus. L. 369
— ibis. Hasselq. 452
— intermedia. Schl. 451
— kwokwa. Gm. 454
— lentiginosa. Mont. 456
— leucogeranos. Falk. 372
— leucophaea. Gould. 445
— lucida. Rafin. 452
— magnifica. Verr. 451
— major. Gm. Br. 445
— marsigli. Gm. (J. Kl.) 453
— melanocephala. Vig. 446
— *melanorhyncha. Wagl. 449
— minor. Gm. Wils. 456
— minuta. L. 458
— mokoho. Vieill. 456
— monticola. Lapeyr. 447
— nigra. L. 460
— nigripes. Temm. 451
— nigrirostris. Gr. 451
— nivea. Gm. 450
— *nycticorax. L. 454
— *orientalis. Hardw. u. Gr. 451
Ardea pavonia. L. 373
— pharaonica. Bp. 447
— pumila. Lepech. (J. Kl.) 453
— purpurascens. Br. 447
— purpurata. Gm. 447
— *purpurea. L. 447
— ralloides. Scop. 453
— rhenana. Sander. (J. Kl.) 445
— rubiginosa. Gm. 447
— Rueppelli. Bp. 449
— rufa. Gm. 447
— russata. Wagl. 452
— senegalensis. Gm. 453
— soloniensis. Gm. 458
— squajotta. Gm. L. 453
— stellaris. L. 455
— stellaris minor. Gm. 456
— stellaris var. Forst. 456
— Sturmi. Wagl. 457
— variegata. Scop. 447
— *Veranyi. Roux. 452
— virgo. L. 370
— xanthodactyla. Bp. 449
— xanthodactyla. Gm. 450
Ardeiralla. Verr.
— Sturmi. Verr. 457
Ardenna. Rchb.
— major. Rchb. 581
Ardeola. Boie.
— bubulcus. Gr. 452
— cancrophagus. 453
— comata. Gr. 453
— *minuta. Br. 458
— naevia. (Briss.) 458
— pusilla. Br. 458
— ralloïdes. Boie. 453
— *Sturmi. Degl. u. G. 457
— Veranyi. Rchb. 452
Ardetta. Bp.
— gutturalis. Bp. 457
— minuta. Gr. 458
— Sturmi. Gr. 457
Arenaria. Bechst. Briss.
— calidris. M. u. W. 404
— cinerea. Briss. (J. Kl.) 398
— grisea. Bechst. 404
— interpress. Vieill. 398
— vulgaris. Bechst. 404

Arquatella. Baird.
— maritima. Baird. 409
Arundinaceus. Less. = Calamoherpe. Boie.
Arundinax. Blyth.
— aëdon. Blyth. 209
Ascalaphia. Geoffr.
— Savignyi. Geoffr. 66
Ascalopax. K. u. Bl.
— gallinago. K. u. Bl. 431
— gallinula. K. u. Bl. 433
— major. K. u. Bl. 430
— Sabinei. K. u. Bl. 432
Asilus. (Briss.) Bechst.
— sibilatrix. Bechst. 226
Asio. Briss.
— otus. Strikl. 63
Astragalinus· Cab.
— pistacinus. Cab. 316
Astur. Lacép.
— badius. Kaup. 22
— brachyrhynchos. Br. 21
— *brevipes. (Severtz.) 22
— carbonarius. Glog. 24
— Dussumieri. (Temm.) 22
— *gabar. Kaup. 24
— gallinarum. Br. 21
— major. Degl. 23
— micronisus. Bp. 24
— minor. Degl. 23
— *nisus. K. u. Bl. 23
— *palumbarius. Bechst. 21
— paradoxus. Br. 21
— polyoparejus. Heugl. (♂ ad.) 22
— Rueppelli. Kaup. 22
— sphenurus. (Rüpp.) 22
Atagen. Möhr. Gould.
— aquilus. Gould. 589
Athene. Boie.
— acadica. (Temm.) 54
— africana. Gr. 54
— indigena. Br. 55
— meridionalis. Br. 56
— noctua. Bp. Gr. 55
— passerina. Boie. 55
— passerina. Gr. 54
— psilodactyla. Br. 55
Athene Tengmalmi. Boie. 57
Atricilla. Bp.
— atricilla. Bp. 547
— Catesbyi (aei.) Bp. 547
— macroptera. Bp. 547
— megaloptera. Bruch. 547
— microptera. Bruch. 547
— minor. Bp. 547
Attagen. K. u. Bl.
— caucasicus. K. u. Bl. 357
— francolinus. K. u. Bl. 360
Avocetta. Briss. = Recurvirostra. L.
Aythya (ia). Boie.
— erythrocephala. Br. 507
— ferina. Boie. 507
— ferinoïdes. Bartl. 507
— fuligula. Boie. 512
— Homeyeri. Br. 508
— intermedia. Jaub. 507
— islandica. Br. 510
— leucocephalos. Boie. 489
— leuconotos. Br. 510
— marila. Boie. 510
— mariloïdes. (Vig.) 511
— nyroca. Boie. 509
— ruficeps. Br. 507
— rufina. Macgil. 506
— valisneria. Br. 507
— valisneria. Bp. (Species americana.)
Baelophus. Cab.
— bicolor. Cab. 117
Balbuzardus. Flem.
— haliaëtos. Flem. 37
Balearica. Briss.
— coronata. Dub. 373
— *pavonia. Briss. 373
— regulorum. Gr. 373
Bartramia. Less.
— laticada. Less. 418
— longicauda. Less. Dub. 418
Bernicla. Steph.
— aegyptiaca. Eyt. 488
— brenta. Steph. 485
— collaris. Br. 485
— erythropus. Steph. 486
— glaucogaster. Br. 485

Bernicla leucopsis. Boie. 486
— melanopsis. Macgil. 485
— micropus. Br. 485
— pallida. Br. 485
— platyuros. Br. 485
— ruficollis. Steph. Br. 487
— torquata. Boie. Br. 485
Bessonornis. Bp.
— gutturalis. Bp. 187
Bessornis. Gr.
— *gutturalis. Gr. 187
Biblis. Less.
— rupestris. Less. 80
Bites. Möhr. = Mecistura. Leach.
Blepharomerops. Rchb.
— aegyptiacus. Rchb. 102
Bombycilla. Briss.
— bohemica. Briss. 131
— brachyrhynchos. Br. 131
— *garrula. Vieill. 131
Bombyciphora. M. u. W.
— garrula. Br. 131
— polyocephala. M. u. W. 131
Bombycivora. Temm.
— garrula. Temm. 131
Bonasia. Briss.
— albigularis. Br. 356
— betulina. Bp. 356
— europaea. Gould. 356
— lagopus. Br. 356
— minor. Br. 356
— pyrenaeica. Briss. 347
— rupestris. Br. 356
— scotica. Briss. 351
— sylvestris. Br. 356
Boscis. Br.
— rosans. Br. 157
— rosea. Br. 157
Boschas. Swains.
— acuta. Nutt. 494
— americana. Nutt. 503
— discors. Sw. 500
— domestica. Sw. 493
— sponsa. Nutt. 504
— strepera. Nutt. 498
Botaurus. Briss. Steph.
— adspersus. Cab. 456
Botaurus arundinaceus. Br. 455
— bubulcus. Bp. Dub. 452
— comatus. Macgil. 453
— fretihudsonis. Briss. 456
— lacustris. Br. 455
— *lentiginosus. Steph. 456
— major. Br. 455
— major. Briss. 447
— minor. Bp. 456
— minutus. Boie. 458
— nycticorax. Dub. 454
— pusillus. Br. 458
— rufus. Br. 458
— *stellaris. Steph. 455
— striatus. Br. 458
— vulgarus. Dub. 455
Brachylophus. Swains.
— viridis. Sw. 81
Brachyotus. Bp.
— aegolius. Bp. 64
— agrarius. Br. 64
— Cassini. Brew. 64
— palustris. Gould. 64
Brachypus. Sw.
— aurigaster. Cab. 162
Brachypus. Meyer.
— alpinus. Meyer. 72
— murarius. Meyer. 73
Bradypterus. Cab.
— Cettii. Cab. 236
Branta. Boie.
— rufina. Boie. 506
Bubo. Savig.
— albifrons. Vieill. 68
— *ascalaphus. Savig. 66
— asio. Vieill. 68
— atheniensis. Aldrov. 65
— europaeus. Less. 65
— germanicus. Br. 65
— italicus. Briss. 65
— *maximus. Sibb. 65
— melanotos. Br. 65
— microcephalos. Leach. 65
— otus. Savig. 63
— pallidus. Br. 65
— scandiacus. Hartl. 65
— scops. Boie. 67
— septentrionalis. Br. 65

Bubo sibiricus. Br. Licht. 65
— striatus. Vieill. 68
— turcomanus. Eversm. 65
Bubulcus. Pucher.
— aequatorialis. Br. 452
— coromandelicus. Cab. 452
— ibis. Bp. 452
— ruficristatus. Bp. 452
— Veranyi. (Roux.) 452
Bucanetes. Cab.
— githagineus. Cab. 320
Bucephala. Baird.
— albeola. Baird. 516
— clangula. Baird. 514
— islandica. Baird. 515
Budytes. Cuv.
— atricapilla. Br. 260
— boarulus. Br. 256
— *campestris. Br. 258
— caniceps. Br. 259
— chrysogaster. Br. 256
— *cinereocapillus. Br. 259
— *citreolus. Bp. 255
— dubius. Br. 260
— fasciatus. Br. 256
— Feldeggi. Br. 259
— flaveolus. (Temm.) 257
— *flavus. Cuv. 256
— *melanocephalus. Br. 260
— neglectus. Br. 257
— nigricapillus. Bp. 260
— paradoxus. Br. 260
— pygmaeus. O. Br. 258
— *Rayi. Bp. 257
Bulweria. Bp.
— Bulweri. (Jard.) 577
— columbina. Bp. 577
Buphagus. Möhr.
— skua. Möhr. 565
Buphus. Boie.
— audax. Lapeyr. 453
— bubulcus. Bp. 452
— castaneus. Br. Cab. 453
— comatus. Br. Bp. 453
— illyricus. Br. 453
— ralloïdes. Br. Bp. 453
— Veranyi. Bp. 452
Buscarla. Bp.
Buscarla cia. Bp. 288
— lesbia. Bp. (teste Degl.) 292
— pityornis. Bp. 289
— provincialis. Bp. (teste Degl.) 290
— pusilla. Bp. 294
Butaëtos (es). Less.
— buteo. Less. 40
— Lessoni. A. Smith. 31
— leucurus. Naum. 42
— lagopus. Bp. 40
Butalis. Boie.
— africana. Bp. 130
— alpestris. Br. 130
— atricapilla. Gr. 128
— collaris. Gr. 129
— domestica. Br. 130
— *grisola. Boie. 130
— montana. Br. 130
— pinetorum. Br. 130
Butaquila. Hodgs.
— strophiata. Hodgs. 31
Buteo. Cuv.
— albidus. Br. 39
— albus. Daud. 39
— apivorus. Briss. 38
— caesius. Vieill. 43
— canescens. Hodgs. 42
— capensis. Schl. 41
— cinerascens. Flem. 50
— cinereus. Bp. 39
— Delalandi. O. d. Murs. 41
— *desertorum. Daud. 41
— elanoïdes. Vieill. 43
— eximius. Br. 42
— fasciatus. Vieill. Br. 39
— *ferox. Thien. 42
— *lagopus. Vieill. 40
— leucurus. Naum. 42
— longipes. Jerd. 42
— major. Br. 39
— Martini. Hardy. 41
— medius. Br. 39
— minor. Br. 39
— minor. Heugl. 41
— murum. Br. 39
— mutans. Vieill. Br. 39
— pennatus. Vieill. 31
— rufinus. Rüpp. 24

Buteo rufiventris. Jerd. 42
— septentrionalis. Br. 39
— Swainsoni. Bp. 39
— tachardus. Vieill. 41
— vociferus. Vieill. 43
— *vulgaris. Bechst. 39

Butor. Swains.
— lentiginosus. Jard. 456
— minutus. Sw. 458
— stellaris. Sw. 455

Bycanetes — Bucanetes. Cab.

Caccabis. Kaup.
— chukar. Gr. 365
— graeca. Kaup. 364
— petrosa. Bp. 362
— rubra. Kaup. 366
— rufa. Gr. 366

Cairina. Flem.
— moschata. Flem. 492

Calamanthella. Swinh.
— tintinabulans. Swinh. 248

Calamodus. Kaup.
— aquaticus. Cab. 244
— melanopogon. (Temm.) 242
— phragmitis. Kaup. 243
— salicaria. Cab. 244
— schoenobanus. Cab. 243

Calamodyta. M. u. W.
— *aquatica. Bp. 244
— arundinacea. Layrd. 245
— Brehmi. Br. 246
— cariceti. Bp. 244
— certhiola. (Pall.) 239
— Cettii. Gr. 236
— elaïca. Gr. 233
— fluviatilis. Gr. 238
— lanceolata. Gr. 237
— locustella. Gr. 237
— luscinioïdes. Gr. 240
— *melanopogon. Bp. 242
— olivetorum. Gr. 232
— pallida. Gr. 234
— pallustris. Gr. 247
— *phragmitis. Bp. (Bechst.) 243
— schoenobaenus. Bp. 244
— sericea. Gr. 236

Calamodyta strepera. Gr. 246

Calamoherpe. Boie.
— alnorum. Br. 246
— aquatica. Boie. 244
— arbustorum. Br. 246
— *arundinacea. Boie. 246
— caligata. Degl. 235
— Cettii. Boie. 236
— certhiola. Boie. 239
— cisticola. Dub. 248
— elaïca. Bp. 233
— fluviatilis. (M. u. W.) 238
— fruticola. Naum. (?) 246
— galactodes. Schl. 241
— horticola. Naum. 246
— hydrophilos. Br. 246
— lacustris. Br. 245
— lanceolata. (Temm.) 237
— locustella. Boie. 237
— luscinioïdes. Dub. 240
— major. Br. 245
— media. Malm. 245
— melanopogon. Bp. 242
— musica. Br. 247
— nigrifrons. Bp. 247
— obscuricapilla. Dub. 246
— olivetorum. Bp. 232
— orientalis. Temm. (?) 245
— *palustris. Boie. 247
— philomela. Br. 247
— phragmitis. Boie. 243
— pinetorum. Br. 246
— piscinarum. Br. 246
— pratensis. Jaub. 247
— salicaria. Br. 246
— scita. Bp. 235
— stagnatilis. Br. 245
— tenuirostris. Br. 237
— *turdina. Glog. 245
— turdoïdes. Boie. 245

Calamophilus. Leach.
— arundinaceus. Br. 121
— barbatus. K. u. Bl. 121
— biarmicus. Leach. 121
— dentatus. Br. 121
— russicus. Br. 121

Calandra. Less.
— bimaculata. Dub. 275

Calandra ferruginea. Br. 275
— leucoptera. Dub. 277
— nigra. Dub. 276
Calandrella. Kaup.
— brachydactyla. Kaup. 278
— calandrella. Bp. 278
— Kollyi. Cab. (?) 278
— pispoletta. Bp. 279
— raytal. Blyth. 279
— sibirica. Brandt. 277
Calandritis. Cab.
— brachydactyla. Cab. 278
— macroptera. Heugl. (?) 278
— minor. Heugl. 279
— pispoletta. Cab. 279
Calendula. Sw. = Galerita. Boie.
Calidris. Cuv. Ill.
— americana. Br. 404
— *arenaria. Temm. 404
— calidris. Ill. 404
— cinerea. Cuv. 410
— grisea. Briss. 410
— grisea. M. u. W. (W. Kl.) 404
— grisea minor. Briss. 404
— maritima. Bp. 409
— minutus. Bp. 414
— Mülleri. Naum. Br. 404
— naevia. Briss. 410
— nigellus. Vieill. 404
— rubidus. Vieill. 404
— Temmincki. Cuv. 415
— trignoïdes. Vieil. 404
Callichen. Br.
— ruficeps. Br. 506
— rufinus. Br. 506
— subrufinus. Br. 506
Calliope. Gould.
— kamtschatkensis. Strickl. 206
— Lathami. Gould. 206
Campethera. Gr.
— syriaca. Gr. 86 B.
Campicola. Swains. = Saxicola. Bechst.
Cancrophagus. Kaup.
— gutturalis. A. Smith. 457
— lacteus. Kaup. 453
— minutus. Kaup. 458
Cancrophagus ralloïdes. Kaup. 453
— rufus. Briss. 453
Cannabina. Br.
— arbustorum. Br. 309
— chloris. E. v. Hom. 307
— citrinella. Degl. 308
— flavirostris. Br. 310
— incerta. Glog. 323
— linaria. Rüpp. 311
— linota. Gr. 309
— major. Br. 309
— media. Br. 310
— microrhynchos. Br. 310
— minor. Br. 309
— montium. Br. 310
— palustris. Landb. 310
— pinetorum. Br. 309
— sanguinea. Landb. 309
— vulgaris. Glog. 309
Canutus. Briss.
— cinereus. Br. 410
— islandicus. Br. 410
— rufescens. Br. 410
Caprimulgus. L.
— climacturus. (Vieill.) 71
— *climacurus. Vieill. 71
— *europaeus. L. 69
— foliorum. Br. 69
— longicaudus. Steph. 71
— maculatus. Br. 69
— punctatus. M. u. W. 69
— *ruficollis. Temm. 70
— rufitorquatus. Vieill. 70
— rufitorquis. Vieill. 70
— torquatus. Br. 70
— vulgaris. Vieill. 69
— Wiedespergi. Rchb. (?) 71
Carbo. Lacep.
— aquilus. M. u. W. 589
— albiventer. Fisch. 590
— brachyuros. Br. 591
— cormoranus. M. u. W. 590
— crassirostris. Hardw. 590
— cristatus. Temm. 592
— Desmaresti. Payr. 592
— glacialis. Br. 590
— graculus. M. u. W. 591
— graculus mediteraneus. Schl. 592
— leucogaster. Cara. 592

Carbo major. Temm. 590
— medius. (Nils.) 590
— pygmaeus. Temm. 593
Carbonarius. Kaup.
— martius. Kaup. 83
Carduelis. Briss.
— accedens. Br. 313
— aurantiipennis. Br. 313
— auratus. Eyt. 313
— canescens. Risso. Dub. 312
— carduelis. Cab. Journ. 313
— citrinellus. Degl. 308
— elegans. Steph. 313
— germanicus. Br. 313
— Holbölli. Dub. 311
— meridionalis. Br. 313
— nobilis. Br. 313
— orientalis. Glog. 314
— rufescens. Dub. 311
— septentrionalis. Br. 313
— spinus. Steph. 315
— subulatus. Cab. 314
Caricicola. Br.
— aquatica. Br. 244
— brachyrhynchos. Br. 243
— cariceti. Br. 244
— cisticola. Br. 248
— danubialis. Br. 243
— limicola. Br. 244
— melanopogon. Br. 242
— phragmitis. Br. 243
— schoenibaenus. Br. 243
— subphragmitis. Br. 243
— striata. Br. 244
— tritici. Br. 243
Carine. Kaup.
— noctua. Kaup. 55
— meridionalis. Kaup. 56
Carpodacus. Kaup.
— erythraeus. Cab. Journ. 323
— erythrinus. Kaup. 323
— githaginea. Gr. 320
— incertus. Bp. 323
— Peyraudei. Gr. 320
— rhodochlamys. Bp. 325
— rhodopterus. Licht. Gr. 322
— roseus. Kaup. 324
— rubricilla. Bp. 228
— sophia. Bp. 325
Caryocatactes. Cuv. Koch.
— caryocatactes. Schl. 145
— guttatus. Nils. 145
— gutturalis. (Nils) 145
— maculatus. Koch. 145
— nucifraga. Nils. 145
Casarca. Bp.
— minor. Lepech. 487
— rutila. Bp. 491
Catarrhactes. Brünn. Bryant.
— Buffoni. (Boie.) 568
— cepphus. Brünn. 567
— fusca. Leach. 565
— lomvia. Bryant. 609
— minor. Br. 565
— parasita. Pall. 567
— parasitica. Retz. 567
— parasita, var. kamtschatkensis. Pall. 566
— pomarina. Steph. 566
— skua. Brünn. 565
— troile. Bryant. 611
— vulgaris. Flem. 565
Cathartes. Temm.
— monachus. Temm. 6
— percnopterus. Temm. 5
— senescens. Pr. Max. 6
Catoptrophorus. Bp.
— crassirostris. Bp. 429
— *semipalmatus. Bp. 429
Cecropis. Boie.
— Boissonneauti. (Temm.) 79
— cachirica. Br. 79
— cahirica. (Licht.) 79
— melanocrissus. Rüpp. 75
— pagorum. Br. 78
— purpurea. Less. 76
— rufula. Bp. 75
— rustica. Boie. 78
— tustica rufescens. Br. 78
— Savignyi. Boie. 79
— stabulorum. Br. 78
Centrophanes. Kaup.
— calcaratus. Gr. 300
— lapponicus. Kaup. 300
— nivalis. Kaup. 299
Cepphus. Pall.
— alle. Less. 606
— arcticus. Br. 607

Cepphus arcticus. Pall. 605
— arra. Pall. 611
— carbo. Br. 608
— columba. Pall. 607
— faeroënsis. Br. 607
— glacialis. Br. 608
— *grylle. Cuv. 607
— hringvia. (Brünn.) 610
— lacteola. Pall. 607
— lomvia. Pall. 605
— *Mandti. Bp. 608
— Meisneri. Br. 607
— rhingvia. (Brünn.) 610
— septentrionalis. Pall. 603
— torquatus. Pall. 605
— unicolor. Benek. 608

Cerchneis. Boie.
— accedens. Br. 18
— cenchris. Boie. 17
— fasciata. Br. 18
— guttata. Br. 18
— intercedens. Br. 18
— media. Br. 18
— murum. Br. 18
— paradoxa. Br. 17
— rubipes. Dub. 20
— ruficauda. Br. 17
— ruficeps. Br. 17
— rufipes. (Besecke.) 20
— subtinnuncula. Br. 17
— taeniura. Br. 18
— tinnuncula. Boie. 18
— tinnunculoïdes. A. v. Hom. 17
— vespertinus. Boie. 20

Certhia. L.
— americana. Bp. (Spec ?) 104
— brachydactyla. Br. 104
— costae. Parzud. 104
— europaea. Steph. 105
— *familiaris. L. 104
— familiaris. Temm. 104
— longicauda. Brandt. 104
— macrodactyla. Br. 104
— major. Frisch. 104
— megalorhynchos. Br. 104
— megarhynchos. Br. 104
— muralis. Briss. 105
— muraria. L. 105
— Nattereri. Bp. 104

Certhia paradoxa. Br. 104
— rufidorsalis. Br. 104
— scandula. Pall. 104
— septentrionalis. Br. 104
— Turneri. Gesn. 104

Certhialauda. Swains.
— bifasciata. Sw. 269
— Boyi. Blyth. 274
— desertorum. Bp. 269
— doriae. Salvad. 269
— Duponti. Bp. 270
— meridionalis Br. 269

Certhilauda = Certhialauda. Swains.

Ceryle. Boie.
— alcyon. Swains. 100
— bicincta. Rchb. 99
— leucomelanura. Rchb. 99
— leucomelas. Br. 99
— rudis. Boie. 99
— varia. Strickl. 99

Cetosparactes. Macgil.
— eburneus. Macgil. 564

Cettia. Gerbe.
— altisonans. Bp. 236
— Cettii. Gerbe. 236
— luscinioïdes. Gerbe. 240
— melampogon. Cab. Journ. 242
— melanopogon. Gerbe. 242
— *sericea. Bp 236

Chacura. Gr.
— graeca. Gr. 364

Chaemorhous. Bp.
— erythrogaster. Bp. 199

Chaetopus. Swains.
— francolinus. Sw. 360

Charadrius. L.
— aegyptiacus. Hassalq. 379
— africanus. Lath. 379
— albifrons. Br. 388
— albifrons. M. u. W. 394
— alexandrinus. Hasselq. 394
— apricarius. Br. 388
— apricarius. Wils. 387
— *asiaticus. Pall. 392
— auratus. Suck. 388
— aureus. S. Müll. 388
— autumnalis. Hasselq. 402

Charadrius calidris. M. u. W. 494
— cantianus. Lath. 394
— caspius. Pall. 392
— chlorocephalus. Gm. 379
— cinclus. Pall. 398
— cirrepidesmus. Wagl. 393
— cristatus. Shaw. 383
— curonicus. Beseck. 397
— fluviatilis. Bechst. 397
— *fulvus. Gm. 390
— gavia. Licht. 384
— gallicus. L. 378
— gigas. Br. 397
— glaucopis. Forst. 390
— gracilis. Br. 397
— gregarius. Pall. 384
— gularis. Wagl. 393
— helveticus. Bp. 387
— hiaticula. L. 395
— hiaticula. Ord. 396
— hiaticula. Pall. 397
— himantopus. L. 402
— Homeyeri. Br. 394
— hypomelanus. Pall. 387
— hypomelas. Wagl. 387
— inconspicuus. Licht. 393
— indicus. Br. 394
— intermedius. Ménétr. 397
— jugularis. Wagl. 392
— lapponicus. L. 391
— Leschenaulti. Less. 393
— leucurus. Licht. 386
— littoralis. Becht. 394
— longipes. Temm. 390
— longirostris. A. Br. 387
— marmoratus. Temm. 389
— melanocephalos. Gm. 379
— melasomus. Gm. 383
— minor. M. u. W. 397
— *mongolicus. Pall. 393
— *morinellus. L. 391
— naevius. Gm. 387
— oedicnemus. L. 382
— orientalis. Schl. 390
— pardela. Pall. 387
— pectoralis. Vieill. (?) 389
— pecuarius. Br. 394
— persicus. Bonn. 383
— philippinus. Scop. 397
*Charadrius pluvialis. L. 388
— pluvialis. Pall. 390
— pluvialis. Wils. 389
— pluvialis orientalis. Schl. 390
— pyrrhotorax. Temm. 393
— rubidus. L. (S. Kl.) 404
— rubricollis. Cuv. 393
— rufinellus. Blyth. 393
— sanguineus. Less. 393
— semipalmatus. Wils. 396
— septentrionalis. Br. 393
— sibiricus. Gm. Lacep. 391
— spinosus. Hasselq. 383
— squatarola. Naum. 387
— subrufinus. Hodgs. 393
— taïtensis. Less. 390
— tataricus. Pall. (?) 391
— vanellus. Lath. 384
— varius. Finsch. u. Hartl. 387
— ventralis. Hardw. 385
— *virginianus. Borkh. 389
— Wagleri. Gr. 385
— Wilsoni. Licht. 387
— xanthocheilus. Jerd. 389
— xanthocheilus. Wagl. 390
— zonatus. Sw. (Spec.?) 397
Chaulelasmus. Gray.
— americanus. Br. 498
— cinereus. Br. 498
— streperus. Gr. 498
Chauliodus. Swains.
— strepera. Sw. 498
Cheilodromus. Rüpp.
— melanncephalos. Rüpp. 379
Cheimonea. Klup.
— tridactyla. Kaup. 554
Chelidon. Boie.
— fenestrarum. Br. 77
— rupestris. Boie. 80
— rupestris. Br. 77
— tectorum. Br. 77
— urbica. Boie. 77
Chelidopteryx. Kaup.
— furcatus. Kaup. 47
Chen. Boie.
— hyperboreus. Boie. 478
Chenalopex. Steph. Möhr.
— aegyptiacus. Eyt. 488

Chenalopex hyperboreus. Steph. 478
— impennis. Möhr. 613
— rutilus. Glog. 491
— tadorna. Glog. 490
— varius. Br. 488
Chettusia. Bp.
— gregaria. Bp. 385
— leucura. Bp. 386
Chinospiza. Kaup.
— arctoa. (Gr) 303
— nivalis. Kaup. 302
Chlamodotis. Less. = Houbara. Bp.
Chloris. Brehm.
— auriventer. Br. 307
— brachyrhynchos. Br. 307
— curvirostra. Br. 307
— flavicoptera. Landb. 307
— flavigaster. Sw. 307
— hortensis. Br. 307
— incertus. Möhr. 323
— montanus. Br. 307
— pinetorum. Br. 307
— septentrionalis. Br. 307
Chloropeta. Bp.
— elaïca. Bp. 233
— hypolais. A. Smith. 230
— olivetorum. Bp. 232
— pallida. Bp. 234
— vulgaris. Bp. 230
Chloropicus. Malh.
— canus. Malh. 82
— viridis. Malh. 81
Chlorospiza. Bp.
— chloris. Bp. 307
— citrinella. K. u. Bl. 308
— incerta. Bp. 323
Choris. A. Brehm.
— arborea. A. Br. 272
Chourtka. Motsch.
— alpina. Motsch. 357
Chroïcocephalos. Eyt. 547
— atricilla. Eyt. 547
— Bonapartei. Br. 550
— capistratus. Eyt. 549
— ichtyaëtos. Eyt. 553
— leucophthalmos. Br. 546
— melanocephalus. Eyt. 551
— minor. Br. 549
— minutus. Eyt. 552
Chroïcephalos philadelphia. Lawr. 550
— pileatus. Br. 549
— ridibundus. Eyt. 548
Chrymonessa. Macgil.
— glacialis. Macgil. 517
Chrysomitris. Boie.
— citrinella. Kaup. 308
— pistacina. Bp. 316
— spinus. Boie. 315
Cia. Kaup. ='Emberiza cia. L. 288
Cichloïdes. Kaup.
— Bechsteini. Kaup. 173
Cichlops. Hodgs.
— Richardi. Hodgs. 268
— thermophilus. Hodgs. 266
Cichlopsthermophilus. (Hodgs.)
— arboreus. (Hodgs.) 266
Cichloselys. Bp.
— dubius. Bp. (?) 175
— fuscatus. Bp. 176
— sibiricus. Bp 168
Ciconia. Briss.
— *alba. Briss. 459
— albescens. Br. 459
— candida. Br. 459
— chrysopelargus. Licht. 460
— fusca. Briss. 460
— major. Br. 459
— *nigra. Gesn. 460
— nivea. Br. 459
— pavonia. (Möhr.) 373
Cinclus. Briss. Bechst.
— alticeps. Br. 250
— americanus. Sw. 251
— *aquaticus. Bechst. 250
— dominicensis. Briss. 412
— europaeus. Steph. 250
— interpres. Gr. 398
— Khevenhülleri. Br. 251
— medius. Br. 250
— melanogaster. Temm. 250
— meridionalis. Br. 250
— mexicanus. Sw. 251
— minor. Briss. (?) 408
— minor. Briss. (W. u. Kl.) (?) 407
— morinellus. Möhr. 398
— *Pallasi. Temm. 251
— rupestris. Br. 250
— septentrionalis. Br. 502

Cinclus torquatus. Briss. 407
Circaëtos. Vieill.
— anguium. Br. 36
— brachydactylus. K. u. Bl. 36
— *gallicus. Vieill. 36
— hypoleucos. Br. 36
— leucopsis. Br. 36
— meridionalis. Br. 36
— orientalis. Br. 36
Circus. Briss.
— *aeruginosus. Savig. 48
— albescens. Less. 51
— arundinaceus. Br. 48
— ater. Vieill. 50
— *cineraceus. (Cuv.) Naum. 50
— cineraceus pallidus. Schl. 51
— cinerascens. Br. 50
— cinerascens. Flem. 50
— cinereus. Br. 49
— *cyaneus. Bechst. 49
— cyanus hudsonicus. Schl. 49
— dalmatinus. Rüpp. 51
— desertorum. Br. 51
— elegans. Br. 50
— europogistus. Vieill. 49
— Feldeggi. Bruch. 51
— gallinarius. Savig. 49
— Heuglini. Pr. Max. 48
— hudsonius. Vieill. 49
— indicus. Lath. 48
— maurus. Rüpp. 24
— Montagui. Vieill. 50
— nepalensis. Hodgs. 50
— nigripennis. Br. 49
— pallens. Br. 49
— pallidus. Hodgs. 50
— pallidus. Sykes. 51
— palustris. Briss. 48
— pratorum. Br. 50
— pygargus. Cuv. 49
— rufinus. Rüpp. 42
— rufus. Briss. 48
— S(e)ykesi. Less. 48
— superciliosus. A. Smith. 51
— *Swainsoni. A. Smith. 51
— umbrinus. Sykes. 48
— variegatus. Sykes. 48
Cirlus. Aldrov.
— stultus. Aldrov. 288
Cirlus. Kaup.
— cia. Kaup. 288
— cirlus. Kaup. 284
Cirrepidesmus. Bp.
— pyrrhothorax. Bp. 393
Cisticola. Less.
— cisticola. Less. 248
— cursitans. Bp. 248
— europaea. Hartl. 248
— lanceolata. Duraz. 237
— *schoenicola. Bp. 248
— subhemalayana. Hodgs. 248
— tintinabulans. (Ibis 1860) 248
— typus. Rüpp. 248
Citrinella. Kaup.
— cia. Kaup. 288
— hortulana. Kaup. 285
Citrinella. Bp. Gr.
— alpina. Bp. 308
— brumalis. Cab. 308
— cinerascens. Br. 308
— cirlus. Gr. 284
— citrinella. Gr. 283
— major. Br. 308
— montana. Br. 308
— serinus. Bp. 308
Clangula. Flem.
— *albeola. Jenyns. 516
— angustirostris. Br. 526
— Barrowi. Sw. 515
— brachyrhynchos. Br. 517
— chrysophthalmus. Steph. 514
— clangula. Flem. 514
— Faberi. Br. 517
— glacialis. Boie. 517
— *glaucion. Boie. 514
— histrionica. Sw. 518
— hyemalis. Br. 517
— *islandica. Bp. 515
— leucomelas. Br. 514
— megauros. Br. 517
— mergoïdes. Kjärb. 526
— peregrina. Br. 514
— scapularis. Br. 515
— Stelleri. Boie. 519
— torquata. Br. 518
— vulgaris. Flem. 514
Cleptes. Cab.
— pica. Cab. 141

Clupeilarus. Bp.
— cachinans. Bp. 559
— fuscescens. Bp. 560
— fuscus. Bp. 560

Clypeata. Less.
— brachyrhynchos. Br. 505
— macrorhynchos. Br. 505
— platyrhynchos. Br. 505
— pomarina. Br. 505
— spatula. Less. 505

Coccothraustes. Briss.
— atrogularis. Macgil. 327
— canadensis. Briss. 326
— *caucasicus. Pall. 328
— cerasorum. Br. 327
— chloris. Pall. 307
— coccothraustes. Bp. 327
— deformis. Koch. 327
— enucleator. (L.) 326
— erythrinus. Vieill. 323
— europaeus. Selby. 327
— fagorum. Bp. 327
— flaviceps. Br. 327
— minor. Br. 327
— petronius. Cuv. 333
— planiceps. Br. 377
— rhodochlamys. Pall. 325
— roseus. Vieill. 323
— sanguineus. Glog. 322
— *vulgaris. Pall. 327

Coccycus (?) = Coccygus. Boie.

Coccygon. Glog. Burm. = Coccygus. Boie.

Coccygius. Nitzsch. = Coccygus. Boie.

Coccygus. Boie. Cab.
— americanus. Bp. 94
— dominicensis. Briss. 94
— erythrophthalmus. Cab. 95

Coccystes. Glog.
— *americanus. K. u. Bl. 94
— *erythrophthalmus. Glog. 95
— flavirostris. Glog. 94
— glandarius. Glog. 93
— maculatus. Dubois. 93

Coccysus. Savi.
— americanus. Bp. 94
— glandarius. Savi. 93

Coccysus pisanus. (Vieill.) 93

Coccyzius. Bp. = Coccyzus. Vieill.

Coccyzus. Vieill.
— americanus. Bp. 94
— dominicus. Nutt. 95
— erythrophthalmos. Bp. 95
— glandarius. Rüpp. 93
— pisanus. Vieill. 93
— pyrrhopterus. Vieill. 94

Coelebs. Cuv. = Fringilla coelebs. L. 304

Collurio. Hartl.
— major. Bélon. 132
— minor. Bélon. 134
— nubicus. Hartl. 138
— spinitorques. (Bechst.) 136

Collyrio. Möhr. = Lanius. L.

Colobates. Kaup.
— sulphurea. Kaup. 254

Coloeus. Kaup.
— frugilegus. Kaup. 149
— monedula. Kaup. 146

Columba. L. Briss.
— aegyptiaca. Lath. 341
— affinis. Blyth. 339
— alba. Temm. 343
— Amaliae. Br. 339
— americana. Kalm. 344
— antiquorum. Willugb. 337
— arborea. Br. 338
— cambayensis. Gm. 341
— canadensis. Gm. 344
— cavorum. Br. 338
— columbus. Kaup. 339
— cucculata. Blyth. 339
— dasypus. Blyth. 339
— domestica. L. 339
— dowraca. Hodgs. 343
— dubia. Br. 339
— Eversmanni. Br. 338
— ferrago. Eversm. 341
— galeata. Blyth. 339
— gelastes. Temm. 341
— glauconotos. Br. 339
— groenlandica. Briss. 607
— gutturosa. Blyth. 339
— gymnocyclus. Gr. 339

Columba gyratrix. Blyth. 339
— hispanica. Blyth. 339
— hispida. Blyth. 339
— intermedia. Bp. 339
— laticauda. Blyth. 339
— *livia. Briss. 339
— maculicollis. Wagl. 341
— *migratoria. L. 344
— migratoria. Selby. 340
— *oenas. L. 338
— *palumbus. L. 337
— pinetorum. Br. 337
— *risoria. L. 343
— rupestris. Br. 339
— *rupicola. Pall. 341
— Savignyi. Rchb. 341
— saxatilis. Briss. 338
— Schimperi. Bp. 339
— *senegalensis. L. 342
— suratensis. Vieill. 341
— sylvestris. Rchb. 340
— sylvestris. Stell. 341
— tabellaria. Blyth. 339
— torquata. Penn. 337
— turbida. Blyth. 339
— turcica. Blyth. 339
— turricola. Bp. 339
— *turtur. L. 340
— unicolor. Br. 339
— vulgaris. (Eyt.) 340
Colymbus. L.
— arcticus. L. 601
— *arcticus. Naum. 600
— atrogularis. E. v. Hom. 604
— atrogularis. M. u. W. 605
— auritus. Briss. 601
— auritus. L. 600
— *auritus. Gm. 601
— auritus. (Var. B.) L. 601
— balticus. Hornsch. 604
— borealis. Brünn. (J. Kl.) 603
— caspius. Gm. (J. Kl.) 599
— cornutus. Briss. 597
— *cornutus. Gm. 599
— cornutus minor. Briss. 599
— coronatus. Briss. 597
— *cristatus. L. 597
— cucullatus. Pall. 598
— fluviatilis. Briss. (J. Kl.) 602
Colymbus glacialis. L. 605
— grylle. L. 607
— hebridus. Gm. 602
— Holbölli. (Reinh.) 598
— hyemalis. Br. 605
— immer. L. (J. Kl.) 605
— longirostris. (Bp.) 598
— longvigia. Olaf. 610
— lumme. Brünn. 603
— macrorhynchos. Br. 604
— maximus. Br. 605
— megarhynchos. Br. 604
— microrhynchos. Br. 603
— *minor. Gm. (J. Kl.) 602
— minor. Briss. (J. Kl.) 599
— naevius. Pall. 598
— nigricans. Scop. 599
— nigricollis. (Sundev). 601
— nigrogularis. Dub. 604
— obscurus. Gm. (J. Kl.) 599
— parotis. Sparm. (J. Kl.) 598
— pyrenaeicus. Lapayr. 602
— *rubricollis. Gm. (J. Kl.) 597
— rufogularis. M. u. W. 603
— septentrionalis. L. 603
— stellatus. Brünn. (J. Kl.) 603
— striatus. L. 604
— subcristatus. Jacq. 598
— torquatus. Brünn. 605
— troile. Gm (part.) 609
— urinator. L. (J. Kl.) 597
Coprotheres. Rchb.
— pomarinus. Rchb. 566
Copsychus. Kaup.
— torquatus. Kaup. 167
Coracia. Vieill.
— erythrorhamphos. Vieill. 154
— gracula. Gr. 154
Coracias. L. Scop.
— bengalensis. Keulem. 96
— docilis. Gm. 154
— erythrorhamphos. (Vieill.) 154
— galbula. Bechst. 156
— garrula. L. 96
— germanicus. Br. 96
— glaucopterus. Br. 96
— gracula. Degl. 154
— loquax. Licht. 96

Coracias oriolus. Scop. 156
— planiceps. Br. 96
— viridis. Cuv. 96
Corax. Br.
— nobilis. A. Br. 150
— sylvestris minor. Br. 150
Cormoranus. Baill.
— carbo. Cab. Journ. (?) 590
— communis. Dub. 590
— crassirostris. Baill. 590
— cristatus. Dub. 591
— Desmaresti. Dub. 592
— leucogaster. Dub. 592
— pygmaeus. Dub. 593
Cornix. Briss.
— cinerea. Briss. 152
— frugilega. Briss. 149
— nigra. Klein. 151
Corone. Kaup.
— cornix. Kaup. 152
Corvus. L. Hasselq.
— advena. Br. 149
— aegyptiacus. A. Br. 152
— aegyptius. Hasselq. 97
— agrorum. Br. 149
— albiventer Vieill. 141
— assimilis. Br. 151
— atricapillus. Geoffr. 143
— brachyuros. Br. 150
— borealis albus. Briss. 150
— capitalis. Wagl. 148
— caryocatactes. L. 145
— clericus. Sparrm. 150
— cinereus. Br. 152
— collaris. Drum. 146
— *corax. L. 150
— corax, var. littoralis. Holböll. 150
— *cornix. L. 152
— corone. L. (Faun. Suec.) 149
— *corone. Lath. 151
— corone helveticus. Br. 151
— cyaneus. L. 140
— cyanus. Pall. 140
— *dauricus. Pall. 148
— docilis. Gm. 154
— eremita. Gm. 154
— erythrorhamphus. Vieill. 154
— *frugilegus. L 149
— garrulus. Briss. 142
Corvus glandrius. L. 142
— graculus. L. 154
— granorum. Br. 149
— hyemalis. Br. 151
— infaustus. L. 144
— leucomelas. Wagl. 150
— leucophaeus. Vieill. 150
— littoralis. Br. 150
— maximus. Scop. 150
— melanocephalos. Less. 140
— melanoleuca. Vieill. 141
— mimus. Pall. 144
— *monedula. L. 146
— monedula nigra. Schl. 147
— montanus. Br. 150
— morio. Forst. 148
— nucifraga. (Nils.) 145
— Panderi. Licht. 155
— peregrinus. Br. 150
— pica. L. 141
— pyrrhocorax. L. 153
— russicus. Gm. 144
— sibiricus. Gm. 144
— *spermologus. Vieill. 147
— subcornix. Br. 152
— subcorone. Br. 151
— sylvaticus. Gesn. 154
— sylvestris. Br. 150
— sylvestris minor. Br. 150
— tenuirostris. Br. 152
— torquatus. (Br.) 146
— umbrinus. Br. 150
— varius. Brünn. 150
Corydalla. Vig.
— agrorum. Br. 267
— arenaria. Br. 267
— arvensis. Br. 267
— campestris. Br. 267
— gracilis. Br. 267
— major. Br. (Spec.?) 267
— orientalis. Br. 268
— Richardi. Vig. 268
— rufescens. Br. 267
— septentrionalis. Br. 267
— striata. Br. 267
— subarquata. Br. 267
— Vierthaleri. Br. 268
Corydalis. Temm. = Alauda. L.
Corydon. Glog. = Alauda. L.

Coryphidea. Blyth. = Alauda. L.
Corytholaea. Heugl.
— Rueppelli. Heugl. 214
Corythornis. Kaup. = Alcedo. L.
Corythus. Cuv.
— angustirostris. Br. 326
— canadensis. Br. 326
— caucasicus. K. u. Bl. 328
— enuclator. Bp. (Amerika.) 326
— *enucleator. Cuv. 326
— erythrinus. K. u. Bl. 323
— githagineus. K. u. Bl. 320
— longicaudus. (Temm.) 321
— minor. Br. 326
— rhodochlamys. Brandt. 325
— roseus. Cuv. 324
— rubricilla. Brandt. 328
— sibiricus. Bp. 321
— splendens. Br. 326
Cosmonessa. Kaup.
— histrionica. Kaup. 518
Cosmonetta = Cosmonessa. Kaup.
Cossypha. Guér.
— gutturalis. Guér. 187
Cotile. Boie = Cotyle. Boie.
Coturnix. Briss.
— Baldami. Naum. 367
— *communis. Bonn. 367
— dactylisonans. Meyer. 367
— europaea. Sw. 367
— japonica. Temm. 367
— leucogenys. Br. 367
— major. Briss. 367
— media. Br. 367
— minor. Br. 367
— vulgaris. Flem. 367
Cotyle. Boie.
— cahirica. Pr. Max. 79
— fluviatilis. Br. 74
— littoralis. Hempr. u. Ehr. 74
— microrhynchos. Br. 74
— riparia. Boie. 74
— rupestris. Boie. 80
Craticornis. Gr. = Numenius. Briss.
Crex. Bechst. Licht.
— alticeps. Br. 464
— Bailloni. Licht. 466
— chloropus. Licht. 468
— herbarum. Br. 464
Crex porzana. Licht. 465
— *pratensis. Bechst. 464
— pusilla. Licht. 465
— pygmaea. Naum. 466
— vulgaris. Hartl. 464
Crithagra. Swains.
— serinus. Heugl. 317
Croicocephalus = Chroicocephalus. Eyt.
Crucirostra. Cuv.
— abietum. Meyer. 335
— balearica. A. v. Hom. (Var) 335
— bifasciata. Br. 336
— brachyrhynchos. Br. 334
— curvirostra. Cab. Journ. 335
— erythroptera. Br. 336
— intercedens. Br. 334
— leucoptera. Brandt. 336
— leucoptera. Cuv. 336
— longirostris. Br. 335
— major. Br. 334
— minor. Br. 335
— montana. Br. 335
— orientalis. Br. 336
— paradoxa. Br. 335
— pinetorum. Br. 335
— pinetorum. Meyer. 334
— pityopsittacus. Briss. 334
— rubrifasciata. Briss. 335
— subpityopsittacus. Br. 334
— taenioptera. Br. 336
— trifasciata. Br. 336
— vulgaris. Steph. 335
Crymophilus. Vieill.
— rufus. Vieill. 369
Cryptophaga. Cab. = [illegible]
— miliaria. Cab. 282
Cuculus. L.
— americanus. L. 94
— andalusiae. Briss. 93
— borealis. Pall. 92
— *canorus. L. 92
— canorus rufus. Gm. 82
— carolinensis. Briss. 94
— cinereus. Br. 92
— cinerosus. Temm. 94
— dominicensis. L. 94
— dominicus. Lath. 94
— erythrophthalmos. Wils. 95
— europaeus. Cab. Journ. 92

Cuculus flavirostris. Glog. 94
— *glandarius. L. 93
— gracilis. Br. 93
— hepaticus. Sparrm. 92
— indicus. Cab. (teste Heugl.) 92
— longipennis. Br. 92
— macrourus. Br. 93
— melissophanus. Vieill. 93
— phaeopterus. Rüpp. 93
— pisanus. Gm. 93
— rufus. Bechst. 92
— telephonus. Heine (teste Heugl.) 92
Culicipeta. Blyth.
— trochiloïdes. Blyth. 229
Cuncuma. Bp.
— albipes. Hodgs. 34
— macei. Bp. 34
— vocifer. Gr. 35
Cureus. Boie.
— americanus. Bp. 94
Curruca. Briss. Koch. Boie.
— albisiriata. Br. 219
— arundinacea. Briss. 246
— assimilis. Br. 222
— atricapilla. Briss. 213
— atricapilla communis. Br. 213
— brachyrhynchos. Br. 212
— caniceps. Br. 215
— cineracea. Br. 215
— cinerea. Briss. 215
— cinerea naevia. Briss. 237
— cinereocapilla. Br. 221
— conspicillata. Boie. 216
— dumetorum. Lath. 222
— fruticeti. Br. 215
— fusca. Hempr. u. Ehr. 247
— galactodes. Hempr. u. Ehr. 241
— galactodes var. syriaca. Hempr. u. Ehr. 241
— garrula. Briss. 222
— grisea. Br. 212
— Heinekeni. Jard. 213
— helena. Hempr. u. Ehr. 221
— hortensis. Koch. 212
— hortensis communis. Br. 212
— Jerdoni. Blyth. 221
— leucomelana. Hempr. u. Ehr. (?) 214
— leucopogon. Br. 219
— luctuosa. Br. (Afrika). 220
Curruca luscinia. Koch. 208
— manca. Hempr. u. Ehr. (Afrika) (?) 220
— Meisneri (Pässl.) 224
— melanocephala. Boie. 220
— minor. Briss. 219
— molaria. Br. 222
— momus, Hempr. u. Ehr. (Afrika) 220
— musica. Br. 221
— nigricapilla. Br. (!) 213
— nigricapilla. Br. (!) 220
— nisoria. Koch. 211
— obscura. Br. 222
— obsoleta. Br. 217
— orphea. Boie. 221
— passerina. Boie. 219
— philomela. Koch. 209
— pileata. Br. 213
— provincialis. Boie. 217
— rufa. Briss. 223
— ruficapilla. Br. 213
— Rueppelli. Bp. 214
— sarda. Boie. 218
— sepiaria. Briss. 204
— septentrionalis. Br. 222
— sibilatrix. Flem. 226
— subalpina. Boie. 219
— superciliaris. Br. 222
— sylvestris. (Meisn.) 224
— sylvia. Steph. 215
— undata. Br. 211
— undulata. Br. 211
— Vidali. A. Br. 221
— viridula. Hempr. u. Ehr. 224
Cursor. Wagl.
— charadrioïdes. Wagl. 379
— europaeus. Maum. 378
— isabellinus. Wagl. 378
Cursorius. Lath.
— aegyptiacus. Schl. 379
— brachydactylus. Br. 378
— *europaeus. Lath. 378
— gallicus. Bp. 378
— isabellinus. M. u. W. 378
— pallidus. Br. 378
Curvirostra. Skop.
— americana. (N. Amerika). 335
— crucirostra. Cuv. 335
— leucoptera. Wils. 336

Curvirostra pinetarum. Briss. 335
— pityopsittacus. Cuv. 334
Cyanecula. Br.
— calliope. Gr. 206
— coerulea. Br. 207
— coerulecula. Bp. (Sibirien). 207
— cyane. Bp. 207
— dichrosterna. Cab. (Afrika). 207
— leucocyanea. Br. 207
— longirostris. Br. 207
— major. Br. 207
— minor. Br. 207
— obscura. Br. 207
— orientalis. Br. 207
— suecica. Br. 207
— Wolfi. Br. 207
Cyanegula = Cyanecula. Br.
Cyanistns. Kaup.
— coerulescens. Br. 118
— coeruleus. Kaup. 118
— cyanus. Kaup. 120
— elegans. Br. 120
— salicarius. Br. 118
— ultramariuus. Bp. 119
— violaeeus. Br. 119
Cyanopica. Bp.
— Cooki. Bp. 140
— *cyanea. Bp. 140
— europaea. Schl. 140
— melanocephala. Dub. 140
— Pallasi. Bp. 140
Cyanopolius. Bp.
— Cooki. Bp. 140
Cyanopterus. Eyt.
— circia. Eyt. 499
— discors. Eyt. 500
— querquedula. Eyt. 490
Cychloïdes = Cichloïdes. Kaup.
Cychloselys = Cichloselys. Bp.
Cygnus. L.
— Altumi. Bäd. 477
— Bewicki. Yarr. 477
— ferus. Briss. 476
— gibbus. Bechst. 475
— immutabilis. Yarr. 475
— islandicus. Br. 477
— mansuntus. Ray. 475
— melanorhinus. Naum. 477
— melanorhynchos. M. u. W. 476
— *minor. Pall. K. u. Bl. 477
— *musicus. Bechst. 476
— musicus. Faber. 477
— musicus minor. Schl. 477
— *olor. Vieill. 475
— olor. Pall. 476
— olor immutabilis. Schl. 475
— olor var. minor. Pall. 475
— sibilus. Pall. 475
— tuberculirostris. Dub. 475
— xanthorhinus. Naum. 476
Cymochorea. Coues.
— leucorrhoa. Coues. 578
Cymotomus. Macgil.
— obscurus. Macgil. 583
Cynchramus. Boie.
— alnorum. Br. 290
— canneti. Br. 290
— intermedius. Heugl. 290
— lacustris. Br. 290
— lapponicus. Br. 290
— limicola. Br. 290
— miliaria. Bp. 282
— palustris. Br. 291
— phragmitis. Br. 290
— pityornis. Br. 289
— pseudo-pyrrhuloïdes. Br. 290
— pyrrhuloïdes. Cab. 291
— riparius. Br. 290
— rusticus. Gerbe. 292
— schoeniclus. Boie. 290
— septentrionalis. Br. 290
— stagnatilis. Br. 290
Cypselus. Ill.
— alpinus. Temm. 72
— *apus. Ill. 73
— dubius. Autin. 73
— fuscicollis. Br. 72
— gutturalis. Vieill. 72
— *melba. Ill. 72
— murarius. Temm. 73
— murinus. Br. 73
— niger. Leach. 73
— turrinum. Br. 73
— vulgaris Steph. 73
Daedalion. Savig.
— fringillarius. Savig. 23
— palumbarius. Savig. 21
Dafila. Leach.

Dafila acuta. Eyt. 494
— candacuta. Steph. 494
— caudata. Br. 494
— longicauda. Br. 494
— marmorata. Leach. 497
Dalcedo. Schl.
— fusca. Schl. 37
Dandalus. Boie.
— rubecula. Boie. 210
Daption. Steph.
— capensis. Steph. 573
Daulias. Boie.
— luscinia. Boie. 208
— philomela. Boie. 209
Dendrocopos. Koch = Dendrocopus. Koch.
Dendrocoptes. Cab.
— medius. Cab. 87
Dendrocopus. Koch.
— alpinus. Br. 83
— major. Koch. 85
— martius. Br. 83
— medius. Koch. 87
— minor. Koch. 88
— niger. Br. 83
— numidicus. Cab. 86 A.
— pinetorum. Br. 83
— tridactylus. Koch. 90
Dendrodromas. Kaup.
— leuconotus. Gr. 84
Dendroeca. Baird.
— virens. Baird. 126
Dendrofalco. Bp.
— arboreus. Br. 14
— concolor. Br. 16
— Eleonorae. Bp. 15
— gracilis. Br. 14
— hirundinarum. Br. 14
— subbuteo. Gr. 14
Dendroica = Dendroeca. Baird.
Dendronanthus. Blyth.
— arboreus. Blyth. 266
— trivialis. Blyth. 266
Deudronessa. Sw.
— sponsa. Sw. 504
Dendropicus. Cab.
Dendropicus minor. (Koch.) 88
— syriacus. Cab. 86. B.
Diomedea. L.
— adusta. Tschudi. 569
— albatrus. Pall. 569
— *chlororhynchus. L. 570
— chrysostoma. Forst. 570
— *exulans. L. 569
— presaga. Brandt. 570
— spadicea. Gm. 570
Dolometis. Cab.
— Cooki. Cab. 140
— cyana. Cab. (Asien). 140
Dominicanus. Bruch.
— cachinans. Bruch. 559
— fuscescens. Bruch. 560
— fuscus. Bruch. 560
— marinus. Bruch. 563
Dromolaea. Cab.
— leucura. Cab. 195
— leucocephala. Br. 195
— leucopygia. Br. 195
— monacha. Cab. 194
Drymoeca. Sw.
— cisticola. Gr. 248
Drymoica. Sw. = Drymoeca. Sw.
Dryobates. Boie.
— major. Boie. 85
— minor. Boie. 88
— tridactylus. Boie. 90
— villosus. Cab. 89
Dryocopus. Boie.
— alpinus. Br. 83
— martius. Boie. 83
— niger. Br. 83
— pinetarum. Br. 83
Dryopicus (os). Malh.
— martius. Malh. 83
Dryospiza. K. u. Bl.
— serinus. K. u. Bl. 317
Dryotomus. Sw.
— martius. Sw. 83
Dumeticola. Blyth.
— melanocephala. A. v. Hom. 220
— provincialis. A. v. Hom. 217
— sarda. A. v. Hom. 218

Dysonithia. Sw.
— infausta. Sw. 144
Dysporus. Ill.
— albus. Glog. 587
— bassanus. Ill. 587
— melanurus. Glog. 588

Ectopistes. Sw.
— migratorius. Sw. 344
Edolius. Less. = Oxylophus. Sw.
Egretta. Sw.
— alba. Bp. 448
— bubulcus. Cass. 452
— candidissima. Bp. 450
— comata. Sw. 453
— flavirostris. Bp. 451
— garzetta. Bp. 450
— jubata. Br. 450
— Lindermayeri. Br. 450
— melanorhyncha. Hartl. 449
— nigrirostris. Bp. 448
— nivea. Bp. 449
— nivea. Br. 450
— orientalis. K. u. Bl. 451
— plumbea. Sw. 457
Elanoïdes. Vieill.
— caesius. Vieill. 43
— furcatus. Vieill. 47
— yetapa. Vieill. 47
Elanus. Savig.
— caesius. Savig. 43
— *coeruleus. Bp. 43
— furcatus. Savig. 47
— melanopterus. Leach. 43
— minor. Bp. 43
Emberiza. Scop.
— albida. Blyth. 289
— antiquorum. Br. 285
— aquatica. Glog. 291
— arundinacea. Gm. 290
— atrata. Rafin. 291
— *aureola. Pall. 297
— auriceps. Blyth. 318
— badensis. Gm. 285
— baghaira. Frankl. 278
— barbata. Scop. 288
— Bonapartei. Barthél. 289
— borealis. Degl. 299
Emberiza borealis. Zetter. 292
— brachyrhynchos. Br. 283
— brumalis Scop. 308
— Buchanani. Blyth. 285
— *caesia. Cretzsch. 287
— calcarata. Temm. 300
— canigularis. Br. 288
— caspia. Ménétr. 291
— chlorocephala. Gm. 285
— *chrysophrys. Pall. 286
— *cia. L. 288
— cineracea. Br. 295
— *cinerea. Strickl. 295
— *cirlus. L. 284
— *citrinella. L. 283
— coccinea. Sand. 319
— dilicata. Br. 285
— dolichonia. Bp. (teste Degl.) 297
— Durazzi. Bp. (part.) 294
— Durazzi. Bp. (part.) 290
— cleathorax. Bechst. 284
— erythrogenys. Br. 283
— esclavonicus. (Degl.) 289
flava. Briss. 283
— *fucata. Pall. 293
— glacialis. Lath. 299
— granativora. Ménét. 298
— hordei. Br. 288
— *hortulana. L. 285
— hyemalis. L. 301
— icterina. Glog. 295
— intercedens. Br. 285
— intermedia. Mich. 290
— lapponica. Nils. 300
— lesbia. Gm. Calv. 292
— lesbia. Bp. (J. Kl.) 292
— leucocephala. Gm. 289
— linaria. Scoresby (err.) 311
— longirostris. Br. 283
— lotharingica. Gm. 288
— luctuosa. Scop. 128
— major. Br. 283
— malbeyensis. (Sparrm.) 285
— *melanocephala. Scop. 298
— melbyensis. Sparrm. 285
— *miliaria. L. 282
— montana. Gm. 299
— mustelina. Gm. 299
— nivalis. L. 299

Emberiza olivacea. Tick. 278
— *palustris. Savi. 291
— passerina. Pall. 290
— pinguescens. Br. 285
— *pityornis. Pall. 289
— planorum. Br. 283
— pratensis. Briss. 288
— provincialis. Gm. 293
— provincialis. Bp. (J. Kl.) 290
— *pusilla. Pall. 294
— pyrrhuloïdes. Pall. 291
— rufibarbata. Hempr. u. Ehr. 287
— rufigularis. Br. 287
— *rustica. Pall. 292
— *schoeniclus. L. 290
— slavonica. Degl. 289
— scotata. Bp. 290
— Selysi. Verany. 297
— sepiaria. Briss. 284
— septentrionalis. Br. 283
— sibirica. L. Erm. 297
— slavonica. (Degl.) 289
— sordida. Hodgs. 294
— *striolata. Temm. 296
— sylvestris. Br. 283
— Tunstalli. Lath. 285

Enalius. Kaup.
— Sabinei. Kaup. 432

Eniconetta. Gr.
— Stelleri. Gr. 519

Enneoctonus. Boie. Bp.
— auriculatus. Gurn. 135
— collurio. Boie. 136
— italicus. Bp. 134
— minor. Boie. 134
— nubicus Cab. 138
— personatus. (Schl.) 138
— phoeniceus. Bp. 137
— pomeranus. Cab. 135
— rufus. Bp. 135
— rutilans. Cab. 135
— spinitorques. (Bechst.) 136

Enotomothera. Rchb.
— smyrnensis. Rchb. 98

Entomobia. Cab.
— smyrnensis. Cab. 98

Ephialtes. K. u. Bl.
— *asio. Gr. 68

Ephialtes longipennis. Licht. 67
— ocreata. Licht. (?) 68
— *scops. K. u. Bl. 67

Epilaïs. Kaup.
— atricapilla. Cab. 213
— hortensis. Kaup. 212

Erana. Gray.
— cristata. Gray. 274

Eremophila. Boie.
— cornuta. Boie. (Amerika) 280

Erennetes. Ill.
— mauri. Gundl. 416
— petrificatus. Ill. 416
— pusillus. Cass. 416
— semipalmatus. Cab. 416
— semipalmatus. Gundl. 416

Erismatura. Bp.
— leucocephala. Eyt. 489
— mersa. Bp. 489

Erithacus = Erythacus. Sw.

Erodius. Macgil.
— albus. Macgil. 448
— garzetta. Macgil. 450
— victoriae. Macgil. 449

Erolia. Vieill.
— pygmaea. Gr. Br. 411
— varia. Vieill. 411
— variegata. Vieill. 411

Erythacus. Cuv.
— Cairei. Degl. 202
— cyanecula. Cuv. 207
— ignigularis. Dub. 206
— luscinia. Cuv. 208
— Moussieri. Gaill. 201
— obscurus. Dub. 207
— philomela. Degl. 209
— phoenicurus. Degl. 198
— *rubecula. Cuv. 210
— suecica. Dub. 207
— thithys. Degl. 202
— Wolfi. Dub. 207

Erythrina. Br,
— albifrons. Br. 323

Erythroleuca. Kaup.
— subalpina. Kaup. 219

Erythrophis = Erythrophrys. Sw.
Erythrophrys. Sw.

Erythrophrys americanus. Bp. 94
— carolinensis. Sw. 94
— erythrophthalmos. Bp. 95
Erythropus. Br.
— minor. Br. 20
— obscurus. Br. 20
— pallidus. Br. 20
— rufipes. Boie. 20
— vespertinus. Br. 20
Erythropygia. A. Smith.
— familiaris. Bp. 241
— galactodes. Bp. 241
Erythroscelus. Kaup.
— fuscus. Kaup. 425
— ocellatus. Bp. 425
Erythrospiza. Bp.
— caucasica. Dub. 328
— erythrina. Bp. 323
— githaginea. Bp. 320
— incerta. Degl. 323
— phoenicoptera. Bp. 322
— rhodochlamys. Brandt. 325
— rhodoptera. Heugl. 322
— rosea. Br. 324
— rosea. Blyth. 323
Erythrosterna. Bp.
— *parva. Bp. 127
Erythrothorax. Br.
— albifrons. Br. 324
— caucasicus. Br. 328
— erythrina. Bp. 323
— githaginea. Bp. 320
— roseus. Br. 324
— rubrifrons. Br. 323
Estrelata. Bp. = Aestrelata. Bp.
Eudocimus. Pucher.
— falcinellus. Pucher. 444
Eudromias. Boie.
— asiatica. Boie. 392
— mongolicus. Boie. 393
— montanus. Br. 391
— morinellus. Boie. 391
— stolidus. Br. 391
Eudromus = Eudromias. Boie.
Eudytes. Ill.
— *arcticus. Ill. 604
— balticus. Ill. 604
*Eudytes glacialis. Ill. 605
— rufigularis. (Meyer.) 603
— *septentrionalis. Ill. 603
Euliga = Euligia. Nutt.
Euligia. Nutt.
— Bartramia. 418
Eunetta. Bp.
— bimaculata. Bp. 496
— falcata. Bp. 495
— formosa. Bp. 496
Eupodotis. Gr.
— Macqueeni. Gr. 377
— undulata. Gr. 376
Eurinorhynchus. Nils.
— *griseus. Nils. 405
— orientalis. Blyth. 405
— pygmaeus. Bp. 405
Eurynorhynchus = Eurinorhynchus. Nils.
Euspiza. Bp.
— atricapilla. Br. 298
— aureola. Gr. 297
— cia. Blyth. 288
— dolichonia. Bp. (teste Degl.) 297
— dolychonica. Bp. (teste Degl.) 297
— hortulana. Blyth. 285
— melanocephala. Bp. 298
— pusilla. Blyth. 294

Falcinellus. Bechst.
— cursorius. Temm. 411
— Cuvieri. Bp. 411
— igneus. Gr. 444
— pygmaeus. Cuv. 411
Falco. L.
— abtetinus. Bechst. 12
— aegyptiacus. Gm. 46
— aegyptius. (Gm.) 46
— aequipar. Cuv. 51
— aeruginosus. L. 48
— *aesalon. Gm. 19
— alaudarius. L. 18
— albescens. Bodd. 21
— albicans. Gm. 49
— albicaudus. L. 32
— albicilla. L. 32
— albicollis. Lath. 49

Falco albicans. Gm. 49
— albidus. Gm. 39
— albus. Gm. 25
— alphanet. Schl. 11
— alticeps. Br. 40
— americanus. L. 25
— anatum. Br. 12
— apivorus. L. 38
— arboreus. Br. 14
— arcadicus. Linderm. 15
— arcadius. (Linderm.) 15
— arcticus. Holb. 8
— ardesiacus. (Vieill.) 16
— ardosiacus. Vieill. 16
— arundinaceus. Bechst. 48
— arundinaceus. Gm. 37
— ater. Daud. 45
— austriacus. L. 44
— badius. Gm. 22
— Bansci. Temm. 24
— barbarus. Bp. (part.) 11
— barbarus. L. 13
— barletta. Daud. 14
— belisarius. Levaill. 27
— biarmicus. Br. 11
— bohemicus. Gm. 49
— Bonellii. Temm. 30
— brachydactylus. Temm. 36
— brevipes. (Severtz.) 22
— Browni. Vieill. 22
— brunneus. Bechst. 18
— Buffoni. Gm. 49
— buteo. L. 39
— caesius. M. u. W. 19
— canadensis. L. 25
— *candicans. L. 8
— candicans islandicus. Schl. 8
— carbonarius. Licht. 24
— carolinensis. Gm. 37
— *cenchris. Naum. 17
— cervicalis. Licht. 11
— cherrug. Gr. 10
— chrysaëtos. L. 25
— cineraceus. Mont. 50
— cinerascens. L. 50
— cinereo-ferrugineus. Forst. 45
— cinereus. L. 39
— cinereus. It. Poseg. 49
— cirtensis. Le Vaill. 41
Falco clanga. (Pall.) 29
— coeruleus. Desf. 43
— communis. Gm. 12
— concolor. v. d. M. 15
— *concolor. Temm. 16
— cornicum. Br. 12
— cyaneus. L. 49
— cyanopus. Thien. 10
— cyanostolos. Br. 16
— cyanus. L. 49
— cygneus. Lath. 25
— dalmatinus. Rüpp. 51
— dichrous. Erh. 15
— dubius. Sparrm. 38
— ducalis. Licht. 30
— Dusumieri. Temm. 22
— Eleonorae. Frauenf. 13
— *Eleonorae. Géné. 15
— Eleonorae. Heugl. 16
— erythrurus. Rafin. 20
— europogistus. (Vieill.) 49
— fasciatus. Retz. 18
— fasciatus. Vieill. 39
— Feldeggi. Br. 13
— Feldeggi. Schl. 11
— ferox. L. 42
— Forskali. Gm. 46
— fulvus. L. 25
— furcatus. L. 47
— fusco-ater. M. u. W. 45
— fuscus. L. 39
— gabar. Lath. 24
— gallicus. L. 36
— gallinarius. Sw. (J. Kl.) 21
— gentilis. L. 21
— gentilis. Gm. (?) 12
— glaucopsis. Gm. 32
— glaucopsis. Merr. 39
— gracilis. A. Br. 16
— griseiventris. Br. 12
— griseus. Gm. 49
— groenlandicus. Br. 8
— gyrfalco. L. 12
— gyrfalco. Pall. 8
— *gyrfalco. Schl. 9
— gyrfalco arcticus. Schl. 9
— gyrfalco groenlandicus. Schl. 9
— gyrfalco islandicus. Schl. 9
— gyrfalco norwegicus. Schl. 9

Falco haliaëtos. L. 37
— hinnularis. Lath. 32
— hirundinarum. Br. 14
— horus. Heugl. 16
— hudsonius. L. 49
— imperialis. Bechst. 26
— incertus. Lath. 38
— interstinctus. Macl. 18
— islandicus. Brünn. 8
— kober. Vieill. 20
— Krameri. Kram. 48
— lacteus. Gm. 23
— lagopus. L. 40
— lanarius. Br. 10
— *lanarius. Schl. 11
— lanarius graecus. Schl. 11
— laniarius. Temm. 10
— laniarius. Naum. 10
— laniarius. Pall. 10
— leucocephalos. L. 33
— leucogenys. Br. 12
— leucopsis. Bechst. 36
— leucoryphos. Gm. 34
— lithofalco. L. 19
— longipes. Nils. 36
— macei. Temm. 34
— maculatus. Br. (teste v. Müller.) 23
— maculatus. L. 28
— macropus. L. 12
— magnus. L. 7
— marginatus. Lath. (J. Kl.) 21
— melanaëtos. Gm. L. (J.Kl.) 32
— melanaëtos. Retz. 25
— melanonotos. Lath. 25
— melanopterus. Daud. 43
— melanotis. Licht. 34
— migrans. Bodd. 45
— milvipes. Hodgs. 10
— milvus. L. 44
— minutus. L. 23
— mogilnik. Gm. 28
— montanus. Gm. 49
— mutans. Vieill. 39
— naevioïdes. Cuv. 27
— naevius. L. 28
— Naumanni. Fleisch. 17
— nepalensis. Hodgs. 50
— niger. Gm. 25
— nisus. L. 23
Falco nisus major. Becker. 23
— obsoletus. L. 39
— ossifragus. Wils. 33
— ossifragus. L. (J. Kl.) 32
— pallidus. Temm. 51
— palumbarius. L. 21
— parasiticus. Lath. 46
— parasitus. Daud. 46
— pennatus. L. 31
— peregrinator. Gr. 12
— *peregrinoïdes. Temm. 13
— *peregrinus. Briss. 12
— pinetarius. Shaw. 14
— piscator. Briss. 37
— planiceps. Br. 40
— plumiceps. Daud. 40
— pojana. Savi. 39
— polyorhynchos. Bechst. 38
— puniceus. Le Vaill. 13
— pygargus. Daud. 33
— pygargus. L. 49
— ranivorus. Daud. 49
— rapax. Temm. 27
— regalis. Temm. 25
— regulus. Pall. 19
— rubiginosus. Lath. 49
— rufescens. Sw. 18
— rufinus. Rüpp. 42
— rufipes. Besecke. 20
— rufus. L. 48
— *sacer. Briss. 10
— sacer. Schl. 10
— saqer. Heugl. 10
— senegallus. Cuv. 27
— shaheen. Jerd. 12
— sibiricus. Shaw. 19
— slavonicus. Lath. 40
— smirillus. Savi. 19
— sonniensis. Lath. 43
— stellaris. Gm. (?) 12
— strigiceps. Nils. 49
— *subbuteo. L. 14
— subtypius. Hodgs. 23
— sultaneus. Hodgs. 12
— tachardus. Daud. 41
— tanypterus. Licht. 11
— tibialis. Shaw. 16
— tinnuncularius. Vieill. 17
— tinnunculoïdes. Temm. 17

*Falco tinnunculus. L. 18
— torquatus. Briss. 49
— tunetanus. Rây. 13
— uliginosus. Wils. 49
— unicolor. Licht. 16
— variegatus. Gm. 39
— versicolor. Gm. 39
— *vespertinus. L. 20
— vocifer. Daud. 35
— vociferus. Lath. 43
— vulgaris. L. 39
— vulpinus. Licht. 41
— xanthonyx. Natt. 17

Fedoa. Leach.
— melanura. Steph. 438
— Meyeri. Steph. 437
— oedicnemus. Leach. 382
— pectoralis. Steph. 437
— tereckensis. Steph. 436

Feliceps. Barr. = Bubo. Cuv

Felivox. Bp.
— carolinensis. Bp.

Ficedula. Briss. Boie. Koch.
— abietina. Nils. 223
— ambigua. Schl. 233
— Bonellii. K. u. Bl. 227
— elaïca. Schl. 233
— fitis. Koch. 224
— hypolaïs. K. u. Bl. 230
— icterina. K. u. Bl. 225
— Nattereri. Dub. 227
— olivetorum. Schl. 232
— phoenicurus. Boie. 198
— polyglotta. Schl 231
— rufa. Koch. 223
— sibilatrix. Koch. 226
— suecica. Boie. 207
— sylvicola. Dub. 226
— trochilus. K. u. Bl. 224

Francolinus. Steph.
— francolinus. Cuv. 360
— tristriatus. Bp. 360
— *vulgaris. Steph. 360

Fratercula. Briss.
— arctica. Leach. 614
— corniculata. Brandt. 616
— glacialis. (Leach.) 615

Fregata. Barr.
Fregata aquila. Cuv. 589
— marina. Barr. 589

Fregilus. Cuv.
— alpestris. Br. 154
— erythropus. Sw. 154
— europaeus. Less. 154
— graculus. Cuv. 154
— himalayanus. Gould. 154

Fringilla. L.
— africana. Le Vaill. 305
— alpestris. Br. 304
— alpina. Scop. 308
— arctica. (Gr.) 303
— arctoa. Gr. 303
— argentoratensis. Gm. 309
— bononiensis. Gm. 333
— borealis. Br. 306
— borealis. Temm. 312
— brumalis. Bechst. 308
— calcarata. Pall. 300
— campestris. Schrank. 332
— canadida. Sparrm. 329
— *canescens. Selys. 312
— *cannabina. L. 309
— cannabina. Temm. 310
— *carduelis. L. 313
— *chloris. Ill. 307
— cisalpina. Temm. 330
— *citrinella. L. 308
— coccinea. (Selys.) 319
— coccothraustes. Ill. 327
— *coelebs. L. 304
— collaris. Lath. 203
— cristata. Briss. 323
— crocea. Vieill. 298
— dalmatica. Gm. 293
— domestica. L. 329
— elegans. Cab. Journ. 313
— enucleator. Meyer. 326
— erythrina. Meyer. 323
— flammea. Besecke. 306
— flammea. Retz. (L.) 323
— flavirostris. Br. 311
— *flavirostris. L. 310
— githaginea. Licht. 320
— hortensis. Br. 304
— hispanica Cab. Journ. 331
— hispaniolensis. Temm. 331
— hudsonia. Gm. 301

Fringilla hyemalis. L. 301
— incerta. Risso. 323
— islandica. Faber. 317
— italiae. Vieill. 330
— lapponica. L. 300
— leucura. Gm. 333
— *linaria. L. 311
— linota. Gm. 309
— lulensis. L. 306
— major. Br. 306
— minor. Br. 304
— montana. Briss. 300
— montana. L. 332
— *montifringilla. L. 306
— montium. Gm. 310
— Moreletti. Pucher. 304
— nivalis. Briss. L. 302
— nivalis. Wils. 301
— nobilis. Schrank. 304
— ocharea. Gm. 313
— ochracea. (Gm.) 313
— *orientalis. Eversm. 314
— petronia. L. 333
— pinetorum. Lepech. 297
— *pistacina. Eversm. 316
— *pusilla. Gr. 318
— pyrrhula. Temm. 319
— rhodoptera. Licht. 322
— sosea. Pall. 324
— rubripes. Cuv. 323
— rufescens. Br. 311
— salicicola. Vieill. 331
— sanguinea. Gould. 322
— sardoa. Savi. 331
— saxatilis. Koch. 302
— septentrionalis. Br. 306
— *serinus. L. 317
— sinensis. Gm. 315
— spinoïdes. Temm. 315
— *spinus. L. 315
— *spodiogena. Bp. 305
— spodiagenys. Bp. 305
— striolata. Sw. 296
— stulta. Gm. 333
— subulata. Ill. 314
— sylvestris. Br. 304
— sylvia. Scop. 304
— thebaïca. Hnmpr. u. Ehr. 320
Fringillaria. Sw.
Fringillaria caesia. Sw. 287
— saharae. (?) 296
— striolata. Sw. 29
Fringillarius. Ray.
— accipiter. Ray. 23
Frugilegus. A. Br.
— segetum. A. Br. 149
Fruticicola. Macgil.
— rubetra. Macgil. 197
— rubicola. Macgil. 196
Fulica. L.
— aethiops. Sparrm. 470
— aterrima. Retz. (L.) 470
— *atra. L. 470
— atrata. Pall.! 470
— chloropus. L. 468
— *cristata. Gm. 471
— fistulans. Gm. 468
— flavipes. Gm. 468
— fusca. Gm. (J. Kl.) 468
— leuconyx. Sparrm. 470
— maculata. Gm. 468
— major. Briss. 470
— mitrata. Licht. 471
— naevia. Gm. 467
— platyura. Br. 470
— porphyrio. Pall. 469
— pullata. Pall. 470
Fuligula. Steph.
— affinis. Eyt. 511
— albeola. Audub. 516
— Barrowi. Nutt. 515
— clangula. Audub. 515
— *collaris. Bp. 513
— *cristata. Steph. 512
— dispar. Steph. 519
— erythrocephala. Dub. 507
— *ferina. Steph. 507
— fusca. Bp. 523
— Gessneri. Jard. 510
— glacialis. Bp. 517
— histrionica. Audub. 518
— *Homeyeri. Bäd. 508
— islandica. Br. 510
— leucocephala. Dub. 489
— leuconotos. Br. 510
— leucophthalmos. Dub. 509
— lugubris. Dub. 523

*Fuligula marila. Steph. 510
— marila. Audub. 511
— *mariloïdes. Glog. 511
— marmorata. Gould. 497
— minor. Giraud. 511
— molissima. Bp. 520
— nigra. Dub. 524
— *nyroca. Steph. 509
— patagiatus. Br. 512
— perspicillata. Bp. 522
— ruficristata. Dub. 506
— *rufina. Steph. 506
— rufitorques. Bp. 513
— spectabilis. Bp. 521
— Stelleri. Bp. 519
Fulix. Baird.
— affinis. Baird. 511
— collaris. Baird. 513
— marila. Baird. 510
Fulmaria. Bp.
— pacifica. Bp. 572
Fulmarus. Steph.
— Auduboni. Bp. 572
— capensis. (Steph.) 573
— glacialis. Steph. 572
— glacialis, var. pacificus. Bp. 572
— meridionalis. Bp. 574
— minor. Bp. 572

Galeoscoptes. Cab.
— *carolinensis. Cab. 165
Galerida. Boie. = Galerita. Boie.
Galerita. Boie.
— abyssinica. Bp. (?) 274
— altirostris. Bp. 274
— anthirostris. Br. 272
— arborea. Boie. 272
— bifasciata. (Licht.) 269
— Boysi. Bp. 274
— cheendola. (Frankl.) 274
— cristata. Boie. 274
— cristatella. (Mus. Lugd.) 274
— flava. Br. 274
— isabellina. (Temm.) (Rüpp.) 273
— korinthiaca. Br. 274
— lutea. Br. 274
— major. Br. 274
— matutina. Bodd. 274
Galerita musica. Br. 272
— nemorosa. Br. 272
— nigricans. Br. 274
— pagorum. B. 274
— rufescens. Br. 274
— senegallensis. Briss. Bp. 274
— Theclae. Br. 274
— undata. Boie. 274
— viarum. Br. 274
Galgulus. Vieill.
— garrulus. Vieill. 96
Gallina. Storr.
— pratarola. Storr. 375
Gallinago. Briss. Leach.
— anglica. Briss. 407
— Brehmi. Br. 431
— brachyptera. Br. 430
— brachypus. Br. 431
— faeroensis. Br. 431
— gallinula. Bp. 433
— grisea. Dub. 434
— hyemalis. Bp. 430
— lacustris. Br. 431
— major. Leach. 430
— media. Leach. 431
— migratoria. Br. 431
— minima. Ray. 433
— minor. Briss. 433
— Montagui. Bp. 430
— nisoria. Br. 430
— peregrina. Br. 431
— Petenyi. Br. 431
— robusta. Br. 430
— Sabinei. Bp. 432
— scolopacinus. Bp. 431
— septentrionalis. Br. 431
— uliginosa. Br. 430
— vulgaris. Dub. 431
Gallinula. Briss.
— aquatica. Suto. 467
— Bailloni. Temm. 466
— *chloropus. Lath. 468
— communis. Dub. 468
— crex. Lath. 464
— cristata. Lath. 471
— flavipes. Lath. 468
— fistulans. Lath. 468
— fusca. Lath. (J. Kl.) 468

Gallinula leucothorax. Br. 467
— maculata. Br. 467
— maculata. Lath. 468
— major. Briss. 468
— maruetta. Briss. 467
— minuta. Br. 465
— minutissima. Br. 465
— parva. Br. 465
— porphyrio. Lath. 469
— porzana. Lath. 467
— punctata. Br 467
— pusilla. Bechst. 465
— pygmaea. Br. 466
— sericea. Willugb. 463

Gambetta. Koch. Kaup.
— calidris. Kaup. 424
— flavipes. Bp. 426
— limosa. Koch. 438

Ganga. Pall.
— chata. Pall. 347

Garrulus. Gesn. Briss.
— atricapillus. Gr. 143
— bohemicus. Gesn. 131
— cyanus. Temm. 140
— ferrugineus. Bechst. 144
— *glandarius. Vieill. 142
— glandarius, melanocephalus. Schl. 143
— iliceti. (Mus. Lugd.). 143
— *infaustus. Vieill. 144
— Krynicki. Kalen. (?) 143
— *melanocephalus. Géné. 143
— Panderi. Gr. 155
— picus. Drum. 141
— stridens. (Ebrenb.) 143

Garzetta. Kaup.
— alba. Kaup. 448
— egretta. Bp. 450
— immaculata. Bp. 450
— nigripes. Bp. 450
— orientalis. Bp. 441

Gavia. Möhr. Bp.
— atricilla. Macgil. 547
— Bonapartei. (Richards.) Blas. 550
— brachytarsa. Bp. 564
— cinerea. Briss. 554
— cinerea nivea. Briss. 554
— eburnea. Boie. 564
Gavia fusca. Briss. 543
— gelastes. Bruch. 555
— grisea. Briss. 560
— ichtyaëtos. (Pall.) Blas. 553
— Lambruschini. Rchb. 555
— melanocephala. Bp. 551
— minuta. Macgil. 552
— nivea. Br. 561
— ridibunda. Briss. 548
— ridibunda phoenicopus. Briss. 548

Gavina. Bp.
— Audouini. Bp. 557
— cana. Bruch. 556
— Heinei. Bruch. 556

Gecinus. Boie.
— brachyrhynchos. Br. 81
— caniceps. Br. 82
— canus. Boie. 82
— frondium. Br. 81
— pinetorum. Br. 81
— virescens. Br. 81
— viridicanus. Br. 82
— viridis. Boie. 81

Gelastes. Bp.
— columbinus. Bp. 555
— gelastes. (Licht.) 555
— Lambruschini. Bp. 555

Gelochelidon. Br.
— agraria. Br. 533
— anglica. Br. 533
— aranea. Br. 533
— baltica. Br. 533
— leucopareja. (Nutt.) 539
— leucoptera. (Meissn. u. Schinz.) 540
— meridionalis. Br. 533
— nigra. (Briss.) 541
— palustris. Macgil. 533
— velox. Br. 533

Genaëa. Pr. Max.
— venerata. Pr. Max. (teste Heugl.) 11

Gennaja. Kaup.
— barbata. Bp. 13
— cervicalis. Kaup. 13
— lanarius. Bp. 11
— lanarius. Kaup. 10
— sacra. Bp. 10

Geronticus. Gr.

Geronticus aethiopicus. (Lath.) 443
— religiosus. Hartl. 443
Glandarius. Koch.
— caryocatactes. Cab. Journ. 145
— fasciatus. Br. 142
— garrulus. Cab. Journ. 142
— germanicus. Br. 142
— infaustus. Glog. 141
— leucocephalos. Br. 142
— melanocephalos. (Génè.) 143
— pictus. Koch. 142
— pictus, var. Koch. 143
— robustus. Br. 142
— septentrionalis. Br. 142
— taeniurus. Br. 142
— vulgaris. Br. 142
Glareola. Briss.
— austriaca. L. 380
— limbata. Rüpp. (Spec.?) 380
— *melanoptera. Nordm. 381
— naevia. Briss. (J. Kl.) 380
— nivea. Gm. 380
— Nordmanni. Fisch. 381
— Pallasi. Bruch. 381
— *pratincola. L. 380
— pratincola. Pall. 381
— senegalensis. Br. 380
— torquata. M. u. W. 380
— torquata. Werner. 381
Glaucidium. Boie.
— athene. E. v. Hom. 55
— dasypus. E. v. Hom. 57
— microrhynchon. Br. 54
— passerinum. Boie. 51
— pygmaeum. Br. 54
Glaucion. Briss. Kaup.
— clangula. Kaup. 514
— islandicum. K. u. Bl. 515
Glaucopteryx. Kaup.
— Swainsoni. Kaup. 51
Glaucus. Bruch.
— argentatus. Bruch. 558
— Audouini. Bruch. 557
— canus. Bruch. 556
— consul. Bruch. 561
— glacialis. Bruch. 562
— lacrymosus. Bruch. 556
— leucophaeus. Bruch. 559
Glaucus leucopterus. Bruch. 562
Glottis. Koch.
— albicollis. Br. 422
— canescens. Gr. 422
— chloropus. Nils. 422
— fistulans. Br 422
— flavipes. Gundl. 426
— floridanus. Bp. 422
— grisea. Br. 422
— Horsfieldi. Gr. 422
— natans. Koch. 422
— niveïgula. Hodgs. 422
— semipalmatus. Nils. 429
— stagnatilis. Koch. 423
— Vigorsi. Gr. 422
Glycispina. Cab.
— caesia. Cab. 287
— cia. (L.) 288
— hortulana. Cab. 285
Gracula. Gm. Koch.
— atthis. Gm. 97
— eremita. Koch. 154
— rosea. Cuv. 157
Graculus. Gr.
— carbo. Gr. 590
— cristatus. Gr. 591
— cristatus Desmaresti. Bp. 592
— Desmaresti. Gr. 592
— leucogaster. (Cara.) 592
— Linnaei. Gr. 591
— pygmaeus. Dub. 593
Granativora. Bp.
— melanocephala. Bp. 298
Graucalus. Gr. = Graculus. Gr.
Grus. Briss.
— *antigone. Pall. 371
— balearica. Aldrov. 373
— cinerea. Br. 369
— *cinerea. Bechst. 369
— communis. Bechst. 369
— gigantea. Vieill. 372
— *leucogeranus. Pall. 372
— numidica. Briss. 370
— orientalis. Frankl. 371
— orientalis, indica. Briss. 371
— pavonia. Wagl. 373
— torquata. Vieill. 371

*Grus virgo. Pall. 370
— vulgaris. Pall. 369
Grylle. Brandt.
— carbo. Brandt. 608
— columba. Bp. 607
Guinetta. Gr. = Actitis. Boie.
Gulosus. Montag. = Halieus. Ill.
Gypaëtos. Storr.
— alpinus. Daud. 7
— aureus. Daud. 7
— *barbatus. Cuv. 7
— barbatus meridionalis. Schl. 7
— castaneus. Daud. 7
— grandis. Storr. 7
— haemahalanus. Hutt. 7
— leucocephalus. M. u. W. 7
— melanocephalus. M. u. W. (J. Kl.) 7
— meridionalis. Br. 7
— nudipes. Br. 7
— occidentalis. Schl. 7
— percnopterus. Gesn. 5
Gyps. Savig. Bp.
— albicollis. Br. 1
— cinereus. Bp. 4
— *fulvus. Gr. 1
— Holbei. Lath. 1
— magnificus. v. Müll. 2
— occidentalis. Bp. 1
— *Rueppelli. A. Br. 2
— vulgaris. Savig. 1
— vulgaris. Bp. (Cat. Parz.) 4
Gyrfalco. Briss. Flem. = Hierofalco. Cuv.

Haematopus. L.
— balticus. Br. 399
— hypoleucos. Pall. 399
— longirostris. Swinh. 399
— orientalis. Br. 399
— *ostralegus. L. 399
Haematornis. Less.
— aurigaster. Sw. 162
— chrysorrhoëus. Sw. 162
— chrysorrhoïdes. Lafr. 162
— lugubris. Less. 161 A.
Haemorrhous. Sw.
— roseus. Jerd. 323
Halcyon. Sw.
— fusca. Gr. 98
— smyrnensis. Steph. 98
Haliaëtos. Savig.
— *albicilla. Boie. 32
— albipes. Hodgs. 34
— borealis. Br. 32
— cinereus. Br. 32
— clamans. Br. 35
— fulviventer. Vieill. 34
— funereus. Br. 32
— groenlandicus. Br. 32
— islandicus. Br. 32
— lanceolatus. Hodgs. 34
— *leucocephalus. Cuv. 33
— *leucoryphus. Brandt. 34
— macei. Less. 34
— nisus. Savig. 32
— orientalis. Br. 32
— Pallasi. Dub. 34
— unicolor. Gr. 34
— *vocifer. Vieill. 35
— Washingtoni. Audub. 33
Haliaeus = Halieus. Ill.
Haliaëtor. Heine.
— pygmaeus. Heine. 593
Halieus. Ill.
— africanus. Rüpp. 593
— *carbo. Ill. 590
— cormoranus. Naum. 590
— *cristatus. Glog. 591
— *Desmaresti. Glog. 592
— graculus. Ill. 591
— leucogaster. Glog. 592
— melanognathus. Bp. 593
— niger Bp. 593
— *pygmaeus. Ill. 593
Haliplana. Wagl.
— fuliginosa. Wagl. 542
Halyplana = Haliplana. Wagl.
Harelda. Leach.
— brachyrhynchos. Br. 517
— Faberi. Br. 517
— *glacialis. Leach. 517
— *histrionica. Leach. 518
— hyemalis. Br. 517
— megauros. Br. 517
— musica. Br. 517

Harelda Stelleri. Leach. 519
Harporhynchus. Cab.
— rufus. Cab. 163
Heleia. Hartl.
— Mülleri. Hartl. (Var.) 228
Helodromas. Kaup.
— ochropus. Kaup. 428
Hemipalama. Bp.
— minor. Gundl. (Var.) 416
— semipalmata. Bp. 416
Hemipodius. Temm.
— albigularis. (Malh.) 368
— andalusicus. (Gm.) 368
— gibraltariensis. (Gm.) 368
— lunatus. Temm. 368
— sylvaticus. (Desf.) 368
— tachydromus. Temm. 368
Heniconetta. Agass.
— Stelleri. Agass. 519
Herelda = Harelda. Leach.
Herodias. Boie.
— alba. Gr. 448
— candida. Br. 448
— candidissima. Boie. 450
— egretta. Boie. 448
— flavirostris. Hartl. 451
— garzetta. Boie. 450
— immaculata. Gould. 451
— jubata. Br. 450
— Lindermayeri. Br. 450
— nivea. Br. 450
— orientalis. Gr. 451
— Sturmi. Cab. 457
Heteroclitus. Vieill.
— tartaricus. Vieill. 345
Heteropoda. Nutt.
— mauri. Bp. 416
— semipalmata. Gr. 416
Heterops. Hodgs.
— cristatus. Hodgs. 274
Heteropygia. Elliot.
— Bonapartei. Coues. 413
— Cooperi. Coues. 412
Hiaticula. Gray.
— albifrons. (M. u. W.) 394
— annulata. Möhr. 395
Hiaticula cantiana. Cass. 394
— curonicus. v. Mart. 397
— fluviatilis. (Bechst.) 397
— Leschenaulti. Hartl. 393
— longipes. v. Mart. 390
— minor. Möhr. 397
— semipalmata. Gr. 396
— torquata. Gr. 395
Hieraëtos. Kaup.
— Bonellii. Kaup. 30
— minutus. Br. 31
— pennatus. Kaup. 31
Hierofalco. Cuv.
— arcticus. Br. 8
— candicans. Cuv. 8
— groenlandicus. Br. 8
— gyrfalco. Bp. 9
— Islandicus. Cuv. 8
Himantopus. Briss.
— albicollis. Vieill. 402
— atropterus. M. u. W. 402
— brasiliensis. Br. 402
— brevipes. Br. 402
— candidus. Bonnat. 402
— leucocephalus. Br. 402
— longipes. Br. 402
— melanocephalus. Br. 402
— melanopterus. Meyer. 402
— Plinii. Flem. 402
— *rufipes. Bechst. 402
— vulgaris. Bechst. 402
Hirundo. L. Pall.
— alpestris. Pall. 75
— alpina. Scop. 72
— apus. L. 73
— apus carolinensis. Briss. 76
— Boissonneauti. Temm. 79
— cachirica. (Licht.) 79
— *cahirica. Licht. 79
— capensis. Durazzo. 75
— caprimulgus. Pall. 69
— castanea. Less. 79
— chalybea. Pr. Max. 76
— cinerea. Vieill. 74
— coerulea. L. 75
— coerulea. Vieill. 76
— daurica. Lath. 75
— daurica. Savi. 75

Hirundo domestica. Pall. 78
— gularis. Steph. 72
— inornata. Jerd. 80
— lagopoda. Pall. 77
— ludoviciana. Cuv. 76
— melba. L. 72
— minor. Briss. 77
— montana. Gm. 80
— pratincola. L. 380
— *purpurea. L. 76
— Riocouri. Savig. 79
— *riparia. L. 74
— riparia americana. Audub. 74
— *rufula. Temm. 75
— *rupestris. Scop. 80
— rupicola. Hodgs. 80
— rustica. Briss. 77
— *rustica. L. 78
— rustica orientalis. Schl. 79
— Savignyi. Leach. 79
— subis. L. 76
— *urbica. L. 77
— versicolor. Vieill. 76
— violacea. Gm. 76

Histrionicus. Less.
— torquatus. Bp. 491

Hobara = Houbara. Bp.

Homoptilura. Gr.
— Sabinei. Gr. 432

Hoplopterus. Bp.
— armatus. Br. 383
— *spinosus. Bp. 383

Hortulanus. Briss. Bp.
— arundinaceus. Briss. 290
— caesius. Bp. 287
— chlorocephalus. Bp. 285
— glacialis. Leach. 299
— montanus. Leach. 300
— nivalis. Briss. 299

Houbara. Bp.
— Macqueeni. Bp. 377
— marmorata. Hard. 377
— ornata. Br. 377
— undulata. Gr. 376

Hyas. Glog.
— *aegyptiaca. Cab. 379
— aegyptius. (Cab.) 379
— melanocephalus. Glog. 379

Hybris. Nitzsch.
— flammea. Nitzsch. 62

Hydrobata. Vieill.
— albicollis. Vieill. 250
— aquatica. Gr. 250
— bicolor. Vieill. 250
— cinclus. Gr. 250
— melanogaster. Degl. 250

Hydrobates. Boie.
— faeroensis. Br. 576
— Leachi. Boie. 578
— pelagica. Boie. 576

Hydrocecropis. Boie.
— arctica. (Temm.) 536
— Dougalli. Boie. 535
— fluviatilis. (Naum.) 537
— hirundo. Boie. 537
— macrura. (Naum.) 536

Hydrocecrops = Hydroceoropis. Boie.

Hydrochelidon. Boie.
— cinerea. Dub. 539
— Delalandi. Bp. 539
— fissipes. Gr. 541
— fluviatilis. (Gould.) 539
— fuliginosum. Bp. 542
— hybrida. Boie. 539
— leucogenys. Br. 539
— leucopareja. (Natt.) 539
— leucoptera. Boie. 540
— nigra. Gr. 540
— nigricans. Br. 541
— nigrum. Boie. 541
— nilotica. Br. 539
— obscura. Br. 541
— pallida. Br. 541
— plumbea. (Wils.) (America.) 541
— subleucoptera. Br. 540

Hydrocolaeus. Kaup.
— minutus. Kaup. 552

Hydrocorax. Vieill.
— carbo. Vieill. 590
— cristatus. Vieill. 591
— graculus. Vieill. 591
— leucogaster. Vieill. (J. Kl.) 591
— niger. Vieill. 593
— pygmaeus. Vieill. 593

Hydrogallina. Lacep. = Gallinula. Briss.

Hydroictinia. Kaup.
— atra. Kaup. 45
— parasitica. Kaup. 46
Hydroprogne. Kaup.
— caspia. Kaup. 530
Hypocentor. Cab.
— aureolus. Cab. 297
— chrysophrys. Bp. 286
— dolichonius. Bp. 297
— fucatus. Cab. 293
— rusticus. Cab. 292
Hypolaïs. Br.
— alticeps. Br. 230
— ambigna. Degl. 233
— Arigonis. A. Br. 234
— caligata. Gerbe. 235
— cinerascens. Selys. 234
— elaeica. (Cab.) 233
— *elaïca. Cab. 233
— hortensis. Br. 230
— icterina. Degl. 230
— media. Br. 230
— *olivetorum. Gerbe. 232
— opaca. Cab. (teste E. v. Homeyer.) 234
— *pallida. Gerbe. 234
— planiceps. Br. 230
— *polyglotta. Gerbe. 231
— Preglii. Frauenf. 233
— salicaria. Bp. 230
— scita. Gerbe. 235
— Verdoti. Jaub. 233
— *vulgaris. Br. 230
Hypotriorchis. Kaup.
— aesalon. Kaup. 19
— ardesiacus. Bp. 16
— concolor. Gr. 16
— Eleonorae. Boie. 15
— lithofalco. Gr. 19
— subbuteo. Boie. 14
Hypsibates. Nitzsch.
— himantopus. Nitzsch. 402

Ibis. Ill.
— aethiopicus. Bp. 443
— candida. Perr. 461
— castanea. Br. 444
— falcinellus. Vieill. 444
— ignea. Leach. 444
Ibis Ordi. Bp. (Amerika.) 444
— *religiosa. Cuv. 443
— sacra. Temm. 444
Ichtyaëtos. Kaup.
— ichtyaëtos. (Pall.) 553
— minor. Schl. (Bengalen) 553
— Pallasi. Kaup. 553
Ichtyaëtos. Lafres. = Pandion. Savig.
Icterus. Briss.
— phoeniceus. Daud. 160
— ptero-phoeniceus. Briss. 160
Iduna. K. u. Bl.
— caligata. K. u. Bl. 235
— *salicaria. Cab. 235
Iliacus. O. de Murs.
— musicus. O. d. Murs. 178
Inx = Iynx. Glog.
Ipsidina. (Kaup.) = Ipsida. Sw.
Irania. de Filip.
— Finoti. de Filip. 187
Ispida. Sw.
— alcyon. Sw. 100
— bicincta. Sw. (J. Kl.) 99
— bitorquata. Sw. (J. Kl.) 99
— ludoviciana. Gm. 100
— senegalensis. Briss. 97
— smyrnensis. Briss. 98
Ispidina. Kaup. = Ispida. Sw.
Iunx. L. = Iynx. L. Glog.
Ixocossyphus. Kaup.
— viscivorus. Kaup. 171
Ixos. Temm.
— *aurigaster. Gr. 162
— aurigaster. Sclat. 161 B.
— auriventris. Vieill. 162
— barbatus. Bp. 161 A.
— chrysorrhoeus. Temm. 162
— crocorrhous. Gr 162
— haemorrhous. Vig. 162
— inornatus. Fras. 161 A.
— Levaillanti. Temm. 161 B.
— *nigricans. Bp. 161 B.
— *obscurus. Temm. 161 A.
— valombrosae. Bp. 161 B.
— xanthopygios. Hempr. u. Ehr. 161 B.
Iynx. L. Glog.

Iynx japonica. Bp. 91
— major. Br. 91
— punctatus. Br. 91
— *torquilla. L. 91
Junco. Sclat.
— hyemalis. Sclat. 301
Junx. Rchb. = Iynx. Glog.
Jynx. Rchb. = Iynx. Glog.
Ktinorhynchus. Eyt.
— strepera. Eyt. 498
Labbus. Rafin. = Lestris. Ill.
Lagopus. Briss.
— *albus. Vieill. 350
— *alpinus. Nils. 348
— alpinus minor. Br. 348
— brachydactylus. Br. 350
— groenlandicus. Br. 350
— hemileucurus. Gould. 349
— hyperboreus. Sund. 348
— islandicus. Br. 349
— *islandorum. (Faber.) 349
— montanus. Br. 348
— mutus. Leach. 348
— Reinhardti. Br. 350
— rupestris. Vieill. 348
— saliceti. Richards. 350
— *scoticus. Leach. 351
— subalpinus. (Nils.) 350
— vulgaris. Vieill. 348
Laïscopus. Glog.
— alpinus. Glog. 203
Lanarius. Briss.
— albicans. Briss. (?) 49
— cinereus. Briss. 11
Laniarius. Briss.
— cinereus. Briss. 11
Laniarius. Vieill.
— erythropterus. A. Br. 139
Lanius. L.
— aeruginosus. Klein. 136
— albicollis. Pr. Max. 138
— auriculatus. S. Müll. 135
— badius. Hartl. 135
— biarmicus. L. 123
— brubru. Sibth. 138
Lanius castaneus. Hahn. 135
— caudatus. L. 123
— cinereus. Briss. 132
— *collurio. L. 136
— collurio rufus. Gm. 135
— collurio, var. senegalensis. Gm. 135
— cognotus. Br. 135
— coronatus. Vieill. 139
— *cucullatus. Temm. 139
— deserti. Hempr. 138
— dumetorum. Br. 136
— erythropterus. Shaw. 139
— *excubitor. L. 132
— eximius. Br. 134
— flavescens. Hempr. u. Ehr. 134
— garrulus. L. 131
— glandarius. Nils. 142
— graecus. Br. 134
— infaustus. Gm. (Gm. L. S.) 186
— infaustus. L. (Faun. Suec.) 144
— italicus. Lath. 134
— leucometopon. v. d. M. 138
— leucopterus. Pr. Max. 138
— longipennis. Blyth. 134
— major. Pall. Br. 132
— melanocephalos. Temm. 139
— melanopterus. Br. 132
— melanotos. Br. 135
— *meridionalis. Temm. 133
— *minor. L. 134
— nigrifrons. Br. 134
— nubicus. Licht. 138
— paradoxus. Br. 135
— *personatus. Temm. 138
— *phoenicurus. Pall. 137
— pinetorum. Br. 134
— pomeranus. Sparr. 135
— rapax. Br. 132
— ruficeps. Bechst. 135
— ruficollis. Shaw. 135
— *rufus. Briss. 135
— rutilans. Temm. 135
— rutilus. Lath. 135
— senegalensis. Briss. 139
— senegalus Lath. (?) 139
— septentrionalis. Gm. 132
— spinitorques. Bechst. 136
— superciliosus. Br. 135
— tschagra. Schl. 139

Lanius vigil. Pall. 134
Laroïdes. Br.
— americana. Br. 558
— argentaceus. Bp. 558
— argentatoïdes. Br. 558
— argentatus. Bruch. 558
— argenteus. Br. 558
— assimilis. Br. 560
— Audouini. Br. 557
— cachinans. Bruch. 559
— canescens. Br. 556
— canus. Br. 556
— fuscescens. Br. 560
— fuscus. Br. 560
— glaucoïdes. Br. 562
— glaucus. Bruch. 561
— harengorum. Br. 560
— lacrymosus. Br. 556
— leucophaeus. Bp. 559
— leucopterus. Br. 562
— major. Br. 558
— melanotus. Br. 560
— Michahellesi. Bp. 559
— minor. Br. 554
— nigridorsalis. Br. 560
— procellosus. Br. 556
— rissa. Br. 554
— subleucopterus. Br. 562
— tridactylus. Br. 554
Laropis. Wagl.
— anglica. Wagl. 533
Larus. L.
— affinis. Reinh. 558
— arcticus. Macgil. 561
— argentaceus. Br. 558
— argentatoïdes. Richards. 548
— argentatoïdes. Br. 558
— *argentatus. Brünn. 558
— argentatus. Montag. 560
— argentatus. Sabine. 562
— argenteus. Br. 558
— atricilla. Temm. 557
— *atricilla. L. 547
— atricilla. Pall. (S. Kl.) 548
— atricilla. v. d. M. 549
— atricilloïdes. Falk. 552
— *Audouini. Payr. 557
— *Bonapartei. Richards. 550
— borealis. Bruch. 558
— brachyrhynchos. Gould. 554
— brachytarsus. Holb. 564
— brevirostris. Brandt. 554
— cachinans. Pall. 559
— candidus. Fabr. 564
— canescens. Bechst. 549
— *canus. L. 556
— canus. Pall. 554
— canus major. Midd. 556
— *capistratus. Temm. 549
— capistratus. Bp. 550
— Catesbyi. Bp. 547
— catarrhactes. L. 565
— chalopterus. Licht. 562
— cinerarius. Bechst. 549
— cinerarius. Pall. (W. Kl.) 548
— cinereus. Leach. 560
— cinereus. Briss. 558
— cinereus. Scop. 556
— citrirostris. Schimp. 556
— columbinus. Golowatsch. 555
— consul. Boie. 561
— crepidatus. Gm. (J. Kl.) 567
— cyanopus. Bechst. 556
— cyanorhynchus. M. u. W. 556
— d'Orbignyi. Audub. 552
— dominicanus. Licht. 563
— *eburneus. Gm. 564
— epargyrus. Licht. 560
— erythropus. Gm. 549
— Fabrici. Br. 563
— flavipes. M. u. W. 560
— fuscescens. Licht. 560
— *fuscus. L. 560
— fuscus. Briss. 565
— fuscus. Penn. 558
— gavia. Pall. 554
— *gelastes. Licht. 555
— Genei. de Breme. 555
— giganteus. Benick. 561
— glacialis. Bruch. 562
— glacialis. Benick. 561
— glacialis. Macgil. 561
— glaucoïdes. Temm. 562
— *glaucus. Brünn. 561
— glaucus. Retz. 558
— grallarius. (Mus. Lugd.) 555
— griseus. Briss. 560
— Heinei. E. v. Hom. 556

Larus hybernus. Gm. (J. Kl.) 556
— hyemalis. Gm. 556
— *ichtyaëtos. Pall. 553
— ichtyceus. L. 553
— islandicus. Edmonst. 562
— kamtschatkensis. Bp. 556
— Lambruschini. Bp. 555
— leuceretes. Schleep. 561
— leucocephalos. Briss. 555
— *leucophaeus. Licht. 559
— *leucophthalmus. Licht. 546
— *leucopterus. Faber. 562
— leucopterus. Vieill. 561
— leucopterus minor. Bp. 562
— maculatus. Bodd. 563
— *marinus. L. 563
— maximus. Leach. 563
— medius. Br. 561
— *melanocephalus. Natt. 551
— melanorhyrhus. Temm. 550
— melanotis. Rchb. 555
— Michahellesi. Bruch. 559
— minor. Br. 561
— *minutus. Pall. 552
— minutus. Sabine. 550
— Mülleri. Br. 563
— naevius. Gm. L. (J. Kl.) 563
— naevius. Pall. (W. J. Kl.) 548
— niger. Briss. 563
— nigripallus. Dub. 563
— nigrotis. Less. 552
— niveus. Br. 564
— niveus. v. Mart. 564
— niveus. Pall. 556
— Orbignyi. Audub. 552
— parasiticus. L. 567
— Payraudeaui. Vieill. 557
— pelagicus. Angl. (teste Bruch.) 563
— personatus. Bruch 547
— plumbiceps. Temm. 547
— poliocephalus. Prinz Max. 547
— pomarinus. M. u. W. 566
— procellosus. Bechst. (J. Kl.) 556
— pygmaeus. Borg. 552
— Richardsoni. Wils. 544
— ridibundus. Wils. 547
— *ridibundus. L. 548
— ridibundus minor. Schl. 549
— risorius. Licht. 548
Larus rissa. Brünn. 554
— roseus. Géné. 555
— roseus. Jard. u. Selb. 544
— *Rossi. Richards. 544
— rubiventris. Vieill. 555
— *Sabinei. Leach. 545
— septentrionalis. Lawr. 554
— serranus. Bruch. 547
— subulirostris. Bp. 550
— tenuirostris. Temm. 555
— torquatus. Pall. 554
— *tridactylus. L. 554
— varius. Briss. 563
— vetula. Mus. Paris. 563

Larva. Vieill. = Mormon. Ill.

Leimoniptera. Kaup.
— pratensis. Kaup. 264

Leimonites. Kaup.
— Temminckii. Kaup. 415

Leptoplectron. Rchb. = Plectrophanes. M. u. W.

Lepturus. Briss.
— aethereus. Möhr. 586

Lestris. Ill.
— antarcitus. Gould. 565
— arctica. Dub. 566
— Beneckeni. Br. 567
— Boiei. Br. 567
— brachyrhynchos. Br. 567
— *Buffoni. Boie. 568
— Brissoni. Boie. (teste Degl.) 568
— catarrhacta. (Ill.) 565
— *catarrhactes. Ill. 565
— cephus. Sw. 567
— cephus. K. u. Bl. 568
— cepphus, Brünn. 568
— crepidata. Br. 568
— crepidata. Degl. 566
— fusca. Dub. 565
— Hardyi. Bp. 568
— Lessoni. Degl. 568
— longicauda. Dub. 568
— macropterus. Br. 567
— parasita. K. u. Bl. 567
— *parasitica. Ill. 567
— parasitica. Sw. 568
— *pomarina. Temm. 566

Lestris Richardsoni. Sw. 567
— Schleppi. Br. 568
— skua. (Brünn.) 565
— sphaeriurus. Br. 566
— spinicauda. Hardy. 568
— striatus. Eyt. 566
Leucogeranos. Bp.
— giganteus. Bp. 372
Leucometopon. Bp.
— nubicum. Bp. 138
Leuconotopicus. Malh.
— numidicus. Malh. 86
Leucosticte. O. d. Murs.
— arctoa. Sw. 303
— nivalis. O. d. Murs. 302
Leucotoa. Br.
— leucopygia. Br. 195
— leucura. Br. 195
Leucus. Bp.
— fuscus. Kaup. 560
— glacialis. Bp. 562
— glaucus. Kaup. 561
— leucopterus. Bp. 562
— leucopterus minor. Bp. 562
— marinus. Kaup. 563
Ligurinus. Koch.
— auriventris. Cab. 307
— cannabina. Koch. 309
— chloris. Koch. 307
— flavirostris. Kaup. 310
— incertus. Cab. 323
— linaria. Kaup. 311
Limicola. Koch.
— platyrhyncha. (Temm.) 406
— *pygmaea. Koch. 406
— recurvirostra. Br. 406
Limicula. Vieill.
— glottis. Leach. 422
— melanura. Vieill. 438
— lapponica. Vieill. 437
— terek. Vieill. 436
Limnaëtos. Pr. Max.
— longipes. Pr. Max. 42
Limnicola. Cab. Journ.
— pygmaea. Cab. Journ. 406
Limnodromus. Pr. Max.
— griseus. Pr. Max. 434
— novae boracensis. Lemb. 434
Limosa. Briss. Schl.
— aegocephala. Gr. 438
— brachyptera. Br. 438
— cinerea. Naum. 436
— ferruginea. Pall. 437
— fusca. Briss. 425
— glottis. Meyer. 437
— glottis. Pall. 422
— glottoïdes. Syk. 422
— grisea. Br. (Spec.?) 437
— grisea. Briss. 422
— grisea. Schl. 434
— guttifera. Nordm. 436
— Hardwicki. Gr. 417
— indiana. Less. 436
— islandica. Br. 438
— lapponica. L. 437
— leucophaea. Lath. 437
— *melanura. Leisl. 438
— Meyeri. Leisl. 437
— recurvirostra. Pall. 436
— *rufa. Briss. 437
— rufa major. Briss. 438
— scolopacea. Say. 434
— terek. Temm. 436
— totanus. Pall. 422
Linacanthis. O. d. Murs.
— canescens. (Selys.) 312
— linaria. (L.) 311
— rufescens. O. d. Murs. 311
Linaria. Vieill. Boie.
— agrorum. Br. 311
— alnorum. Br. 311
— arctoa. Brandt. 303
— assimilis. Br. 311
— betularum. Br. 311
— borealis. Selby. 312
— borealis Vieill. 311
— canescens. Gould. 312
— canigularis. Br. 311
— cannabina. Boie. 309
— dubia. Br. 311
— erythrina. Boie. 323
— flavirostris. Br. 311
— flavirostris. Macgil. 310
— Gebleri. Brandt. 303
— Holbölli. Br. 311
— leuconotus. Br. 311
— microrhynchos. Br. 311

Linaria montana. Willug. 310
— montium. Leach. 310
— nivalis. Brandt. 302
— phoenicopterus. Gould. 322
— robusta. Br. 311
— rubra. Gesn. Br. 311
— rubra major. Briss. 309
— rubra minor. Briss. 311
— rufescens. Vieill. 311
— septentrionalis. Br. 311
— sibirica. rosea. (Mus. Petr.) 321
— spinus. Leach. 315
— vulgaris. Rüpp. 311

Linota. Bp.
— bella. Bp. 309
— borealis. Bp. 311
— brevirostris. Gould. 311
— canescens. Bp. 312
— cannabina. Bp. 309
— cannabina var. bella. Cab. Journ. 309
— Hornemanni. Holb. 312
— linaria. Bp. 311
— montium. Bp. 310

Lithofalco. Briss.
— aesalon. (Gm.) 19
— ardesiacus. Heugl. 16

Lithoenas. Rchb.
— livia. Rchb. 339

Livia. O. d. Murs. = Columba. L.

Lobipes. Cuv.
— cinereus. K. u. Bl. 400
— hyperboreus. Cuv. 400

Lobivanellus. Blyth.
— leucurus. Blyth. 386

Locustella. Kaup.
— anthirostris. Br. 237
— certhiola. Bp. 239
— fluviatilis. Gould. 238
— lanceolata. Bp. 237
— locustella. Bp. 237
— luscinioïdes. Br. 240
— naevia. Bp. 237
— ochotensis. Midd. (J. Kl.) 237
— Rayi. Gould. 237
— salicaria. (Pall.) 235
— strepitans. Br. 238
— vera. Br. 237
— Wodzicki. Br. 238

Lomvia. Brandt. = Uria. Briss.
— suarbag. Coues. 611

Londra. Syk.
— calandra. Syk. 275

Lophaithya = Lophaythya. Kaup.

Lophaythya. Kaup.
— cristata. Kaup. 597

Lophoaithya, Lophoaythya } = Lophaythya. Kaup.

Lophodytes. Rchb.
— cucullatus. Rchb. 529

Lophophanes. Kaup.
— bicolor. Kaup. 117
— capistratus. Br. 116
— cristatus. Kaup. 116
— mitratus. Br. 116
— rufescens. Br. 116

Lophophorus. Jams.
— Nigelli. Selby. 357

Loxia. Briss. L.
— americana. Wils. Bp. 335
— balearica. A. v. Hom. 335
— bifasciata. Selys. 336
— cardinalis. Beseck. 323
— chloris. L. 307
— coccothraustes. L. 327
— crucirostra. Pall. 335
— *curvirostra. L. 335
— curvirostra balearica. A. v. Hom. 335
— curvirostra major. Gm. 334
— curvirostra rubrifasciata. Schl. 335
— enucleator. L. 326
— enucleator. Wils. (Amerika.) 326
— erythraea. Endl. 323
— erythrina. Pall. 323
— falcirostris. Lath. 336
— flamengo. Spar. 326
— hamburgensis. (Gm.) 332
— hamburgia. Gm. 332
— himalayana. Hodgs. 335
— hudsonia. Gm. 301
— islandica. Faber. 317
— *leucoptera. Gm. 336
— leucoptera. Nils. 336
— obscura. L. (J. Kl.) 323
— psittacea. Pall. 326

Loxia pyrrhula. L. 319
— *pytiopsittacus. Bechst. 334
— rosea. Vieill. 323
— rubricilla. Güldenst. 328
— rubrifasciata. Br. 335
— serinus. Brünn. 317
— sibirica. Pall. 321
— taenioptera. Glog. 336

Lucotoa. Pr. Würt.
— leucocephala. Br. 195
— minor. Br. 195

Lullula. Kaup.
— arborea. Kaup. 272
— cristata. Kaup. 274

Lunda. Pall.
— arctica. Pall. 614
— glacialis. Blas. 615

Lupha. Rchb.
— cristata. Rchb. 471

Luscinia. Schwenkf.
— aëdon. Cab. Journ. 209
— eximia. Br. 209
— hybrida. Br. 208
— itala. Br. 208
— luscinia. Cab. Journ. 208
— major. Schwenkf. 209
— major philomela. Br. 209
— major polonica. Br. 209
— media. Br. 208
— megarhynchos. Br. 208
— minor. Br. 208
— Okeni. Br. 208
— peregrina. Br. 208
— philomela. Br. 209
— philomela. Bp. 208
— phoenicurus. Sundev. 198
— rubicola. Sundev. 210
— suecica. Sundev. 207
— tithys. Sundev. 202
— vera. Sundev. Br. 208

Luscinioïdes. Bp.
— Savii. Bp 240

Lusciniola. Gr.
— melanopogon. Gr. 242
— Savii. Bp. 240

Lusciniopsis. Bp.
— fluviatilis. Bp. 238
— gracilirostris. Br. 240

Lusciniopsis luscinioïdes. Gerbe. 240
— Savii. Bp. 240
— strepitans. Br. 238
— Wodzicki. Br. 238

Lusciola. K. u. Bl.
— aurorea. K. u. Bl. 199
— caligata. K. u. Bl. 235
— calliope. K. u. Bl. 206
— cyanecula. Schl. 207
— cyanecula orientalis. Schl. 207
— erythrogaster. Schl. 199
— leucocyanea. (Br.) 207
— leucosterna. (Br.) 207
— *luscnia. K. u. Bl. 208
— *philomela. K. u. Bl. 209
— phoenicurus. K. u. Bl. 198
— rubecula. K. u. Bl. 210
— *suecica. K. u. Bl. 207
— tithys. K. u. Bl. 202
— Wolfi. (Br.) 207

Lutucoa. Pr. Würt.
— leucocephala. A. Br. 195
— leucopygia. Pr. Würt. 195

Lycos. Boie.
— mondula. Boie. 146

Lymnocryptes. Kaup.
— gallinula. Kaup. 433

Lyrurus. Sw.
— medius. A. Br. 351
— tetrix. Sw. 353

Maceranas. Less. = Oidemia. Flem.

Machetes. Cuv.
— alticeps. Br. 417
— minor. Br. 417
— planiceps. Br. 417
— *pugnax. Cuv. 417

Macropus. Nutt.
— Stelleri. Nutt. 519

Macrorhamphus. Leach.
— *griseus. Leach. 434
— scolopacinus. Say. 434

Macrorhamphus. Less. = Oidemia. Flem.

Macrotarsus. Lacép. = Himantopus. Briss.

Mareca. Steph.
— americana. Steph. 503
— falcata. (Pall.) 495
— fistulans. Steph. 502
— glocitans. Steph. 496
— kajolka. Br. 502
— penelope. Selby. 502
Marila. Rchb.
— affinis. Bp. 511
— collaris. Bp. 513
— frenata. Bp. (♀) 511
Marmoronetta. Rchb.
— angustirostris. Rchb. 497
Mataeoptera. Glog.
— impennis. Glog. 613
Mecistura. Leach.
— *caudata. Leach. 123
— longicauda. Br. 123
— pinetorum. Br. 123
— vagans. Leach. 123
Megaceryle. Kaup.
— alcyon. Rchb. 100
Megalestris. Bp.
— catarrhactes. Bp. 565
Megaloperdix. Brandt.
— altaica. Gebl. 357
— caucasica. Brandt. 357
Megalopterus. Boie.
— stolidus. Boie. 543
Megalornis. Gr. = Grus. Briss.
Megascops. Kaup.
— asio. Kaup. 68
Melagavia. Bp. = Larus. L.
Melancorypha = Melanocorypha. Boie.
Melanetta. Boie.
— fusca. Boie. 523
— Hornschuchi. Br. 523
— megapus. Br. 523
— megauros. Br. 524
— nigra. Boie. 524
— nigriceps. Br. 524
— perspicillata. Boie. 522
— platyrhynchos. Br. 523
Melanitta = Melanetta. Kaup.
Melanocorypha. Boie.
— albigularis. Br. 275
Melanocorypha arabs. Br. 273
— arenaria. Bp. 278
— brachydactyla. Boie. 278
— calandra. Boie. 275
— deserti. Br. 273
— ferruginea. A. Br. (Spec. africana.)
— galerita. Br. 273
— gallica. Br. 278
— graeca. Br. 278
— isabellina. Br. 273
— italica. Br. 278
— leucoptera. Boie. 277
— macroptera. Br. (Spec.?) 278
— rufescens. Br. 275
— semitorquata. Br. 275
— subcalandra. Br. 275
— tatarica. Boie. 276
— tenuirostris. Br. 278
Melanopelargus. Rchb.
— niger. Rchb. 460
Melierax. Rüpp.
— gabar. Rüpp. 24
Melizophilus. Leach.
— Dartfordiensis. Leach. 217
— melanocephalus. Boie. 220
— nigricapillus. Cab. 220
— obsoletus. Br. 217
— provincialis. Jenn. 217
— sarda. Gerbe. 218
— sardus. Cab. 218
Melodes. K. u. Bl.
— *calliope. K. u. Bl. 206
Melophilus. Br.
— provincialis. Br. 217
— subalpinus. Br. 219
Merganser. Briss.
— castor. Bp. 527
— cinereus. Briss. 527
— cristatus. Briss. 528
— cristatus minor. Briss. 525
— cristatus virginianus. Briss. 529
— cucullatus. Bp. 529
— gulo. Steph. 527
— Rayi. Leach. 527
— serrator. Steph. 528
— stellatus. Bp. 529

Mergellus. Selby.
— albellus. Selby. 525
— anatarius. (Eimb.) 526
— minutus. Br. 525
Mergoïdes. Eyt.
— rufina. Eyt. 506
Mergulus. Vieill.
— *alle. Vieill. 606
— arcticus. Br. 606
— melanoleucus. Ray. 606
Mergus. L.
— *albellus. L. 525
— albulus. Scop. 525
— americanus. Clusius. 613
— *anatarius. Eimb. 526
— asiaticus. Gm. 525
— castor. Gm. 527
— cristatus. Brünn. 528
— *cucullatus L. 529
— fuscus. Lath. 529
— glacialis. Brünn. 525
— leucomelas. Gm. (♂ ad.) 528
— major. Dub. 527
— *merganser. L. 527
— minutus L. 525
— niger. Gm. (J. Ueb. Kl.) 528
— pannonicus. Scop. 525
— rubricapillus. Gm. (J. Kl.) 527
— *serrator. L. 528
— serrator Pallasi. Bp. 528
— serratus. Gm 528
— stellatus. Brünn. 525
— tinus. Hasselq. 525
Mergus. Briss.
— major. Briss. 605
— major naevius. Briss. 605
Merops. L. (Barr.)
— aegyptius. Forsk. 102
— *apiaster. L. 101
— brevirostris. Boiss. 101
— chaddaejr. Forsk. 102
— chrysocephalos. Gm. 101
— chrysocercus. Cab. 102
— congener. Gm. 101
— elegans. Br. 101
— galilaeus. Hasselq. 101
— hungariae. Br. 101
— Lamaracki. Cuv 102
*Merops persica. Pall. 102
— pyrenaicus. Barr. 105
— ruficapillus. Vieill. 102
— ruficollis. Vieill. 102
— Savignyi. Cuv. 102
— schaeghaghi. Forsk. 101
— superciliosus. Gm. 102
— Vaillanti. Bp. 102
— viridis. Gm. 102
Merula. Briss.
— alpestris. Br. 167
— alticeps. Br. 166
— aquatica. Briss. 250
— atrigularis. Bp. 173
— carniolica. Br. 166
— coerulea. Briss. 185
— collaris. Br. 167
— insignis. Br. 167
— maculata. Br. 167
— major. Br. 166
— merula. Boie. 166
— migratoria. Gould. 182
— minor. Sw. 181
— montana. Briss. 167
— musica. Selby. 178
— olivacea. Briss. 183
— pinetorum. Br. 166
— rosea. Briss. 157
— saxatilis. Briss. 186
— saxatilis minor. Briss. 186
— silens. Sw. 179
— solitaria. Sw. 179
— torquata. Gesn. Br. 167
— torquata montana. Br. 167
— truncorum. Br. 166
— viscivora. Selby. 171
— vociferanus. Br. 167
— vulgaris. Ray. 166
— Wilsoni. Sw. 180
Metoponia. Bp.
— pusilla. Bp. 318
Microcarbo. Bp.
— pygmaeus. Bp. 593
Micronisus. Kaup.
— badius. de Filippi. 22
— brevipes. Newt. 22
— gabar. Kaup. 24
— guttatus. Heugl. 22

Micronisus miltopus. Heugl. 21
— nigrer. Bp. 24
— niloticus. Sundev. 24
— Rueppelli. Kaup. (J. Kl.) 22
— sphenurus. Gr. 22
— sphoenurus. Bonn. 22
Microptynx. Kaup.
— passerina. Kaup. 54
Micropus. M. u. W.
— alpinus. M. u. W. 72
— apus. Boie. 73
— melba. Boie. 72
— murarius. M. u. W. 73
Miliaria. Br.
— cana. Frisch. 282
— europaea. Sw. 282
— germanica. Br. 282
— meridionalis. Br. 282
— minor. Br. 282
— peregrina. Br. 282
— septentrionalis. Br. 282
— valida. Br. 282
Milvus. Briss.
— *aegyptius. Gr. 46
— aeruginosus. Aldrov. 48
— aetolius. Savig. 46
— aetolius. Vieill. 45
— *ater. Daud. 45
— carolinensis. Briss. 47
— castaneus. Daud. 44
— Forskali. Br. 46
— furcatus. Jennyns. 47
— fusco-ater. (M. u. W.) 45
— fuscus. Br. 45
— ictinus. Savig. 44
— jaicensis. Lepech. 44
— leucorhynchos. Br. 46
— migrans. Hartl. 45
— niger. Briss. 45
— parasiticus. Levaill. 46
— parasitus. Less. 46
— *regalis. Briss. 44
— ruber. Br. 44
— russicus. Daud. 44
— vulgaris. Flem. 44
Mimetes. Glog. = Mimus. Boie.
Mimus. Boie.
— carolinensis. Gr. 165
Mimus felivox. Bp. 165
— infaustus. Midd. 144
— *polyglottus. Boie. 164
— rufus. Gr. 163
Miraffra = Mirafra. Gr.
Mirafra. Gr.
— deserti. Gr. 273
— deva. Jerd. 274
— phoenicuroïdes. Blyth. (?) 273
Mniotilta. Vieill.
— virens. Gr. 126
Monachus. Kaup
— atricapillus. Kaup. 213
Monedula. Br.
— arboreus. Br. 146
— collaris. (Drum.) 146
— dauricus. Cab. 148
— nigra. Sparr. 147
— septentrionalis. Br. 146
— spermologus. Br. 147
— tauricus. (Var.) 146
— torquatus. Br. (Var.) 146
— turrinum. Br. 146
— vulgaris. Br. 146
— vulgaris spermologus. Br. 147
Monticola. Boie.
— *cyanea. Cab. 185
— manillensis. v. Mart. 185
— *saxatilis. Cab. 186
Montifringilla. Br.
— alpicola. Bp. 302
— arctoa. Cab. 303
— congener. Aldrov. 300
— glacialis. Br. 302
— nivalis. Br. 302
— sanguinea. Gould. 322
Morinella. Meyer.
— collaris. Meyer. 398
Morinellus. Bp.
— caspius. Bp. 392
— sibiricus. Bp. 391
Moris. Leach.
— bassana. Leach. 587
Mormon. Ill.
— *arcticus. Ill. 614
— corniculata. Naum. 616
— fratercula. Temm. 614

Mormon glacialis. Audub. 616
— *glacialis. Leach. 615
— glacialis. Temm. 616
— grabae. Br. 615
— polaris. Br. 615
Morphnus. Smith.
— dubius. Smith. 31
Morus. Vieill.
— bassanus. Vieill. 587
Motacilla. L.
— acredula. L. 224
— aëdon. Pall. 206
— alba. Flem. 253
— *alba. L. 252
— alba, var. lugubris. Schl. 253
— albeola. Pall. 252
— albeola. var. Kamtschatkae. Pall. 252
— algira. Selys. 253
— alpina. Gm. 203
— anglorum. Prev. 257
— aquatica. L. 244
— arundinacea. Gm. 246
— atrata. Gm. 201
— atricapilla. L. 213
— aureocapilla. Less. 255
— aureocephala. Less. 255
— aurorea. var. cerauna. Pall. 199
— boarula. Penn. 254
— boarula. Lefebr. 257
— boarula. L. 256
— boarula. var. Gm. 258
— borealis. Sundev. 260
— brachyrhynchos. Br. 252
— calcarata. Hodgs. 255
— calliope. Pall. 207
— campestris. Pall. 258
— campestris. Naum. 257
— certhiola. Pall. 239
— cervicalis. Br. 253
— cervina. Pall. 265
— chrysogaster. Bechst. 256
— cinerea. Briss. 252
— cinereocapilla. Savi. 259
— citreola. Pall. 255
— citrinella. Pall. 255
— coerulea. Pall. 207
— curruca. L. 222
Motacilla dalmatica. Bruch. 259
— dukhunensis. Syk. 252
— dumetorum. Gm. 222
— erythaeus. L. 201
— erythrogaster. Güldst. 199
— fasciata. Br. 252
— Feldeggi. Mich. 259
— ficedula. Gm. (Gm. L. S.) 128
— ficedula. L. (Faun. Suec.) 130
— flava. Briss. 251
— flava. L. 256
— flava. Ray. 257
— flava anglica. Sundev. 257
— flava borealis. Sundev. 256
— flava, campestris. 258
— flava, cinereocapilla. Schl. 259
— flava cinereocapilla fasciata. Schl. 259
— flava melanocephala. Schl. 260
— flava Rayi. Schl. 257
— flava suecana. Sundev. 256
— flaveola. Pall. 256
— flaveola. Temm. 257
— fuscicapilla. 259
— garrula. Retz. 222
— gibraltariensis. Gm. 201
— gularis. Sw. 252
— hippolaïs. Retz. (teste Naum.) 212
— hortensis. Gm. 212
— hypolaïs. L. 230
— Kaleniziczenki. Blas. 260
— leucomela. Pall. 192
— longirostris. Gm. 192
— lugens. Ill. 252
— lugubris. Temm. 253
— lugubris var. melanota. Vieill. 253
— luscinia. L. 208
— luscinia major. Gm. 209
— maderaspatana. Selys. 252
— major. Br. 252
— maura. Pall. 196
— melanocephala. Gm. 220
— melanocephala. Licht. 260
— melanope. Pall. 254
— modularis. L. 204
— montana. Br. 254
— montanella. Pall. 205
— moschita. Gm. (teste Naum,) 213
— naevia. Bodd. 237

Motacilla neglecta. Gould. 256
— nivalis. Br. 254
— oenanthe. L. 188
— paradoxa. Br. 260
— paradoxa. Schrenck. (Spec. asiatica.)
— phoenicura. L. 198
— pratorum. Br. 253
— proregulus. Pall. 229
— provincialis. Gm. 217
— regulus. L. 214
— rubecula. L. 210
— rubetra. L. 197
— rubicola. L. 196
— rufa. Gm. 223
— salicaria. Pall. 235
— salicaria. L. 212
— salicaria. Retz. 230
— salicaria. Strickl. 246
— schoenobanus. L. 243
— schoenobanus. Scop. 244
— septentrionalis. Br. 252
— scheltobriuscha. Lepech. 255
— spipola. Pall. 266
— stapazina. Gm. 191
— stapazina. Pall. 189
— stapazina, var. b. Gm. 190
— suecica. L. 207
— *sulphurea. Bechst. 254
— superciliosa. Gm. 229
— sylvestris. Br. 252
— sylvia. L. 215
— sylvia. Pall. 222
— torquata. L. 196
— trochilus. L. 224
— troglodytes. L. 249
— verna. Briss. 256
— virens. Gm. 126
— *Yarrelli. Gould. 253
Muscicapa. Briss. Pall. Lath.
— alba. Sparr. 252
— *albicollis. Temm. 129
— albifrons. Br. 129
— alticeps. Br. 129
— *atricapilla. L. 128
— atricapilla var. β. Gm. 129
— atrogrisea. Br. 129
— carolinensis. L. 165
— collaris. Bechst. 129
Muscicapa erythaca. Sw. 127
— fuscicapilla. Br. 129
— grisola. L. 130
— guttata. Pall. 179
— haemorrhousa var. β. Gm. 162
— laïs. Hempr. u. Ehr. 127
— leucomela. Lath. 192
— luctuosa. Temm. 128
— melanoleuca. Güldst. 191
— melanoleuca. Lath. 192
— melanoptera. Heckel. 129
— minuta. Schill. 127
— muscipeta. Bechst. 128
— muscipeta. Br. 129
— nigra. Briss. 128
— parva. Bechst. 127
— rubecula. Sw. 127
— ruficollis. Br. 127
— rufigularis. Br. 127
— streptophora. Vieill. 129
— torquata. Briss. 196
Muscicapoïdes. Selys.
— olivetorum. Selys. 232
Muscipeta. Koch.
— arundinacea. Koch. 246
— hypolaïs. Koch. 230
— lacustris. Koch. 245
— locustella. Koch. 237
— olivacea. Koch. 237
— phragmitis. Koch. 243
— salicaria. Koch. 244
Myiomela. Gr.
— leucura. Gr. 195
Mystacinus. Boie.
— arundinaceus. Br. 121
— barbatus. (Briss.) 121
— biarmicus. Boie. 121
— dentatus. Br. 121
— russicus. Br. 121

Naenia. Boie. = Anous. Leach.
Nauclerus. Vig.
— *furcatus. Vig. 47
Nectris. Forst.
*Nectris anglorum. Glog. 582
— arcticus. Faber. 582
— *Baroli. Glog. 584
— carneïpes. Bp. 585

*Nectris cinerea. Kuhl. 580
— *fuliginosa. K. u. Bl. 585
— gama. Bp. 585
— *major. Glog. 581
— *obscura. K. u. Bl. 583
— puffinus. K. u. Bl. 582

Nematura. Fischer. = Syrrhaptes. Ill.

Neophron. Savig.
— carunculatus. (A. Smith.) 6
— monachus. Br. 6
— niger. Less. 6
— *percnopterus. Savig. 5
— *pileatus. Savig. 6
— stercorarius. Dub. 5
— subpercnopterus. Br. 5

Netta. Kaup.
— rufina. Kaup. 506

Nettion. Kaup.
— creeca. Kaup. 501

Niphaea. Audub.
— hyemalis. Audub. 301

Nisaëtos. Hodgs.
— grandis. Hodgs. 30
— marmorata. Mem. 30
— niveus. Jerd. 30

Nisoria. Bp.
— undata. Bp. 211

Nisus. Cuv.
— badius. Dub. 22
— brevipes. Severz. 22
— brachydactylus. Sw. (teste Heugl.) 22
— chalcis. Ehrenb. 22
— communis. Cuv. 23
— elegans. Br. 23
— fringillarius. Kaup. 23
— fringillarum. Br. 23
— gabar. Cuv. 24
— guttatus. Heugl. (J. Kl.) 22
— intermedius. Br. 23
— manillensis. Meyer. 22
— miltopus. Heugl. 24
— niger. Heugl. 24
— peregrinus. Br. 23
— polyzonoïdes. Sw. (teste Heugl.) 22
— sphenurus. Rüpp. 22
— striatus. Frisch. 23

Noctua. Savig.
— glaux. Savig. 55
— meridionalis. Schl. 56
— minor. Briss. 55
— nilotica. Pr. Max. 55
— nudipes. Nils. 55
— numida. Levaill. 56
— nyctea. Cuv. 53
— passerina. Cuv. 55
— passerina. Rüpp. 56
— passerina. Schl. 54
— persica. Degl. u. G. 56
— Tengmalmi. Less. 57
— ulula. Schl. 54
— veterum. Licht. 55
— veterum meridionalis. Schl. 56

Noddis. Cuv. = Anous. Leach.

Nucifraga. Briss.
— alpestris. Br. 145
— arquata. Br. 145
— brachyrhynchos. Br. 145
— *caryocatactes. Temm. 145
— caryocatactes major. Br. 145
— caryocatactes minor. Br. 145
— guttata. Vieill. 145
— macrorhynchos. Br. 145
— major. Br. 145
— minor. Br. 145
— platyrhynchos. Br. 145

Numenius. Möhr.
— africanus. Lath. (Ueb. Kl.) 411
— *arquatus. Lath. 442
— assimilis. Br. 442
— atricapillus. Vieill. 439
— *borealis. Wils. 440
— castaneus. Briss. 444
— cinereus. Vieill. 436
— femoralis. Cass. 439
— ferrugineus. M. u. W. 411
— haesitatus. Hartl. 439
— hastatus. Cantar. 441
— hudsonius. Lath. 440
— ibis. Cuv. 443
— ibis. Pall. 461
— igneus. Gm. 444
— intermedius. Nutt. 440
— islandicus. Br. 442
— lineatus. Bp. 442

Numenius longirostris. Br. 442
— luzoniensis. Gm. 439
— major. Steph. 442
— medius. Br. 442
— melanopus. Vieill. 440
— melanorhynchus. Bp. 439
— minor. Bris. 439
— *phaeopus. Lath. 439
— pluvialis. Dub. 439
— pusillus. Bechst. 406
— pygmaeus. Bechst. (teste Naum.) 411
— pygmaeus. Lath. 406
— rufescens. Br. 442
— rufus. Vieill. 440
— subarquata. Bechst. 411
— syngenicus. v. d. M. 441
— tahitiensis. Cass. 439
— tenuirostris. Vieill. 441
— uropygialis. Gould. 439
— variabilis. Bechst. 407
— viridis. Gm. 444

Numida. L.
— *meleagris. L. 358

Nyctale. Br.
— abietorum. Br. 57
— dasypus. (Bechst.) 57
— funerea. Bp. 57
— pinetorum. Br. 57
— planiceps. Br. 57
— Tengmalmi. Bp. 57

Nyctea. Steph.
— candida. Br. 53
— cinerea. Steph. 53
— erminea. Steph. 53
— nivea. Daud. 53
— scandiaca. Malm. 53

Nyctiardea. Sw.
— europaea. Sw. 454

Nyctychelidon. Renn.
— europaeus. Renn. 69

Nycticorax. Steph.
— ardeola. Temm. 454
— badius. Br. 454
— cinereus. Glog. 454
— communis. Hintz. 454
— europaeus. Steph. 454
— Gardeni. Rchb. (Spec. americana.) 454
Nycticorax griseus. Strickl. 454
— meridionalis. Br. 454
— nycticorax. Boie. 454
— orientalis. Br. 454

Nyctirodius. Macgil.
— nycticorax. Macgil. 454

Nyphea. Audub.
— *hyemalis. Audub. 301

Nyroca. Flem.
— ferina. Steph. 507
— fuligula. Flem. 512
— leucopathalma. Flem. 509
— marila. Flem. 510
— obsoleta. Br. 509

Oceanites. K. u. Bl.
— oceanica. Bp. 579
— Wilsoni. K. u. Bl. 579

Oceanitis. Bp.
— oceanica. (K. u. Bl.) 579
— Wilsoni. Bp. 579

Oceanodroma. Rchb.
— Leachi. A. Br. 578

Ocyris. Hodgs.
— oinops. Hodgs. 294

Oedemia = Oidemia. Flem.

Oedicnemus. Temm.
— arenaria. Br. 382
— Belloni. Flem. 382
— *crepitans. Temm. 382
— desertorum. Br. 382
— europaeus. Vieill. 382
— griseus. Koch. 382

Oenanthe. Vieill.
— albicollis. Vieill. 190
— cinerea. Vieill. 188
— leucura. Vieill. 195
— pleschanka. Vieill. 192
— rubetra. Vieill. 197
— rubicola. Vieill. 196
— stapazina. Vieill. 191

Oenas. Briss.
— americana. Briss. 344
— oenas. Briss. 338

Oenas. Vieill.
— arenaria. Vieill. 346
— cata. Vieill. 347

Oidemia. Flem.
— americana. Sw. 524
— *fusca. Flem. 523
— giblera. Br. 524
— Hornschuchi. Br. 523
— leucocephala. Flem. 524
— megapus. Br. 523
— megauros. Br. 524
— *nigra. Flem. 524
— nigriceps. Br. 524
— *perspicillata. Flem. 522
— platyrhynchos. Br. 523
Olivetra. Gould.
— salicaria. Gould. 232
Olor. Wagl.
— cygnus. Wagl. 476
— immutabilis. Bp. 475
— mansuetus. Wagl. 475
— minor. Bp. 477
— musicus. Wagl. 476
Onocrotalus. Briss.
— albus. Briss. 594
— crispus. Briss. 596
— minor. (Briss.) 595
Onychoprion. Wagl.
— fuliginosum. Wagl. 542
Onychospiza. Bp.
— fucata. Bp. 293
Oraeginthus. Cab.
— pusillus. Cab. 318
Oreias. Kaup. = Lagopus. Briss.
Oreocichla. Glog.
— aurea. Glog. 169
Oreocincla. Bp.
— aurea. Bp. 169
— Heinei. Cab. 170
— lunulata. Cab. 170
— novae hollandiae. Gould. 170
— varia. Cab. 169
— Whitei. Gould. 169
Oreospiza. Glog.
— alpicola. Glog. 302
— *arctoa. Glog. 303
— Gebleri. Glog. 303
— leucura. Glog. 302
— *nivalis. Glog. 302
Oreosterops. Bp.
Orcosterops javanica. Bp. 228
Oriolus. L.
— aureus. Br. 156
— *galbula. L. 156
— garrulus. Br. 156
— phoeniceus. L. 160
Orites. Möhr.
— caudatus. Möhr. 123
Orites. K. u. Bl.
— nivalis. K. u. Bl. 302
Orospina. Kaup.
— provincialis. Kaup. 290
Orpheus. Sw.
— carolinensis. Audub. 165
— felivox. Sw. 165
— leucopterus. Vig. 164
— polyglottus. Sw. 164
— rufus. Sw. 163
Ortygion. K. u. Bl.
— coturnix. K. u. Bl. 367
Ortygis. Ill.
— andalusica. K. u. Bl. 368
— gibraltariensis. K. u. Bl. 368
— sylvatica. Desf. 368
Ortygometra. Leach.
— *Boillioni. Steph. 466
— crex. Lath. 464
— maculata. Dub. 467
— marmetta. Ray. 467
— minuta. K. u. Bl. 465
— *porzana. Steph. 467
— *pusilla. Bp. 465
— pygmaea. K. u. Bl. 466
Ortygometra. Bélon. = Rallus aquaticus. L.
Ossifraga. Jacq.
— *gigantea. Rchb. 571
Ostralega(us). Briss.
— europaea. Less. 399
— vulgaris. Less. 399
Otis. L. Lath.
— barbata. Dub. 374
— *houbara. Gm. 376
— *Macqueeni. Gr. 377
— major. Br. 374
— marmorata. Gr. (♀). 377

Otis minor. Br. 375
— oedicnemus. Lath. 382
— ornata. Br. 377
— rhaad. Gm. 376
— *tarda. L. 374
— *tetrax. L. 375
— undulata. 376

Otocoris. Bp. = Otocorys. Bp.

Otocornis. Rüpp. = Otocorys. Bp.

Otocorys Bp.
— albigula. Bp. 281
— alpestris. Bp. 280
— bilopha. Bp. 281
— larvata. de Fil. 281
— occidentalis. Macgil. 281
— pennicillata. Gr. 281
— scriba. Bp. 281

Otogyps. Gr.
— aegyptius. (Temm.) 3
— *auricularis. Gr. 3
— nubicus. Griff. 3
— pennatus. A. Br. 3

Otomela. Bp.
— phoenicura. Bp. 137

Otus. Cuv.
— agrarius. Br. 64
— albicollis. Daud. 63
— arboreus. Br. 63
— ascalaphus. Less. 66
— asio. Schl. 68
— *brachyotus. Boie. 64
— bubo. Schl. 65
— communis. Less. 63
— europaeus. Steph. 63
— gracilis. Br. 63
— major. Br. 63
— maximus. Dub. 65
— medius Cuv. (Dub.) 63
— minor. Br. 63
— naevius. Cuv. 68
— otus. Schl. 63
— palustris. Br. 64
— scops. Schl. 67
— sibiricus. (Licht.) 65
— sylvestris. Br. 63
— ulula. Cuv. 64
— verus. Finsch. (Cab. Journ.) 63
— *vulgaris. Flem. 63

Oxylophus. Sw.
— andalusiae. Br. 93
— glandarius. Sw 93
— minor. Br. 93

Paeciloptemis. Kaup.
— rufinus. Kaup. 42

Pagonetta. Kaup.
— glacialis. Kaup. 517

Pagophila. Kaup.
— brachytarsa. Bruch. 564
— eburnea. Kaup. 564
— nivea. Bruch. 564

Pallenura. Bp.
— flava. Bp. 254
— montana. Br. 254
— nivalis. Br. 254
— robusta. Br. 254
— sulphurea. Br. 254

Palumbaena. Bp.
— columbella. Bp. 338
— oenas. Bp. 338

Palumbus. Briss.
— livia. Bp. 339
— oenas. O. d. Murs. 338
— torquatus. Leach. 337

Pandicilla. Blyth.
— familiaris de Filip. 241
— suecica. Blyth 207

Pandion. Savig.
— albigularis. Br. 37
— alticeps. Br. 37
— fasciatus. Br. 37
— fluviatilis. Savig. 37
— *haliaëtos. Cuv. 37
— ichtyaëtos. (Kaup.) 37
— leucocephalos. (L.) 33
— minor. Br. 37
— planiceps. Br. 37
— vocifer. Heugl. 35

Pannychistes. Kaup.
— rufipes. Kaup. 20
— vespertinus. (L.) 20

Panurus. Koch.
— barbatus. Saunders. (Briss.) 121
— *biarmicus. Koch. 121

Parnopia. Wright. (Cab. Journ.)

Parnopia locustella. Wright. (Cab. Journ.) 237

Paroïdes. Br.
— biarmicus. Gr. 121
— caudatus. Br. 123
— longicaudus. Br. 123
— pendulinus. Gr. 122
— pinetorum. Br. 123

Parra. Lacép. = Vanellus. L.

Parra. L.
— *jacana. L. 472
— jassana. Burm. 472
— variabilis. L. 472
— viridis. Gm. 472

Parus. L.
— abietum. Br. 111
— accedens. Br. 113
— alpestris. Baill. 113
— assimilis. Br. 113
— *ater. L. 111
— atricapillus. Briss. 111
— atricapillus. Gm. 112
— barbatus. Briss. 121
— biarmicus. L. 121
— *bicolor. L. Wils. 117
— bombycilla. Pall. 131
— *borealis. Selys. 113
— britannicus. Sharpe u. Dresser. 111
— capistratus. Br. 116
— carbonarius. Pall. 111
— caudatus. L. 123
— cinereus communis. Baldenst. 112
— cinereus montanus. Baldenst. 113
— cinclus. Gr. 114
— cinctus. Bodd. 114
— coeruleatus. Malh. 119
— coerulescens. Br. 118
— *coeruleus. L. 118
— coeruleus major. Briss. 120
— communis. 113
— *cristatus. L. 116
— *cyanus. Pall. 120
— frigoris. Selys. (Spec. americana, teste Degl.) 113
— fringillago. Pall. 110
— fruticeti. Wallengr. 113
— intercedens. Br. 110
— japonicus. Gm. 114
— lapponicus. Sundahl. 114
— longicaudus. Briss. 123
— lugens. Br. 115
— *lugubris. Natt. 115
— lugubris. Zetterst. 114
— luteus. S. G. Gm. 256
— *major. L. 110
— melanocephalos. Br. 113
— minimus. Titius. 122
— minor. Schl. 110
— mitrans. Br. 116
— mitratus. Br. 116
— murinus. Br. 113
— narbonensis. Gm. 122
— obtectus. Cab. (Var.) 114
— *palustris. L. 112
— palustris. Temm. (?) 112
— pendulinus. L. 122
— perniciosus. Br. 110
— pinetorum. Br. 111
— polonicus. Briss. 122
— robustus. Br. 110
— rufescens. Br. 116
— russicus. Gm. 121
— saebyensis. Sparrm. 120
— salicarius. Br. 112
— *sibiricus. Gm. 114
— sordidus. Br. 112
— stagnatilis. Br. 112
— subpalustris. Br. 112
— teneriffae. Less. 119
— *ultramarinus. Bp. 119
— violaceus. Le Vaill. 119

Passer. Briss.
— alpicolus. Pall. 302
— arctous. Pall. 303
— arboreus. Licht. 329
— arundinaceus. Briss. 290
— brachyrhynchos. Br. 329
— campestris. Briss. 332
— cannabina. Pall. 309
— carduelis. Pall. 313
— carduelis. var. Pall. 314
— cisalpinus. Glog. 330
— *domesticus. Koch. 329
— domesticus cisalpinus. Schl. 330
— domesticus, var. italiae. K. u. Bl. 330
— domesticus, var. salicarius. K. u. Bl. 331

Passer hamburgensis. Leach. 332
— hispanicus. Br. 331
— hispaniolensis. Degl. 331
— intercedens. Br. 329
— *italiae. Degl. 330
— italicus. Cab. 330
— leucura. 302
— linaria. Pall. 311
— megarhynchos. Br. 329
— microrhynchos. Br. 329
— minor. Br. 329
— montania. Pall. 332
— *montanus. Koch. 332
— nivalis. Bartr. 301
— pagorum. Br. 329
— Pallasi. Bp. 331
— papaverina. Pall. 309
— petronia. Degl. 333
— *petronius. Koch. 333
— pusillus. Pall. 318
— roseus. Pall. 324
— rufidorsalis. Br. 329
— rusticus. Br. 329
— *salicarius. K. u. Bl. Schl. 331
— salicicolus. Cab. 331
— sclavonicus. Briss. 289
— septentrionalis. Br. 332
— spinus. Pall. 315
— spiza. Pall. 304
— sylvestris. Briss. 333
— torquatus. Briss. 290
— validus. Br. 329
Passerina. Vieill.
— aureola. Vieill. 297
— collaris. Vieill. 297
— lapponica. Vieill. 300
— melanocephala. Vieill. 298
— nivalis. Vieill. 299
Pastor. Temm.
— *roseus. Temm. 157
Pavo. Clusius.
— marinus. Clusius. 373
Pavoncella. Leach.
— pugnax. Leach. 417
Pedetaythia. Kaup.
— subcristata. Kaup. 598
Pelecanopus. Bp.
— Bergei. Bp. 534
— velox. Bp. 534
Pelecanus. L.
— africanus. L. 593
— aquilus. L. 589
— bassanus. L. 587
— brachyrhynchos. Licht. 590
— carbo. Gm. 590
— cormoranus. Selys. 590
— *crispus. Bruch. 596
— cristatus. Faber. 591
— graculus. L. 591
— leucocephalos. Lath. 589
— maculatus. Gm. (Ueb. Kl.) 587
— major. Briss. (Ueb. Kl.) 587
— medius. (Nils.) 590
— *minor. Rüpp. 595
— mitratus. Licht. 594
— *onocrotalus. L. 594
— onocrotalus. Pall. 596
— onocrotalus minor. Rüpp. 595
— onocrotalus, var. orientalis. L. 596
— Palmerstoni. Gm. 589
— patagiatus. Br. 596
— phalacrocorax. Brünn. 590
— phoenix. Less. 594
— punctatus. Sparr. 587
— pygmaeus. Br. 595
— pygmaeus. Pall. 593
— roseus. Eversm. 594
Pelidna. Cuv.
— alpina. Cuv. 407
— americana. Br. 413
— arquata. Br. 411
— Bonapartei. Schl. 413
— calidris. Br. 407
— canutus. (L.) 410
— cinclus. Bp. 407
— cinclus. Cuv. 407
— cinclus var. Say. 413
— cinerea. (Gm.) 410
— islandica. (Gm.) 410
— macrorhynchos. Br. 411
— maculata. Bp. 412
— maritima. Bp. 409
— melanothorax. Br. 407
— melanotos. Degl. 413
— minuta. Boie. 414
— pectoralis. Bp. 412
— platyrhynchos. Bp. 406

Pelidna pusilla. Br. 414
— Schinzi. Bp. 413
— Schinzi. Br. 408
— subarquata. Br. 411
— Temminckii. Boie. 415
— variabilis. Steph. 407

Pelionetta. Kaup.
— perspicillata. Kaup. 522
— Trowbridgi. Baird. (Var.) 522

Pelodes. Kaup.
— leucopareia. Kaup. 539

Pelorhynchus. Kaup.
— Brehmi. Kaup. 431

Pendulinus. Br.
— macrurus. Br. 122
— medius. Br. 122
— polonicus. Br. 122

Penelope. Kaup. = Marecca. Steph.

Pentestes. Rchb.
— lugubris. Rchb. 115

Percnopterus. Cuv.
— aegyptiacus. Steph. 5
— niger. Less. 6
— stercorarius. A. Br. 5

Perdix. Lath.
— alpina. Fischer. 357
— andalusica. Lath. 368
— arragonica. Lath. 346
— caspia. Lath. 357
— caucasica. Gm. 357
— *chucar. Gr. 365
— cineracea. Br. 361
— cinerea. Briss. 361
— coturnix. Lath. 367
— damascena. Lath. 361
— francolinus. Lath. 360
— gibraltariensis. Lath. 368
— graeca. Bp. 365
— *graeca. Briss. 364
— Hebburni. Gr. 360
— Labatici. Bout. 366
— leucoptera. Rchb. (Var.) 361
— minor. Br. 361
— montana. Lath. 361
— pallida. Rchb. (Var.) 361
— *petrosa. Lath. 362
— *rubra. Briss. 366
Perdix rubra barbarica. Briss. 362
— rufa. Lath. 366
— rufidorsalis. Br. 366
— saxatilis. Brandt. 365
— *saxatilis. M. u. W. 363
— sylvestris. Br. 361
— variegata. Pall. 361
— vulgaris. Charlt. 361

Perisoreus. Bp.
— infaustus. Bp. 144

Peristera. Boie.
— aegyptiaca. Bp. 342
— glauconotus. Br. 340
— pygmaea. Br. 342
— ridens. Br. 343
— risoria. Boie. 343
— rufescens. Br. 342
— rufidorsalis. Br. 340
— senegalensis. Boie. 342
— tenera. Br. 340
— turtur. Boie. 340

Pernis. Cuv.
— apium. Br. 38
— *apivorus. Cuv. 38
— platyura. Br. 38
— vesparum. Br. 38

Petrocincla. Vig.
— cyanea. K. u. Bl. 185
— Gourcyi. Br. 186
— pandoo. (Syk.) 185
— polyglotta. Br. 186
— saxatilis. Vig. 186
— vulgaris. Br. 186

Petrocossyphus. Boie.
— affinis. Blyth. 185
— azureus. Lebr. 185
— cyanus. Boie. 185
— Gourcyi. Br. 186
— longirostris. Blyth. 185
— maal. Syk. 185
— pandoo. Syk. 185
— polyglottus. Br. 186
— saxatilis. Boie. 186
— sibiricus. Br. (N. 1855.) 185
— solitarius. Br. 185

Petrodroma. Vieill.
— muraria. Vieill. 105

Petronia. Kaup.

Petronia brachyrhynchos. Br. 333
— macrorhynchos. Br. 333
— marina. Willgb. 333
— rupestris. Bp. 333
— saxorum. Br. 333
— stulta. Strickl. 333
Petrophila. Sw.
— cyanea. Sw. 185
— saxatilis. Sw. 186
Phaeopus. Steph.
— arquatus. Steph. 439
— borealis. Cuv. 440
— vulgaris. Cuv. 439
Phaëton. L.
— *aethereus. L. 586
— Catesbaei. Brandt. 586
— melanorhynchos. Gm. 586
Phalacrocorax. Briss.
— africanus. (Gm.) (Spec.?) 593
— americanus. Richards. 590
— arboreus. Br. 590
— brachyrhynchos. Br. 590
— brachyuros. Br. 591
— carbo. Leach. 590
— cristatus. Gould. 591
— Desmaresti. Gr. 592
— glacialis. Br. 590
— graculus. Dum. 591
— humiliros. Br. 590
— macrorhynchos. Br. 590
— medius. Nils. 590
— megauros. Br. 591
— minor. Briss. 591
— pumilis. Licht. 593
— pygmaeus. Dum. 593
— subcormoranus. Br. 590
Phalaridion. Kaup.
— pusillum. Kaup. 465
— pygmaeum. Kaup. 466
Phalaropus. Briss.
— angustirostris. Naum. 400
— australis. Temm. 400
— cinerascens. Pall. 400
— *cinereus. Briss. (S. Kl.) 400
— cinereus. M. u. W. 400
— fulicarius. Kaup. 401
— fuscus. Briss. (J. Kl.) 400
— fuscus. Lath. 400
Phalaropus glacialis. Lath. (J. Kl.) 401
— griseus. Leach. 401
— hyperboreus. Bechst. 400
— hyperboreus. Lath. (S. Kl.) 400
— lobatus. Lath. (W. Kl.) 401
— platyrhynchos. Temm. 401
— *rufescens. Briss. 401
— ruficollis. Pall. 400
— rufus. Bechst. (S. Kl.) 401
— Williamsi. Haw. (S. Kl.) 400
Phasianus. L.
— *colchicus. L. 359
— marginatus. Meyer. 359
— torquatus. Dub. (Var.) 359
— vulgarus. Dub. 359
Phasianurus. Wagl.
— acutus. Wagl. 494
Phene. Savig.
— gigantea. Savig. 7
— ossifraga. Savig. 7
Philammus. Gr. = Otocoris. Bp.
Phileremos. Br.
— albigula. Br. 280
— alpestris. Br. 280
— bicornis. Br. 281
— brachydactyla. K. u. Bl. 278
— Kollyi. K. u. Bl. (Spec.?) 278
— moreotica. (v. d. Mühle.) 278
— rufescens. Br. 280
— scriba. Br. 281
— sibirica. K. u. Bl. 277
— striatus. Br. 280
Philolimnos. Br.
— gallinula. Br. 433
— minor. Br. 433
— stagnatilis. Br. 433
Philomachus. Möhr.
— pugnax. Möhr. 417
Philomela. Selby.
— atricapilla. Sw. 213
— luscinia. Selby. 208
— major. Br. 209
Philomelopsis. Br.
— fluviatilis. Br. 238
— luscinioïdes. Br. 240
— major. Br. 238
— Wodzicki. Br. 238

Phoenicopterus. L.
— americanus. Seba. 473
— *antiquorum. Temm. 473
— antiquus. Cab. Journ. 473
— *erythacus. Verr. 474
— europaeus. Vieill. 473
— platyrhynchos. Br. 473
— roseus. Pall. 473
— ruber. L. 473

Phoenicurus. Sw.
— ruticilla. Sw. 198
— tithys. Jard. 202

Phoneus. Kaup.
— rufus. Kaup. 135

Phylaconetta. Brandt.
— histrionica. Brandt. 518

Phyllobasileus. Cab.
— chloronotus. Cab. 229
— *proregulus. Cab. 229
— superciliosus. Cab. 229
— trochiloïdes. Cab. 229

Phyllopneuste. Meyer. = Phyllopseuste. Meyer.

Phyllopseuste. Meyer.
— acredula. Br. 214
— alpestris. Br. 227
— arborea. Br. 224
— Bonellii. Bp. 227
— borealis. Blas. 225
— Brehmi. E. v. Hom. (Portugal). 223
— Eversmanni. Bp. 225
— fitis. Br. 224
— gracilis. Br. 224
— icterina. Bp. 224
— *icterina. (Vieill.) 225
— indica. Blyth. 228
— *javanica. (Horsf.) 228
— magnirostris. Blyth. 228
— megarhynchos. Br. 226
— Meissneri. Pässl. 224
— modesta. Blyth. 229
— montana. Br. 227
— Nattereri. (Temm.) 227
— orientalis. Br. 227
— pinetorum. Br. 223
— reguloïdes. Blyth. 229
— *rufa. Meyer. 223
— septentrionalis. Br. 224

*Phyllopseuste sibilatrix. Boie. 226
— solitaria. Br. 223
— sylvestris. Br. 224
— sylvicola. Br. 226
— *trochilus. Meyer. 224

Phylloscopus. Boie.
— Bonellii. Cab. Journ, 227
— javanicus. Strickl. 228
— magnirostris. Blyth. 228
— modestus. Blyth. 229
— proregulus. (Pall.) 229
— reguloïdes. Blyth. 229
— rufus. Boie. 223
— sibilatrix. Blyth. 226
— trochiloïdes. Blyth. 229
— trochilus. Boie. 224

Piaya. Less.
— erythrophthalmos. Less. 95

Pica. Briss.
— albiventer. Vieill. 141
— bactriana. Bp. 141
— butanensis. Deless. 141
— *caudata. Ray. 141
— cyana. K. u. Bl. 140
— cyanea. Cook. 140
— europaea. Boie. 141
— ferruginea. Wagl. 144
— germanica. Br. 141
— glandaria. Gesn. 142
— hyemalis. Br. 141
— infausta. Wagl. 144
— japonica. Bp. 141
— leuconotos. Br. 141
— mauritanica. Malh. 141
— melanocephala. (Géné.) 143
— melanoleuca. Vieill. 141
— melanoptera. Blyth. 141
— melanotos. Br. 141
— Panderi. Wagl. 155
— pinetorum. Br. 141
— septentrionalis. Br. 141
— sericea. Gould. 141
— stridens. Ehrenb. 143
— thibetiana. Hodgs. 141
— varia. Schl. 141
— vulgaris. Glog. 141

Piculus. Br.
— crassirostris. Br. 88

Piculus herbarum. Br. 88
— hortorum. Br. 88
— minor. Br. 88
— pusillus. Br. 88
Picoïdes. Lacép.
— alpinus. Br. 90
— crissoleucos. Brandt. 90
— europaeus. Less. 90
— longirostris. Br. 90
— montanus. Br. 90
— septentrionalis. Br. 90
— tridactylus. Lacép. 90
— variegatus. Valene. 90
Picus. L. (Gesn.)
— alpestris. Rchb. 85
— Audubuni. Sw. 89
— baskiriensis. Verr. 85
— brevirostris. Rchb. 85
— brevirostris. Rchb. 85
— caniceps. Nils. 82
— *canus. L. 82
— chloris. Pall. 82
— cirris. Pall. 84
— cissa. Pall. 85
— cruentatus. Antin. 86 B.
— Cuvieri. Malh. 89
— cynaedus. Pall. 87
— damascenus. Antin. 86 B.
— discolor. Frisch. 85
— frondium. Br. 85
— fuliginosus. Licht. 86 B.
— hirsutus. Vieill. 90
— hortorum. Br. 88
— iynx. Pall. 91
— jaballa. Le Vaill. 86 A.
— jugurtha. Malh. 86 A.
— leucomelanus. Malh. 89
— leucomelas. Malh. 89
— *leuconotus. Bechst. 84
— Lilfordi. Sharpe u. Desser. (Türkey.) 84
— lucorum. Br 85
— lunatus. Br. 86 A.
— *major. L. 85
— *martius. L. 83
— mauritanus. Br. 86 A.
— maximus. Aldrov. 83
— *medius. L. 87
— meridionalis. Br. 87
Picus mesosphilus. Rchb. 85
— *minor. L. 88
— montanus. Br. 85
— murarius. Aldrov. 195
— niger. Briss. 83
— norwegicus. Lath. 82
— *numidicus. Malh. 86 A.
— pinetorum. Br. 85
— pipra. Macgil. 85
— pipra. Pall. 88
— pityopicus. Br. 85
— polonicus. Br. 84
— quercuum. Br. 87
— roseiventris. Br. 87
— rubricapillus. Nutt. 89
— septentrienalis. Nutt. 89
— sordidus. Br. 85
— striatus. Macgil. 88
— striolatus. Meyer. 88
— *syriacus. Hempr. u. Ehr. 86 B.
— syriacus. Taczan. 84
— tridactylus. L. 90
— varius. Briss. 87
— varius major. Briss. 85
— varius minor. Briss. 88
— varius virginianus. Briss. 89
— *villosus. L. 89
— viridicanus. M. u. W. 82
— *viridis. L. 81
— viridis norwegicus. Briss. 82
Pinguinus. Bonn.
— impennis. Bonn. 613
— pica. Bonat. 612
— torda. Bonat. 612
Pinicola. Cab.
— americana. Cab. 326
— enucleator. Cab. 326
Pipastes. Kaup.
— arboreus. Kaup. 266
Pipodes. Glog.
— tridactylus. Glog. 90
Pipricus. Bp.
— leuconotos. Bp. 84
Pipripicus. Bp
— medius. Bp. 87
— minor. Bp. 88
Plancus. Rchb. = Sula. Briss.
Planesticus. Kaup.

Planesticus atrogularis. Jerd. 173
— obscurus. Bp. 184
— olivaceus. Bp. 183
— pilaris. Kaup. 172
— ruficollis. Bp. 174
Platalea. L.
— alba. Scop. 462
— *leucerodius. Glog. 462
— leucorodia. L. 462
— nivea. Cuv. 462
— pygmaea. L. 465
Platea. Leach.
— leucoradia. Leach. 462
Platypus. Br.
— Altensteini. Br. 521
— Barrowi. Br. 518
— borealis. Br. 520
— clangulus. (Cab. Journ.) 514
— Faberi. Br. 517
— ferinus. Br. 507
— fuligulus. Br. 512
— fuscus. Br. 523
— glacialis. Br. 517
— glaucion. Br. 514
— histrionicus. Br. 518
— Hornschuchi. Br. 523
— islandicus. Br. 510
— Leisleri. Br. 520
— leucocephalos. Br. 489
— leucophthalmos. Br. 509
— marilus. Br. 510
— minutus. Br. 518
— mollissimus. Br. 520
— niger. Br. 524
— perspicillatus. Br. 522
— rufinus. Br. 506
— spectabilis. Br. 521
— Stelleri. Br. 519
Plautus. Klein. Rchb.
— albatrus. Klein. 560
— columbarius. Klein. 606
— glaucus. Rchb. 561
— impennis. Brünn. 613
— leucopterus. Rchb. 562
— pinguinus. Klein. 613
— stercorarius. Klein. 568
— tonsor. Klein. 612
Plectrophanes. Meyer.
Plectrophanes borealis. Br. 299
— *calcaratus. Meyer. 300
— fringilloïdes. Boie. 302
— groenlandicus. Br. 300
— hyemalis. Br. 299
— lapponicus. Selby. 300
— montanus. Br. 299
— mustelinus. Br. 299
— *nivalis. Meyer 299
Plegadis. Kaup.
— *falcinellus. Kaup. 444
Plegadornis. Br.
— falcinella. Br. 444
— major. Br. 444
— minor. Br. 444
Pluvialis. Barr.
— aegyptiacus. (Vieill.) 379
— albifrons. Br. 388
— apricarius. Bp. 388
— aurea. Briss. 388
— auratus. Br. 388
— cantianus. (Cab. Journ.) 397
— fluviatilis. (Bechst.) 397
— fulvus. Schl. 390
— hiaticula. (L.) 395
— longipes. Temm. 390
— major. Briss. 382
— minor. Briss. 391
— minor. (Cab. Journ.) 397
— septentrionalis. Br. 388
— squatarola. Macgil. 387
— torquata. Briss. 395
— torquata minor. Briss. 395
— varias. Schl. 387
— viridis. Willugb. 388
Pluvianus. Vieill.
— aegyptiacus. Vieill. 379
— aegyptius. Strickl. 379
— cantianus. (Cab. Journ.) 394
— chlorocephalos. Vieill. 379
— cursor. Heugl. 378
— fluviatilis. (Bechst.) 397
— hiaticula. (L.) 395
— melanocephalos. Vieill. 379
— minor. (Cab. Journ.) 397
Pluviorhynchos. Bp.
— mongolicus. Bp. 393
Podiceps. Lath.

Podiceps arcticus. Boie. 600
— auritus. Lath. 600
— auritus. Faber. 599
— bicornis. Br. 599
— canogularis. Br. 598
— caspicus. Lath. (J. Kl.) 599
— cinereogularis. Dub. 598
— cornutus. Lath. 599
— cornutus arcticus. Schl. 600
— cristatus. Lath. 597
— fluviatilis. Degl. 602
— griseigena. Gr. 598
— hebridicus. Lath. 600
— Holbölli. Reinh. 598
— longirostris. Bp. 598
— major. Schl. 598
— minor. Lath. (J. Kl.) 602
— mitratus. Br. 598
— nigricollis. Sundev. 599
— obscurus. Lath. (J. Kl.) 599
— orientalis. Br. 601
— patagiatus. Br. 598
— pygmaeus. Br. 602
— recurvirostra. Br. 601
— recurvirostris. Br. 601
— rubricollis. Audub. (Var.) 598
— rubricollis. Lath. 598
— sclavus. Bp. 599
— subcristatus. Bechst. 598
— urinator. Scop. 597
— Widhalmi. Goebel. (teste E. v. Hom.) 597
Podoces. Fischer.
— *Panderi. Fisch. 155
Poëcila. Kaup.
— accedens. Br. 113
— alpestris. Br. 113
— assimilis. Bp. 113
— ater. Kaup. 111
— borealis. Bp. 113
— cincla. (Bodd.) 114
— communis. Gerbe. 113
— frigoris. Bp. (Spec. americana, teste Degl.) 113
— fruticeti. Bp. 113
— lugens. Br. 115
— lugubris. Kaup. 115
— melanocephala. Br. 113
— murina. Br. 113
Poëcila obtecta. Cab. (Var.) 114
— palustris. Kaup. 112
— salicaria. Br. 113
— sibirica. Kaup. 114
— sordida. Br. 112
— stagnatilis. Br. 112
— subpalustris. Br. 112
Poecilornis. Kaup.
— cenchris. Kaup. 17
Poikilis. Blas.
— palustris. Blas. 112
— sibiricus. Blas. 114
Polioaëtos. Kaup.
— ichtyaëtos. Kaup. 37
Polymitra. Cab.
— Saharae. Cab. (?) 296
— striolata. Cab. 296
Polysticta. Eyt.
— Stelleri. Eyt. 519
Pomatorhynchus. Boie.
— erythropterus. Cab. 139
— tschagra. Boie. 139
Pontaëtos. Kaup.
— Macei. Kaup. 34
— vocifer. Kaup. 35
Pontrotriorchis. Cab.
— Eleonorae. Cab. 15
Porphyrio. Barr.
— alter. Aldrov. 469
— antiquorum. Bp. 469
— caesius. Barr. 469
— *hyacinthinus. Temm. 469
— olivarius. Barr. 468
— smaragdonotus. Temm. (Spec. africana.) 469
— veterum. Bp. 469
Porzana. Vieill.
— Bailloni. Vieill. 466
— maculata. Dub. 467
— maruetta. Vieill. 467
— minuta. Bp. 465
— pusilla. Dub. 465
— pygmaea. Bp. 466
Potamodus. Kaup.
— Cettii. K. u. Bl. 236
— luscinioïdes. Bp. 240
Praedatrix. Vieill. = Lestris. Ill.

Pratincola. Koch.
— Hemprichi. K. u. Bl. 196
— phoenicura. (Cab. Journ.) 198
— *rubetra. Koch. 197
— *rubicola. Koch. 196

Pratincola. Kramer.
— glareola. Degl. 380

Prinia. Frankl.
— cursitans. Frankl. 248

Priofinus. Jacq.
— cinereus. Coues. 580

Procellaria. L.
— alba. Gm. (?) 575
— albifasciata. Br. 576
— anglorum. Temm. 582
— anjinho. Heineck. 577
— Auduboni. Bp. 572
— Baroli. Bonelli. 584
— borealis. Br. 572
— brevirostris. l'Herm. 574
— Bullocki. Selby. 578
— Bulweri. Jard. 577
— *capensis. Leach. 573
— carneipes. Schl. 585
— cinerea. Briss. 572
— cinerea. Gm. (part.) 581
— cinerea. Gm. (part.) 580
— cinerea. Thien. 580
— columbina. Moqin. 577
— *diabolica. l'Herm. 574
— ferroensis. Br. 576
— fuliginosa. Kuhl. 585
— gigantea. Gm. 571
— *glacialis. L. 572
— glacialis, var. Auduboni. Bp. 572
— haesitata, Kuhl 574
— hastata. Forst. (?) 575
— hyemalis. Br. 572
— Kuhli. Boie. 580
— Leachi. Temm. 578
— Lessoni. Garnot. 575
— *leucocephalus. Forst. 575
— leucorrhoa. Vieil. 578
— lugubris. Natt. 576
— major. Schl. 581
— melanonyx. Nils. 576
— melanura. Bp. 580
— melitensis. Schemb. 576

Procellaria meridionalis. Lawr. 574
— minor. Br. 576
— minor. Kjaerb. 572
— naevia. Briss. 573
— obscura. Gm. 583
— oceanica. Kuhl. 579
— ossifraga. Forst. 571
— pacifica. Audub. 572
— pelagica. L. 576
— pelagica. Pall. 578
— pelagica. Wils. 579
— puffinus. Brünn. 582
— puffinus. L. 581
— puffinus. Temm. 580
— puffinus. Thien. 582
— tenuirostris. Br. 576
— vagabunda. Soland. 575
— variegata. Bonn. 575
— Wilsoni. Bp. 579
— yelkouan. Acerb. 584

Progne. Boie.
— purpurea. Boie. 76

Propasser. Hodgs.
— sordidus. Hodgs. (♂) 323

Prunella. Vieill.
— alpina. Vieill. 203
— modularis. Vieill. 204
— montanellus. Bp. 205

Psarocolius. Wagl.
— phoeniceus. Wagl. 160

Psaroïdes. Vieill. = Pastor. Temm.

Pseudaëtos. Hodgs.
— Bonellii. Bp. 30

Pseudoluscinia. Bp.
— Savii. Bp. 240

Psithyroedus. Glog. = Locustella. Kaup.

Psophia. Jacq.
— undulata. Jacq. 377

Pterocles. Temm.
— *alchata. Steph. 347
— *arenarius. Temm. 346
— setarius. Temm. 347
— syrrhaptes. Cab. Journ. 345

Pteroclurus. Bp.
— alchata. Bp. 347

Pterocyanea. Bp.

Pterocyanea circia. Bp. 499
— discors. Bp. 500
— glaucopteros. Br. 499
— scapularis. Br. 499

Ptynx. Blyth.
— liturata. Br. 59
— uralensis. Blyth. 59

Ptyonoprogne. Rchb.
— rupestris. Cab. (Rchb.) 80

Puffinus. Briss.
— anglorum. Nordm. 584
— anglorum. Ray. 582
— arcticus. Faber. 582
— Baroli. Bp. 584
— carneipes. Gould. 585
— cinereus. Audub. 581
— cinereus. Cuv. 580
— cinereus fem. Gould. 585
— cinereus. juv. Smith. 585
— columbinus. Moquin. 577
— floridanus. Mus. Berol. 583
— fuliginosus. Strickl. 585
— griseus. Lath. 585
— Kuhli. Bp. 580
— l'Herminieri. (Less.) 574
— major. Faber. 581
— major. fem. Faber. 585
— nugax, Bailloni. Bp. 583
— obscurus. Boie. 583
— yelkouan. Bp. 584

Pulocondora. Rchb.
— tridactyla. Rchb. 554

Pycnonotus. Kuhl.
— aurigaster. Gr. 162
— aurigaster. Antin. 161 B.
— auriventer. Glog. 162
— barbatus. Desf. 161 A.
— croccorrhous. Strickl. 162
— Levaillanti. Rüpp. 161 B.
— nigricans. Gr. 161 B.
— obscurus. Blyth. 161 A.
— xanthopygius. (Ehrenb.) 161 B.

Pygargus. Koch.
— accipiter. Ray. 49
— dispar. Koch. 49
— rufus. Koch. 48

Pyrgita. Cuv.
Pyrgita brachyrhynchos. Br. 329
— cahirina. Pr. Max. 331
— campestris. Br. 332
— castaneus. Br. 329
— castanotus. Pr. Max. 329
— cisalpina. Br. 330
— domestica. Cuv.' 329
— hispanica. A. Br. 331
— hispaniolensis. Rüpp. 331
— intercedens. Br. 329
— italiae. Bp. 330
— megarhynchos. Br. 329
— microrhynchos. Br. 329
— minor. Br. 329
— montana. Cuv. 332
— orientalis. Br. 331
— pagorum. Br. 329
— pectoralis. Br. 329
— petronia. K. u. Bl. 333
— rufidorsalis. Br. 329
— rustica. Br. 329
— salicaria. Bp. 331
— septentrionalis. Br. 332
— valida. Br. 329

Pyrophthalma. Bp.
— luctuosa. Br. 220
— melanocephala. Bp. 220
— nigricapilla. Br. 220
— provincialis. A. Br. 217
— sarda. Bp. 218

Pyrrhocorax. Vieill.
— *alpinus. Vieill. 153
— digitata. Hempr. u. Ehr. 153
— *graculus. Temm. 154
— montanus. Br. 153
— planiceps. Br. 153
— pyrrhocorax. Temm. 153
— rupestris. Br. 154

Pyrrhula. Briss.
— coccinea. Selys. 319
— caucasica. K. u. Bl. 328
— caudata. Pall. 321
— enucleator. Audub. (Amerika.) 326
— enucleator. Temm. 326
— *erythrina. Temm. 323
— europaea. Vieill. 319
— germanica. Br. 319
— *githaginea. Temm. 320

Pyrrhula hudsonia. Vieill. 301
— incerta. (Risso.) 323
— islandica. (Faber.) 317
— longicauda. Temm. 321
— major. Br. 319
— minor. Br. 319
— Payraudei. Audouin. 320
— peregrina. Br. 319
— pileata. Macgil. 319
— pusilla. Degl. 318
— *rhodochlamys. Brandt. 325
— *rhodoptera. Temm. 322
— *rosea. Temm. 324
— rubricilla. Pall. 319
— rufa. Koch. 319
— sanguinea. (Cab. Journ.) 319
— serinus. Degl. 317
— serinus islandicus. Schl. 317
— *sibirica. K. u. Bl. 321
— sinaica. v. d. Mühle. 320
— *vulgaris. Briss. 319

Pyrrhulinota. Hodgs.
— rosaecolor. Hodgs. 323
— rosea. Hodgs. 323
— roseata. Hodgs. 323

Querquedula. Briss.
— acuta. Selby. 494
— americana. Br. 501
— americana. Briss. 500
— angustirostris. Bp. 497
— circia. Steph. 499
— crecca. Steph. 501
— creccoïdes. Br. 501
— discors. Steph. 500
— falcaria. Eyt. 495
— falcata. Bp. 495
— formosa. Steph. 496
— glaucopteros. Br. 499
— glocitans. Vig. 496
— groenlandica. Br. 501
— ludoviciana. Briss. 516
— minor. Briss. 501
— scapularis. Br. 499
— sponsa. Degl, 504
— strepera. Macgil. 498
— subcrecca. Br. 501
— virginiana. Br. 500

Rallus. L.
— *aquaticus. L. 463
— aquaticus, minor. Briss. 467
— Bailloni. Vieill. 466
— chloropus. Savi. 468
— crex. L. 464
— fuscilateralis. Br. 463
— genistarum. Br. 464
— germanicus. Br. 463
— lariformis. L. (J. Kl.) 541
— minor. Bp. Br. 463
— minutus. Pall. 465
— mixtus. Lapeyr. 465
— parvus. Scop. 465
— Peyrousei. Vieill. 465
— porzanus. L. 467
— pusillus. Pall. Gm. 465
— sericeus. Leach. 463
— stellaris. Temm. 466

Recurvirostra. L.
— *avocetta. L. 403
— fissipes. Br. 403
— helevi. Br. 403

Reguloïdes. Blyth.
— modestus. Blyth. 229
— proregulus. Blyth. 229

Regulus. Koch.
— auricapillus. Selby. 124
— brachyrhynchos. Br. 125
— chloronotus. Gr. 229
— chrysocephalos. Br. 124
— *cristatus. Koch. 124
— croccocephalos. Br. 124
— flavicapillus. Naum. 124
— *ignicapillus. Naum. (Licht.) 125
— inornatus. Blyth. 229
— modestus. Gould. Hodgs. 229
— mystaceus. Vieill. 125
— Nilsoni. Br. 125
— proregulus. K. u. Bl. 229
— pyrrocephalos. Br. 125
— septentrionalis. Br. 124
— trochiloïdes. Gr. 229
— vulgaris. Flem. Savi. 124

Rhanistes. Kaup.
— glacialis. Kaup. 572

Rhimanphus. Rafin.
— virens. Rafin. 126

Rhodopechys. Cab.
— phoenicoptera. Cab. 322
Rhodostethia. Macgil.
— rosea. Brucb. 544
— Rossi. Macgil. 544
Rhyacophilus. Kaup.
— affinis. Bp. 427
— glareola. Kaup. 427
Rhynchaspis. Leach.
— *clypeata. Leach. 505
— macrorhynchos. Br. 505
— pomarina. Br. 505
— platyrhynchos. Br. 505
— platyuros. Br. 505
— spatulata. Dub. 505
Rhynchophilus. Kaup.
— affinis Bp. 427
— glareola. Kaup. 427
Rissa. Steph.
— borealis. Br. 554
— brevirostris. (Brandt.) 554
— Brünnichi. Steph. 554
— cinerea. Eyt. 554
— gregaria. Br. 554
— minor. Br. 554
— nivea. Bp. 556
— septentrionalis (Lawr.) 554
— tridactyla. Leach. Br. 554
Rossia. Bp.
— rosea. Bp. 544
Rubecula. Br.
— familiaris. Blyth. 210
— foliorum. Br. 210
— pinetorum. Br. 210
— rubecula. Bp. 210
— septentrionalis. Br, 210
— sylvestris. A. Br. 210
— vulgaris. Br. 210
Rubetra. Briss.
— anglica. Briss. 128
— major. Briss. 197
Rufibrenta. Bp.
— ruficollis. Bp. 487
Rusticola. Möhr.
— europaea. Less. 435
— pinetorum. Br. 435
— platyura. Br. 435
Rusticola scoparia. Br. 435
— sylvestris. Macgil. 435
— vulgaris. Vieill. 435
Ruticilla. Br.
— atra. Br. 202
— atrata. Br. 202
— arborea. Br. 198
— aurorea. Br. 199
— Cairi. Gerbe. 202
— domestica. (Cab. Journ.) 202
— erythaca. Bp. 202
— *erythrogaster. Br. 199
— erythronotus. Gr. 200
— gibraltariensis. Briss. 202
— hortensis. Br. 198
— lugubris. Br. 202
— montana. Br. 202
— *Moussieri. Tristr. 201
— pectoralis. Heugl. 198
— *phoenicurus. Bp. 198
— simplex. Less. 198
— sylvestris. Br. 198
— *tithys. Br. 202
— tithys. Hutton. 198
— vulgaris. Br. 202
Salicaria. Selby.
— ambigna. Schl. 233
— aquatica. K. u. Bl. 244
— arundinacea. Selby. 246
— caligata. Schl. 235
— cariceti. K. u. Bl. 244
— *certhiola. K. u. Bl. 239
— Cettii. K. u. Bl. 236
— cisticola. K. u. Bl. 248
— elaïca. Liderm. 233
— familiaris. Schl. 241
— *fluviatilis. K. u. Bl. 238
— galactodes. K. u. Bl. 241
— italica. de Filip. 230
— lanceolata. Schl. 237
— *locustella. Selby. 237
— *luscinioïdes. K. u. Bl. 240
— melampogon. K. u. Bl. 242
— melanopogon. (K. u. Bl.) 242
— olivetorum. Gould. 232
— pallida. Ehrenb. 234
— palustris. K. u. Bl. 247
— phragmitis. Selby. 213

Salicaria polyglotta. (Vieill.) 231
— rubiginosa. (Temm.) 241
— Savii. (Bp.) 240
— sericea. K. u. Bl. 236
— turdina. Schl. 245
— turdoïdes. K. u. Bl. 245
Saxicola. Bechst.
— albicollis. Bp. 190
— albigularis. v. Pelzeln. 187
— amphileuca. Hempr. u. Ehr. 190
— atricollis. v. Müller. 192
— atrogularis. Dub. 191
— *aurita. Temm. 190
— cachinans. Temm. 195
— cinerea. Dub. 188
— crampes. Br. 197
— eurymelana. Hempr. u. Ehr. 191
— fervida. Gm. (?) 197
— fruticeti. Br. 196
— gracilis. Mus. Berol. 194
— gutturalis. (Guér.) 187
— gutturalis. Hempr. u. Ehr. (Species africana.) 187
— halophila. Tristr. 190
— Hemprichi. Ehrenb. 196
— indica. Blyth. 196
— intermedia. Heugl. (?) 192
— isabellina. Gr. 189
— *isabellina. Temm. 194
— leucocephala. Heugl. 195
— *leucomela. K. u. Bl. 192
— leucomela. Temm. 193
— leucopygia. Pr. Würt. 195
— leucothera. Lefebr. 189
— *leucura. Licht. 195
— lugens. Adams. 192
— *lugens. Licht. 193
— maura. Br. 196
— media. Br. 196
— melanoleuca. Lath. 192
— monacha. Rüpp. 194
— monacha. Mus. Lugd. Bat. 195
— montana. Gould. 189
— montana. Koch. 186
— morio. Hempr. u. Ehr. 192
— muscipeta. Scop. 196
— *oenanthe. Bechst. 188
— oenanthoïdes. Vig. 188
— olivastra. Rüpp. 189
Saxicola pallida. Blyth. 269
— pallida. Rüpp. (J. Kl.) 194
— phoenicura. Koch. 198
— pratorum. Br. 197
— rostrata. Hempr. u. Ehr. 188
— rubecula. Bp. 197
— rubecula. Sundev. 196
— rubicola. Bechst. 196
— rubetra. Temm. 197
— rufa. A. Br. (Cab. Journ.) 191
— saltator. Ménétr. 189
— *saltatrix. K. u. Bl. 189
— saturatior. Hodgs. 196
— septentrionalis. Br. 197
— squalida. Eversm. 189
— *stapazina. Temm. 191
— Stricklandi. Bp. 194
— suecica. Koch. 207
— tithys. Br. 196
— tithys. Koch. 202
— valida. Licht. 189
— vitiflora. Pall. (teste v. Müller.) 188
Saxilauda. Less.
— tatarica. Less. 276
Schoeniclus. Möhr.
— alpina. Gr. 407
— cisticola. (Blas.) 248
— minutus. Möhr. 414
— pectoralis. Gr. 412
— pusillus. Gr. 415
— Schinzi. Gr. 413
— subarquata. Möhr. 411
— Temmincki. Gr. 415
— variabilis. Möhr. 407
Schoenicola. Blas.
— cisticola. Blas. 248
Schoenicula. Bp.
— arundinacea. Bp. 290
— intermedia. Bp. 290
— pyrrhuloïdes. Bp. 291
Scolopax. L.
— aegocephala. L. (S. Kl) 438
— africana. Gm. (Ueb. Kl.) 411
— arquata. L. 442
— autumnalis. E. v. Hom. 430
— belgica. Gm. (S. Kl.) 438
— borealis. Gm. 440
— Brehmi. Kaup. 431
— calidris. L. 424

Scolopax canescens. Gm. 422
— cantabrigiensis. L. 425
— cinerea. Güldenst. 436
— curonica. Besecke. Gm. 425
— Delamotti. Baill. 431
— Dethardingi. Bechst. (W. Kl.) 411
— Dethardingi. Lath. 406
— flavipes. Gm. 426
— fusca. L. (S. Kl.) 425
— gallinago. L. 431
— gallinaria. Gm. 431
— gallinula. L. 433
— glottis. L. 422
— grisea. Gm. 434
— indica. Bp. 435
— Lamotti. Baill. 431
— lapponica. L. (S. Kl.) 437
— leucocephala. Lath. (J. Kl.) 437
— leucophaea. Vieill. 434
— limosa. L. (W. Kl.) 438
— longirostris. Bell. 434
— luzeniensis. Gm. 439
— major. L. 430
— major. Mont. (Var.) 430
— media. Frisch. 430
— media. Steph. 431
— melanura. Leisl. 438
— minima. Leach. 433
— minor. Br. 433
— natans. Otto. (W. Kl.) 425
— nigra. Gm. 425
— novaeboracensis. Gm. 434
— obscura. Gm. 463
— palludosa. Retz. 430
— palustris. Pall. 430
— Paykulli. Nils. 434
— peregrina. Br. 431
— phaeopus. L. 439
— pinetorum. Br. 435
— platyura. Bp. 435
— pusilla. L. (teste Br. Lehrb.) 408
— pusilla. L. (teste Schinz.) 407
— pygmaea. Baill. 431
— pygmaea. Gm. (teste Brehm 411.) 406
— *rusticola. L. 435
— Sabinei. Vig. 432
— scoparia. Bp. 435
— semipalmata. Wils. 429
— solitaria. Macgil. 430
Scolopax stagnatilis. Br. 433
— stenura. Temm. 431
— subarquata. Güldenst. 411
— sumatrana. Raffl. 436
— sylvestris. Br. 435
— terek. Lath. 436
— torquata. Br. 435
— totanus. Gm. (J. Kl.) 425
— totanus. L. (S. Kl.) 423
Scops. Gr.
— virgo. Gr. 370
Scops. Willugb. Savig.
— africana. (Schl.) 67
— Aldrovandi. Flem. 67
— asio. Bp. 68
— capensis. A. Smith. (Afrika) 67
— carniolica. Bp. 67
— carolinensis. Briss. 68
— ephialtes. Savig. 67
— ephialtes var. Gr. (Afrika) 67
— europaeus. Less. 67
— fazoglensis. Pr. Würt. (Afrika.) 67
— minor. Br. 67
— pennata. Hodgs. 67
— rufescens. Br. 67
— rupestris. Br. 67
— senegalensis. Sw. (Afrika.) 67
— vera. Finsch. 67
— vulgaris. Cuv. (Cab. Journ.) 67
— zonca. Degl. 67
— zorca. Sw. 67
— zorca africana. Schl. 67
Scotaeus. K. u. Bl.
— nycticorax. K. u. Bl. 451
Scotiapteryx. = Scotiaptex. Sw.
Scotiaptex. Sw.
— cinerea. Sw. 60
Scotophilus. Sw. = Nyctale. Br.
Scotornis. Sw.
— Boreani. Coll. Merg. 71
— climacteris. Sw. 71
— climacterus. (Sw.) 71
— climacturus. (Sw.) 71
— climacurus. Sw. 71
— furcatus. Coll. Merg. 71
— longicauda. Cass. 71
— longipennis. Coll. Merg. 71

Scotornis macrocerus. Coll. Merg. 71
— phasianurus. Coll. Merg. 71
Serinus. Boie.
— aurifrons. Blyth. 318
— brumalis. Strickl. 317
— chloris. Boie. 307
— citrinella. Boie. 308
— desertorum. Dub. 320
— erythrinus. Glog. 323
— flavescens. Gould. 317
— githagineus. Glog. 320
— hortulanus. Koch. 317
— incertus. (Risso.) 323
— islandicus. Bp. Br. 317
— italicus. Boie. 308
— longicauda. Dub. 321
— luteolus. E. v. Hom. 317
— meridionalis. Br. 317
— occidentalis. Br. 317
— orientalis. Br. 317
— pusillus. Brandt. 318
— spinus. Boie. 315
Sibilatrix. Kaup.
— sylvicola. Kaup. 226
Simorhynchus. K. u. Bl.
— cinereus. K. u. Bl. 436
Sitta. L.
— affinis. Blyth. 106
— asiatica. Gould. 107
— *caesia. M. u. W. 106
— europaea. L. 107
— europaea. Lath. 106
— europaea. K. u. Bl. 106
— europaea. Naum. 106
— europaea. Schl. 106
— europaea var. sibirica. Pall. 107
— foliorum. Br. 106
— *Krueperi. v. Pelzeln. 109
— Neumayeri. Michah. 108
— pinetorum. Br. 106
— rufescens. Temm. 108
— rupestris. Cantr. 108
— saxatilis. Schinz. 108
— sericea. Temm. 107
— *syriaca. Ehrenb. 108
— *uralensis. Licht. 107
— uralensis. Schl. 107
— uralensis. K. u. Bl. 107
Somateria. Leach.
Somateria Altensteini. Br. 521
— borealis. Br. 520
— Cuthberti. Eyt. 520
— danica. Br. 520
— faeroensis. Br. 520
— islandica. Br. 520
— Leisleri. Br. 520
— megarhynchos. Br. 521
— megauros. Br. 520
— *mollissima. Leach. 520
— norwegica. Br. 520
— planifrons. Br. 520
— platyurus. Br. 520
— *spectabilis. Leach. 521
— thulensis. Malmgr. 520
— *Stelleri. Dub. 519
— vulgaris. Dub 520
Sparvius. Vieill.
— badius. Vieill. 22
— gabar. Vieill. 24
— leucorrhous. Vieill. 24
— niger. Vieill. 24
— nisus. Vieill. 23
— palumbarius. Vieill. 21
Spathulea. Flem. = Spatula. Boie.
Spatula. Boie.
— clypeata. Boie. 505
Spermolegus. Kaup.
— alpinus. Kaup. 203
— montanellus. Kaup. 205
Spermophila. Gr.
— longicauda. Gr. 321
Spina. Kaup.
— miliaria. Kaup. 282
Spinus. Koch.
— alnorum. Br. 315
— betularum. Br. 315
— carduelis. Koch. 313
— citrinellus. Koch 308
— linarius. Koch. 311
— medius. Br. 315
— miliarius. Gr. 282
— obsoletus. Br. 315
— viridis. Koch. 315
Spipola. Leach.
— obscura. Leach. 262
Spizacircus. Kaup.

Spizacircus rufus. Kaup. 48
Spizaëtos. Jerd.
— milvoïdes. Jerd. 31
Spodioszpina. Heugl.
— cinerea. Heugl. 295
Squatarola. Leach.
— cinerea. Flem. 387
— grisea. Leach. 387
— *helvetica. K. u. Bl. 387
— megarhynchos. Br. 387
— melanogaster. Malh. 387
— rhynchomega. Bp. 387
— squatarola. Cuv. 387
— varia. Boie. 387
— Wilsoni. Licht. 387
Stagnicola. Br.
— chloropus. Br. 468
— minor. Br. 468
— parvifrons. Br. 468
Starna. Bp.
— *cinerea. K. u. Bl. 361
— minor. Br. 361
— perdix. Bp. 361
— sylvestris. Br. 361
Stellaria. Bp.
— dispar. Bp. 519
Stercorarius. Briss.
— antarcticus. (Less.) 565
— Buffoni. Coues. 567
— catarrhactes. Gr. 565
— cephus. Schl. 568
— cepphus. Degl. 567
— Lessoni. Degl. 566
— longicaudatus. Degl. 568
— longicaudus. Briss. 568
— parasiticus. Gr. 567
— pomarinus. Briss. 566
— pomarinus. Vieill. (Gal. d. Ois.) 565
— pomarinus. Vieill. (Nouv. Dict.) 566
— striatus. Briss. 566
Sterna. L.
— acuflavida. Cabot. 531
— affinis. Horsf. (ex Java) 533
— *affinis. Rüpp. 532
— africana. Gm. 531
— albistriata. Gray. 539
— *anglica. Montag. 533
— antarctica. Forst. 538
Sterna arabica. Ehrenb. 532
— aranea. Wils. (ex Amerika.) 533
— arctica, Temm. 536
— argentata. Br. 536
— argentea. (Br.) 536
— Bergei. Licht. 534
— Bergii. Rchb. 531
— bicuspis. Licht. 535
— Blasii. Br. 537
— Boysi. Lath. 531
— Boysi var. a. Lath. (J. Kl.) 541
— brachypus. Sw. 536
— brachytarsa. Grabra. 536
— canescens. M. u. W. 531
— *cantiaca. Gm. 531
— *caspia. Pall. 530
— cayennensis. Gm. 531
— coccinirostris. Rchb. 536
— columbina. Schrank. 531
— cristata. Steph. 534
— Delalandi. Vieill. 539
— Delamottei. Vieill. 539
— *Dougalli. Montag. 535
— Douglasi. Temm. 535
— Dugalli. (Montag.) 535
— Duglasi. (Temm.) 535
— fluviatilis. Naum. 537
— fluviatilis. Gould. 539
— *fissipes. L. 541
— fissipes. Pall. 540
— fuliginosa. L. 542
— fusca. Briss. (J. Kl.) 543
— Gouldi. Rchb. 542
— grisea. Horsf. 539
— guttata. Forst. (J. Kl.) 542
— hirundo. Bp. 536
— hirundo. Brünn. 536
— *hirundo. L. (part.) 536
— hirundo. L. (part.) 537
— *hybrida. Pall. 539
— indica. Steph. 539
— infuscata. Licht. 542
— leucoceps. Steph. 543
— leucogenys. Br. 539
— leucopareia. Natt. 539
— leucoptera. Meiss. u. Schinz. 540
— longirostris. Less. 534
— Macdougalli. Macgil. 535
— macrotarsa. Gould. (ex Amerika) 533

Sterna macroura. (Naum.) 536
— macrura. Naum. 536
— megarhyncha. Meyer. 530
— marina. Eyt. 537
— maxuriensis. Ehrenb. 532
— media. Horsf. 532
— megarhynchos. M. u. W. 530
— melanoptera. Sw. 542
— melanotis. Sw. (W. Kl.) 530
— meridionalis. Br. 533
— metopoleucos. Gm. 538
— minor. Briss 538
— *minuta. L. 538
— naevia. Bew. 531
— naevia. Briss. (J. Kl.) 541
— naevia. Gm. L. (J. Kl.) 540
— nera. Storr. 540
— nereis. Gould. 548
— nigra. Briss. 541
— *nigra. L. 540
— nigripennis. Bp. 534
— nilotica. L. 539
— nilotica. Hasselq. 537
— nilotica. Rüpp. 539
— Nitzschi. Kaup. 536
— nubilosa. Sparr. (J. Kl.) 531
— obscura. L. 541
— *paradisea. Brünn. 536
— paradisea. K. u. Bl. 535
— parva. Penn. 538
— philadelphia. Ord. 550
— philippina. Lath. 543
— pileata. Scop. 543
— plumbea. Wils. 541
— rectirostris. Peale. 534
— ressa. Müller. 534
— risoria. Br. 533
— Schillingi. Br. 530
— serrata. Forst. 542
— similis. Gr. 539
— simplex. Gm. (part.) 531
— stolida. L. 543
— strenua. Gould. 530
— striata. L. (J. Kl.) 531
— stubberica. Otto. 531
— surinamensis. Gm. (teste Bp.) 541
— tenuirostris. Blyth. 543
— tenuirostris. Licht. 535
— Torresi. Gould. 532
Sterna tschegrava. Lepech. 530
— velox. Rüpp. 534
— vulgaris. Dub. 537
Sternula. Boie.
— australis. Licht. 538
— danica. Br. 538
— danubialis. Br. 538
— fissipes. Br. 538
— meridionalis. Br. 538
— minuta. Boie. 538
— orientalis. Br. 538
— pomarina. Br. 538
Sterparola. Bp. = Stoparola. Bp.
Stoparola. Bp.
— conspicillata. Bp. 216
Strepsilas. Ill.
— borealis. Br. 398
— collaris. Temm. 398
— *interpres. Ill. 398
— littoralis. Br. 398
— melanocephala. Vig. 398
— minor. Br. 398
Streptoceryle. Bp.
— alcyon. Bp. 100
Streptopelia. Bp.
— risoria. Bp. 343
Stridula. Selys. = Strix. L.
Strigiceps. Bp.
— ater. Bp. 50
— cineraceus. Bp. 50
— cinerascens. Br. 50
— cinereus. Br. 49
— cyaneus. Bp Br. 49
— desertorum. Br. 51
— elegans. Br. 50
— nigripennis. Br. 49
— pallens. Br. 49
— pallidus. Br. 51
— pratorum. Br. 50
— Swainsoni. Bp. 51
Strix. L.
— acadica. L. Temm. 54
— accadiensis. Lath. 54
— accipitrina. Pall. 64
— acclamator. Bartr. 61
— adspersa. Br. 62
— aedium. Zander. 58

Strix aegolius. Pall. 64
— alba. Briss. 53
— alba. Scop. 58
— albus. Daud. 65
— albifrons. Lath. 68
— *aluco. L. 58
— aluco. Brünn. 64
— arctica. Bartr. 53
— arctica. Sparr. 64
— ascalaphus. Audouin. 66
— asio. L. Wils. 68
— atheniensis. Daud. 65
— aucuparia. Bonell. 55
— barbata. Pall. 60
— brachyotus. Gm. 64
— brachyura. Nils. 64
— bubo. L. 65
— canadensis. Briss. 52
— candida. Lath. 53
— carniolica. Gm. 67
— caspia. Shaw. 64
— chichictli. Gm. 61
— cinerea. Gm. 60
— dasypus. Bechst. 57
— deminuta. Pall. 64
— doliata. Pall. 52
— erminea. Shaw. 53
— *flammea. L. 62
— fretihudonis. Briss. 52
— fuliginosa. Shaw. 60
— funerea. L. (1761) 57
— *funerea. L. (1766) 52
— giu. Scop. 67
— gui. (Scop.) 67
— guttata. Br. 62
— hudsonia. L. 52
— Kirchoffi. Br. 62
— *lapponica. Retz. 60
— lineatus. Vieill. 68
— litura. (Retz.) 59
— liturata. Retz. 59
— macrocephalon. Meissn. 59
— macroura. Natt. M. u. W. 59
— maculata. Br. 62
— margaritata. Pr. Würt. 62
— *meridionalis. Risso. 56
— microphthalma. Tyzenski. 60
— naevius. Gm. 68
— *nebulosa. L. 61
Strix nisoria. Meyer. 52
— nivea. Daud. 53
— noctua. Forsk. 56
— *noctua. Retz. 55
— noctua. Scop. 58
— noctua. Tengm. 57
— noctua meridionalis. Schl. 56
— nudipes. Nils. 55
— numida. Levaill. 55
— *nyctea. L. 53
— obscura. Br. 62
— otus. L. 63
— palustris. Siems. 64
— paradoxa. Hempr. Br. 62
— passerina. Bechst. 55
— passerina. Lath. 55
— passerina. Pall. 57
— *passerina. L. 54
— passerina. Sonn. 56
— passerina. Temm. 55
— persica. Vieill. 56
— psilodactyla. Nils. 55
— pulchella. Pall. 67
— pusilla. Daud. 54
— pygmaea. Bechst. 54
— rufa. Scop. 58
— scandiaca. L. 53
— scops. L. 67
— sibirica. Licht. 65
— soloniensis. Scop. 58
— splendens. Hempr. Br. 62
— striatus. Vieill. 68
— stridula. L. 58
— sylvatica. Shaw. 58
— sylvestris. Scop. 58
— *Tengmalmi. Gm. 57
— tripennis. Schr. 64
— turcomana. Eversm. 65
— ulula. Gm. Bechst. 64
— ulula. L. 52
— ulula. Pall. 64
— *uralensis. Pall. 59
— varius. Barton. 61
— vulgaris. Br. 62
— wapacuthu. Vieill. 53
— zorca. Gm. 67
Strobilophaga. Vieill.
— enucleator. Vieill. 326
Struthus. Boie. Bp.

Struthus coelebs. Boie. 304
— hyemalis. Bp. 301
— montifringilla. Boie. 306

Sturnus. L.
— atthis. Daud. 97
— cinclus. L. 250
— cinclus var. β. Pall. 251
— collaris. Gm. 203
— domesticus. Br. 158
— europaeus. L. (Cab. Journ.) 158
— indicus. Hodgs. 158
— longirostris. Br. 158
— mauritanus. Lath. 203
— melancholicus. var. β. Lath. 160
— moritanus. Gm. 203
— nitens. Br. 158
— praedatorius. Wils. 160
— roseus. Scop. 157
— septentrionalis. Br. 158
— splendens Temm. 158
— sylvestris. Br. 158
— tenuirostris. Br. 158
— *unicolor. Lamarm. 159
— varius. M. u. W. 158
— *vulgaris. L. 158
— vulgaris niger. Bp. 159
— vulgaris unicolor. Schl. 159

Sula. Briss.
— alba. M. u. W. 587
— americana. Bp. 587
— australis. Gould. 588
— *bassana. Briss. 587
— intermedia. Lefevr. 588
— Lefevri. Baldamus. 588
— *melanura. Temm. 588
— serrator. Banks. 588

Sularius. Rafin.
— bassanus. Rafin. 587

Surnia. Duméril.
— borealis. Less. 52
— funerea. Br. 52
— hudsonia. Br. 52
— nivea. Dumér. 53
— nisoria. Sav. 52
— noctua. Dumér. 55
— noctua. Bp. 55
— noctua. v. d. Mühle. 56
— nyctia. K. u. Bl. 53

Surnia passerina. Dumér. 54
— passerina. (K. u. Bl.) 54
— ulula. Bp. 52
— uralensis. Less. 59

Sylbeocyclus. Bp.
— europaeus. Macgil. 602
— minor. Bp. 602

Sylochelidon. Br.
— affinis. Rüpp. 532
— balticum. Br. 530
— caspicum. Br. 530
— Schillingi. Br. 530
— velox. Rüpp. 534

Sylvia. Lath.
— abietina. Nils. 223
— aedonia. Vieill. 212
— affinis. Hardy. 246
— albigularis. Krüper. 187
— albistriata. Br 219
— ambigna. Durazz. 231
— angusticauda. Gerbe. (J. Kl.) 224
— aquatica. Lath. 244
— arundinacea. Lath. 246
— assimilis. Br. 222
— atrata. Lath. 202
— *atricapilla. Lath. 213
— atrigularis. Savi. 173
— azuricollis. Rafin. 207
— Bonellii. Naum. 242
— Bonellii. Vieill. 227
— borealis. (Blas.) 225
— Bowmanni. Tristr. 220
— brunnea. Forst. 223
— caligata. Licht. 235
— calliope. Glog. 206
— campylonys. Hempr. u. Ehr. 202
— caniceps. Br. 215
— capistrata. Rüpp. 214
— cariceti. Naum. 244
— certhiola. Temm 239
— Cettii. Lamarm. 236
— cineracea. Br. 215
— cineraria. Bechst. 215
— *cinerea. Lath. 215
cisticola. Temm. 248
— coerulecula. (Mus. Berol.) 207
— collybita. Vieill. 223
— *conspicillata. Lamarm. 216

*Sylvia curruca. Lath. 222
— cyanea. Eversm. 207
— cyanecula. M. u. W. 207
— dartfordiensis. Lath. 217
— dichrosterna. (Br.) 207
— dumetorum. Br. 222
— elaïca. Linderm. 233
— erythrogastra. Sundev. 199
— erythronota. Eversm. 200
— Eversmanni. v. d. M. 225
— familiaris. Ménétr. 241
— ferruginea. Vieill. 217
— ficedula. Lath. (teste Naum.) 128
— fitis. Bechst. 224
— flaviventris. Vieill. (J. Kl.) 224
— fluviatilis. M. u. W. 238
— fruticeti. Bechst. 215
— fruticola. Naum. (?) 246
— galactodes. Temm. 241
— garrula. Bechst. 222
— gibraltariensis. Lath. 202
— grisea. Vieill. 221
— Heineckeni. Jard. (Madeira) 213
— Hemprichi. Ehrenb. 196
— hippolais. Penn. 223
— *hortensis. Lath. 212
— horticola. Naum. 246
— hypolaïs. Bechst. 230
— hypolaïs. Gerbe. 231
— hypolaïs. Lath. 230
— hypolaïs. Nils. 230
— hypolaïs. Temm. 230
— icterina. Eversm. 225
— icterina. Vieill. 230
— ignicapilla. Lath. 125
— iliaca. Savi. 177
— javanica. Horsf. 228
— lanceolata. Temm. 237
— leucocyanea. (Br) 207
— leucopogon. Heckel. 222
— leucopogon. Meyer. 219
— leucosterna. (Cab. Journ.) 207
— leucura. Savi. 195
— locustella. Lath. 237
— luscinia. Lath. 208
— luscinioïdes. Savi. 240
— Meisneri. Pässl. 224
— melampogon. K. u. Bl. 242
— *melancephala. Lath. 220
Sylvia melandiros. Linderm. 214
— melanopogon. Temm. 242
— merula. Savi. 166
— modularis. Lath. 204
— molaria. Br. 222
— montanella. Lath. 205
— musica. Savi. 178
— mystacea. Ménétr. 219
— Nattereri. Temm. 227
— Naumanni. v. Müller. 213
— nigricapilla. (Br. Cab.) 220
— nigrifrons. Bechst. 247
— *nisoria. Bechst. 211
— obscura. Br. 222
— ochrogenion. Linderm. 220
— oenanthe. Lath. 188
— olivetorum. Strickl. 232
— opaca. Licht. (teste E. v. Hom.) 234
— orientalis. (Br.) 207
— *orphea. Temm. 221
— pallida. (Heugl.) 234
— pallidicola. (Vieill.) 244
— paludicula. Vieill. 244
— palustris. Bechst. 247
— passerina. Temm. 219
— philomela. Bechst. 209
— phoenicurus. Lath. 198
— phragmitis. Bechst. 243
— pilaris. Savi. 172
— platyura. Vieill. 236
— polyglotta. Vieill. 231
— prasinopygia. Licht. 227
— Preglii. Frauenf. 233
— proregulus. (Pall.) 229
— *provincialis. Temm. 217
— regulus. Lath. 124
— rubecula. Lath. 210
— rubetra. Lath. 197
— rubicola. Lath. 196
— rubiginosa. Temm. 241
— rubricapilla. Landb. 213
— *Rueppelli. Temm. 214
— rufa. Lath. 223
— rufescens. Savi. 190
— ruficapilla. Naum. 213
— ruscicola. Vieill 220
— salicaria. Bechst. 244
— *sarda. Lamarm. 218
— sardonia. Vieill. 218

Sylvia Savii. (Bp.) 240
— saxatilis. Savi. 186
— schoenobaenus. Scop. 214
— schoenobaenus. Vieill. 243
— scita. Eversm. 235
— septentrionalis. Br. 222
— sericea. Natt. 236
— sibilatrix. Bechst. 226
— solitaria. Savi. 185
— stapazina. Lath. 191
— stapazina var. b. Lath. 190
— strepera. Vieill. 246
— strepera var. 2. Vieill. 247
— striata. Br. 244
— *subalpina. Bonell. 218
— subalpina leucopogon. Br. 219
— suecica. Lath. 207
— superciliaris. Br. 222
— superciliosa. Lath. 229
— sylvestris. Meisn. 224
— sylvicola. Lath. 226
— tamarixis. Cresp. 224
— tithys. Lath. 202
— torquata. Savi. 167
— trochilus. Lath. 224
— troglodytes. Lath. 249
— turdina. Glog. 245
— turdoïdes. Meyer. 245
— typus. Rüpp. 248
— undata. Gr. 217
— virens. Lath. Wils. 126
— viscivora. Savi. 171
— Wolfi. (Br.) 207
— xanthogaster. Rafin. 230

Sylvicola. Sw.
— atrogularis. Dub. 126
— *virens. Sw. (Lath.) 126

Symphemia. Rafin.
— atlantica. Rafin. 429
— semipalmata. Hartl. 429
— speculifera. Gundl. 429

Syrnia. Macgil.
— psilodactyla. Macgil. 55

Syrnium. Savig.
— aedium. Br. 58
— aluco. Br. 58
— cinereum. Gr. 60
— funereum. (L.) 57
Syrnium lapponicum. Savig. 60
— macrocephalon. Br. (1831) 59
— macrocephalum. Br. (1855) 58
— microphthalmum. Gr. 60
— nebulosum. Boie. 61
— nisorium. Kaup. 52
— nycteum. Kaup. 53
— rufescens. Br. 58
— stridulum. Br. 58
— ululans. Savig. 58
— uralense. Boie. 59
— Tengmalmi. (Gm.) 57

Syrrhaptes. Ill.
— heteroclitus. Vieill. 345
— Pallasi. Temm. 345
— *paradoxus. Ill. 345

Tachybaptes. Rchb.
— minor. Rchb. 602

Tachydromus. Ill.
— europaeus. Vieill. 378
— gallicus. (Gm.) 378

Tachypetes. Vieill.
— *aquilus. Vieill. 589

Tadorna. Boie. Flem.
— aegyptiaca. Boie. 488
— Belloni. Ray. 490
— casarca. Macgil. 491
— familiaris. Boie. 490
— gibbera. Br. 490
— littoralis. Br. 490
— maritima. Br. 490
— rutila. Boie. 491
— tadorna. Flem. 490
— vulpanser. Flem. 490

Talmaëtos. Blyth.
— Bonellii. Blyth. 30

Tanagra. Güld.
— melanictera. Güld. 298
— sibirica. Sparr. 276

Tantalides. Wagl.
— falcinellus. Wagl. 444

Tantalus. L.
— aethiopicus. Lath. 443
— falcinellus. L. 444
— *ibis. L. 461
— igneus. L. 441

Tantalus niger. Gm. 444
— rhodinopterus. Wagl. 461
— viridis. Gm. 444
Taxostoma. = Toxostoma. Cab.
Telephonus. Sw.
— cucullatus. Gr. 139
— erytropterus. Sw. 139
— longirostris. Heugl. 139
— sennegalus. Gr. (?) 139
— tschagra. Bp. 139
Telmatias. Boie.
— brachyptera. Br. 430
— brachypus. Br. 431
— Brehmi. Boie. 431
— faeroensis. Br. 431
— *gallinago. Boie. 431
— *gallinula. Boie. 433
— lacustris. Br. 431
— *major. Boie. 430
— nisoria. Br. 430
— peregrina. Br. 431
— Petenyi. Br, 431
— robusta. Br. 430
— *Sabinei. Leach. 432
— septentrionalis. Br. 431
— uliginosa. Br. 430
Terekia. Bp.
— cinerna. Bp. 436
— guttifera. Bp. 436
— javanica. Bp. 436
Tetrao. L.
— albus. L. 350
— alchata. L. 347
— alpinus. Nils. 348
— andalusicus. Gm. 368
— arenarius. Pall. 346
— betulinus. Scop. 356
— *bonasia. L. 356
— brachydactylus. Temm. Br. 350
— cachinans. Retz. 350
— canus. Gm. 355
— canus. Sparr. 356
— caspicus. Gm. 357
— caucasicus. Pall. 357
— caudacuta. Gm. 347
— chata. Pall. 347
— coturnix. L. 367
— crassirostris. Br. 352
Tetrao damascus. Gm. 361
— ericeus. Br. 353
— fasciatus. Desf. 346
— francolinus. L. 360
— furcatus. Dub. 353
— gibraltariensis. Gm. 368
— himalayensis. Gr. 357
— hybridus. L. 354
— hybridus urogalloïdes. Nils. 354
— intermedius. Langsd. 354
— islandicus. Br. 349
— islandorum. Faber. 349
— juniperorum. Br. 353
— lagopides. Naum. 355
— *lagopoïdes. Nils. 355
— lagopus. L. (F. Suec.) 350
— lagopus., islandicus. Schl. 349
— lagopus, var. alpina. L. 348
— lagopus, var minor. L. 348
— lapponicus. Gm. 350
— maculatus. Br. 352
— major. Br. 352
— *medius. Meyer. 354
— montanus. Br. 348
— montanus. L. 361
— mutus. Mart. 348
— nemerianus. Scop. 356
— Nigelli. Hardw. 357
— orientalis. Hasselq. 346
— paradoxus. Pall. 345
— perdix. L. 361
— peregrinus. Br. 353
— petrosus. Gm. 362
— phasianus. L. 359
— Reinhartdi. Br. 350
— rufa. Pall. 363
— rufus. Gm. 366
— rupestris. Jennyns. 348
— saliceti. Temm. 350
— saliceti scoticus. Schl. 351
— scoticus. Lath. 351
— spurius. Br. 354
— subalpinus. Nils. 350
— subtridactylus. Hasselq. 346
— *tetrix. L. 353
— tetrix var. Sparr. 355
— tetrix. var. γ. Gm. 354
— *urogallus. L. 352
Tetraogallus. Gr.

Tetraogallus caspius. Bp. 357
— *caucasicus. Gr. 357
— Nigelli. Gr. 357
Tetrastes. K. u. Bl.
— bonasia. K. u. Bl. 356
Tetrax. Leach.
— campestris. Leach. 375
Thalasseus. Boie.
— acuflavidus. Blas. 531
— affinis. Bp. 532
— anglicus. Boie. 533
— Bergii. Blas. 534
— candicans. Br. 531
— canescens. Br. 531
— cantiacus. Boie. 531
— caspius. Boie. 530
— Dugalli. Kaup. 535
— Duglasi. (Temm.) 535
— medius. Blas. 532
— paradiseus. Bp. 535
— polycercus. (Gould.) 534
— Pauli de Würtemberg. Br. 534
— Torresii. (Gould.) 532
— velox. Bp. 534
Thalassidroma. Vig.
— albifasciata. Br. 576
— Bullocki. Flem. 578
— *Bulweri. Gr. Gould. 577
— faeroensis. Br. 576
— Leachi. Vig, 578
— *leucorhoa. Degl. 578
— lugubris. Bp. 576
— melitensis. Rchb. 576
— melitensis. Schemb. 578
— minor. Br. 576
— *oceanica. Schinz. 579
— *pelagica. Vig. 576
— tenuirostris. Br. 576
— Wilsoni. Bp. 579
Thamnodus. Kaup.
— provincialis. Kaup. 217
Thamnophilus. Vieill.
— cucullatus. (Temm.) 139
— erythropterus. (Shaw.) 139
— tschagra. Vieill. 139
Tharrhaleus. Kaup.
— alpinus. (Kaup.) 203
Tharrhaleus modularis. Kaup. 204
— montanellus. Cab. 205
Thinotreton. Glog.
— desertorum. Glog. 269
Thoracocincla. Rchb.
— torquata. Rchb. 167
Thresciornis. Gould.
— aethiopica. Gr. 443
— alba. Br. 443
— minor. Br. 443
— religiosa. Cass. 443
Tichodroma. Ill.
— alpina. Koch. 105
— brachyrhynchos. Br. 105
— europaea. Steph. 105
— macrorhynchos. Br. 105
— media. Br. 105
— *muraria. Ill. 105
— phoenicoptera. Temm. 105
Tichornis. Kaup.
— cenchris. Kaup. 17
Tinnunculus. Vieill.
— alaudarius. Gr. 18
— cenchris. Gr. Bp. 17
— concolor. Rüpp. 16
— rufipes. (Besecke). 20
— tinnunculus. (L.) 18
— vespertinus. Gr. 20
Tolmaëtos. Blyth.
— Bonellii. Blyth. 30
Torquilla. Briss.
— striata. Briss. 91
Totanus. Bechst.
— aegocephalus. Bechst. (S. Kl.) 438
— affinis. Horsf. 427
— ater. Br. 425
— Bartrami. (Temm.) 418
— Bartramius. Temm. 418
— brevipes. Licht. 436
— *calidris. Bechst. 424
— campestris. Vieill. 418
— canescens. Adams. 422
— canutus. Br. (Cab. Journ.) (?) 410
— chloropus. M. u. W. 422
— cinereus. Briss. 417
— cinereus. Schl. 436
— crassirostris. Vieill. 429

Totanus ferrugineus. Meyer. 437
— fistulans. Bechst. 422
— *flavipes. Vieill. 426
— fuscocapillus. Vieill. 426
— *fuscus. Leisl. 425
— gambetta. Dub. 424
— *glareola. Temm. 427
— glareoloïdes. Hodgs. 427
— *glottis. Bechst. 422
— glottoïdes. Gould. 422
— graecus. Br. 424
— grallatorius. Steph. 427
— gregarius. Bechst. (J. Kl) 437
— griseus. Bechst. 422
— guinetta. Leach. 421
— Horsfieldi. Syk. 422
— hypoleucos. Temm. 421
— islandicus. Br. (Cab. Journ.) (?) 411
— javanicus. Horsf. 436
— Kuhli. Br. 427
— Lathami. Gr. 423
— leucophaeus. Bechst. (J. Kl.) 437
— leucophaeus. Lath. 422
— leucurus. Br. 428
— leucurus. Gr. 427
— limosa. Bechst. (W. Kl.) 438
— littoralis. Br. 424
— longicaudus. Orb. 418
— longipes. Meissn. 425
— macularius. Temm. 420
— maculatus. Bechst. (J. Kl.) 425
— maritimus. Steph. 409
— meridionalis. Br. 424
— naevius. Briss. 424
— natans. Bechst. (W. Kl.) 425
— natator. Vieill. 426
— obscurus. Dub. 425
— *ochropus. Temm. 428
— palustris. Br. 427
— pugnax. Nils. 417
— punctulatus. Dub. 428
— Rayi. Leach. (?) 425
— rivalis. Br. 428
— rufus. Bechst. (J. K.) 438
— semipalmatus. Temm. 429
— speculiferus. Cuv. (Var.) 429
— stagnatilis. Bechst. (J. Kl.) 423
— *stagnatilis. Temm. 423
— striatus. Briss. 424
Totanus sylvestris. Dub. Br. 427
— tenuirostris. Horsf. 423
— variegatus. Vieill. 418
Toxostoma. Cab.
— *rufum. Cab. 163
Trachelia. Scop. = Glareola. Briss.
Trachelonetta. Kaup.
— acuta. Kaup. 494
Trichopicus. Bp.
— Audubon. Bp. 89
— villosus. Bp. 89
Tridactylia. Steph.
— hirsuta. Steph. 90
Tringa. L.
— alpina. Gm. L. (S. Kl.) 407
— *alpina. L. 407
— alpina, var. americana. Cass. 408
— arenaria. L. (W. Kl.) 404
— arquata. Pall. 409
— atra. Gm. L. (S. Kl.) 425
— australis. Gm. L. 410
— autumnalis. Hasselq. 444
— Bartramia. Wils. 418
— Bonapartei. Schl. 413
— brevirostris. Licht. 419
— brevirostris. Spix. 416
— Cabanisi. Licht. 416
— calidris. L. (S. Kl.) (?) 410
— campestris. Licht. 412
— canadensis. Vieill. 409
— *canutus. L. 410
— canutus. Mont. 409
— canutus. Retz. 421
— cinclus. Bodd. 421
— cinclus. Pall. 414
— cinclus minor. Schl. 408
— cinclus, var. L. 407
— cinerea. Briss. 417
— cinerea. Gm. 410
— Cooperi. Baird. 412
— dominicensis. Degl. 412
— dorsalis. Licht. 413
— eloriodes. Vieill. 406
— equestris. Lath. 417
— falcinella. Pall. 411
— fasciata. Gm. 385
— ferruginea. Brünn. 410
— ferruginea. Koch. 411

Tringa frenata. Licht. 406
— fulicaria. L. (S. Kl.) 401
— fulicaria. L. Penn. (S. Kl.) 400
— fusca. Gm. (J. Kl.) 400
— fusca. L. 425
— gambetta. Gm. 424
— glacialis. Gm. (J. Kl.) 401
— glareola. L. 427
— glareola. Pall. 410
— gracilis. Br. 415
— gregaria. (Pall.) 385
— grenvicensis. Lath. (J. Kl.) 417
— grisea. L. 410
— guinetta. Pall. 423
— helvetica. L. 387
— hiaticula. Wils. 396
— hyperborea. Gm. (S. Kl.) 400
— hyperborea. Retz. 400
— hyperborea var. b. Gm. (S. Kl.) 401
— hypoleucos. L. 421
— interpres. L. 398
— islandica. Gm. 410
— islandica. Retz. 411
— keptuschka. Lepech. 385
— lamotina. Licht. 410
— leucoptera. Pall. 421
— littoralis. Br. 409
— littorea. Gm. (teste Degl.) 417
— littorea. L. 427
— littorea var. Brünn. 428
— lobata. Gm. (W. Kl. ?) 401
— lobata. Lepech. (J. Kl.) 401
— lobata. Brünn. (J. Kl.) 400
— longicauda. Bechst. 418
— longipes Meisn 425
— macularia. L. 420
— maculata. Edw. 420
— maculata. Vieill. 412
— maritima. Brünn. (W. Kl.) 409
— maritima. Temm. 409
— *melanotus. Vieill. 413
— *minuta. Leisl. 414
— minutilla. Vieill. 414
— morinella. L. (J. Kl.) 398
— morodunka. Messerschm. 436
— naevia. Gm. 410
— nigricans. Br. 409
— nigricans. Mont. (W. Kl.) 409
— ochropus. L. 428
Tringa parvirostris. Peale. (J. Kl.) 419
— *pectoralis. Say. 412
— pileata. Falk. 385
— platyrhyncha. Temm. 406
— pugnax. L. 417
— pusilla. Bechst. (J. Kl.) 415
— pusilla. L. 416
— pusilla. M. u. W. (J. Kl.) 414
— pygmaea. Leach. 411
— pygmaea. Savi. 406
— pygmaea. Schinz. 408
— pygmaea. Seiffert. 415
— pygmaea. Br. 415
— rufa. Wils. 410
— rufescens. Bechst. 417
— rufescens. Vieill. 419
— ruficollis. Gm. 407
— Schinzi. Bp. 413
— *Schinzi. Br. 408
— Schinzi. Gould. 413
— *semipalmata. Wils. 416
— squatarola. L. 387
— squatarola, varia. L. 387
— striata. Gm. 424
— striata. Retz. (J. Kl.) 409
— *subarquata. Temm. 411
— subruficollis. Vieill. 419
— Temmincki. Koch. (J. Kl.) 414
— *Temmincki. Leisl. 415
— torquata. Degl. 408
— totanus. Meyer. 425
— tridactyla. Pall. 404
— undata. Brünn. 409
— vanellus. L. 384
— varia. L. 387
— variabilis. M. u. W. 407
— variegata. Brünn. (part. ♂ W. Kl.) 417
— variegata. Brünn. (part.) 424

Tringoïdes. Bp. Gr.
— Bartramius. Gr. 418
— hypoleucos. Bp. 421
— macularius. Gr. 420
— rufescens. Gr. 419

Trochilus. Möhr. = Recurvirostra. L.

Troglodytes. Vieill.
— bifasciatus. Br. 249
— borealis. Fischer. (Var.) 249

Troglodytes domesticus. Br. 249
— europaeus. Vieill. 249
— fumigatus. Temm. 249
— Naumanni. Br. (T. borealis.) 249
— *parvulus. Koch. 249
— punctatus Boie. Br. 249
— regulus. Meyer. 249
— sylvestris. Br. 249
— troglodytes. Schl. 249
— vulgaris. Temm. 249

Tropicophilus. Rchb.
— aethereus. Rchb. 586

Trygon. Br.
— gregaria. Br. 344
— migratoria. Br. 344

Tryngites. Cab.
— rufescens. Cab. 419

Trypanocorax. Kaup.
— frugilegus. Kaup. 149

Tschagra. Less.
— senegalensis. Less. 139

Turdus. Briss.
— aonalaschkae. Gm.(testeNaum.) 179
— aquaticus. Briss. 420
— arboreus. Br. 171
— arundinaceus. L. 245
— arundinaceus, var. β. Gm. 241
— atrigularis. Temm. 173
— atrocyaneus. E. v. Hom. 168
— aureus. Hollandr. 169
— aurigaster. Vieill. 162
— auroreus. Pall. (?) 173
— auroreus. Glog. (J. Kl.) 168
— azureus. Cresp. 185
— Bechsteini. Naum. (?) 173
— betularum. Br. 177
— brunneus. Gr. 180
— calliope. Lath. 206
— canadensis. Briss. 182
— capensis. Licht. 161 B.
— capensis var. Lath. 161 B.
— capensis var. β. Gm. 161 B.
— carolinensis. Briss. 163
— carolinensis. Licht. 165
— certhiolus. Temm. 239
— chrysogaster. Lath 162
— cinclus. Lath. 250
Turdus cristatus. Wirsing. 131
— cyanus. L. 185
— daulias. Temm. 184
— dubius. Bechst. Bp. Schl. 173
— erythrurus. Hodgs. 174
— eunomus. Temm. 176
— felivox. Vieill. 165
— *fuscatus. Pall. 176
— fuscescens. Shaw. 181
— fuscescens. Steph. (?) 180
— fuscilateralis. Br. 172
— galbula. Briss. (teste Heugl.) 156
— gracilis. Br. 177
— guttatus. Tschudi. 179
— haemorrous. Horsf. 162
— *iliacus. L. 177
— iliacus, carolinensis. Briss. 180
— iliacus, var. pallidus. Naum. 184
— illas. Gesn. 177
— illuminus. Naum. 177
— infaustus. Lath. (♀ u. J. Kl.) 186
— junco. Pall. 245
— juniperorum. Br. 172
— kamtschatkensis. Gm. 206
— leucocillus. Pall. 168
— leucurus. Gm. 195
— Levaillanti. Temm. 161 B.
lividus. Wils. 165
— *lunulatus. Lath. 170
— macrorhamphus. Gould. 170
— major. Br. 171
— manillensis. Lath.(teste Naum. J. Kl.) 185
— meridionalis. Br. 171
— *merula. L. 166
— *migratorius. L. 182
— minor. Br. 178
— minor. Bp. 180
— minor. Briss. 178
— minor. Baldacc. 203
— *minor. Gm. 180
— minor. Lath. 180
— minor. E. v. Hom. 179
— minor. Sw. 181
— minutus. Natt. 241
— *musicus. L. 178
— musicus. Pall. 172
— *mustelinus. Wils. 181
— mutabilis. Temm. 168

Turdus nanus. Audub. 179
— Naumanni. Schl. 176
— *Naumanni. Temm. 175
— Naumanni. Werner. 184
— nigricans. Vieill. 161 B.
— obscurus. Gm. Lath. (J. Kl. teste E. v. Hom.) 176
— obscurus. Temm. 161 A.
— obsoletus. Br. 184
— olivaceus. Brew. 180
— *olivaceus. L. 183
— oriolus. Briss. 156
— Pallasi. Cab. 179
— pallens. Pall. 184
— *pallidus. Gm. 184
— parvus. Jard. 180
— peregrinus. Br. 182
— philomelos. Br. 178
— *pilaris. L. 172
— pilaris. Pall. 178
— pinetorum. Br. 177
— polyglottus. L. 164
— roseus. L. 157
— rubiginosus. M. u. W. 241
— ruficollis. Glog. 175
— *ruficollis. Pall. 174
— ruficollis. var. β. Pall. 175
— rufus. L. 163
— saxatilis. L. 186
— Seiffertitzi. Br. 184
— seleucis. Gm. 157
— *sibiricus. Pall. 168
— solitarius. Lath. 185
— *solitarius. Wils. 179
— squamatus. Boie. 169
— subpilaris. Br. 172
— suratensis. Gm. 157
— Swainsoni. Cab. 180
— *torquatus. L. 167
— varius. Horsf. 170
— *varius. Pall. 169
— viscivorus. L. 171
— Werneri. Géné. 184
— Wheitei. Eyt. 169
— Wilsoni. Bp. 181
— Wilsoni. Sw. 180

Turnix. Bonn.
— africanus. Desf. 368
— albigularis. Malh. 368
*Turnix andalusicus. Roux. 368
— gibraltariensis. Bonn. 368
— lunatus. (Temm.) 368
— sylvaticus. Desf. 368
— tachydromus. (Temm.) 368

Turtur. Ray.
— aegyptiacus. Bp. 342
— albus. Gr. 343
— auritus. Ray. 340
— cambayensis. Rchb. 340
— canadensis. Briss. 344
— glauconotus. Br. 340
— hybridus. Briss. 343
— meena. Blyth. 341
— migratorius. Selby. 340
— orientalis. Gr. 341
— pygmaeus. Rchb. 342
— ridens. Br. 343
— risoria. Br. 343
— rufescens. Br. 342
— rufidorsalis. Br. 340
— rupicola. Bp. 341
— senegalensis. Gr. 342
— Sonnini. Buff. 343
— sylvestris. Rchb. 340
— vulgaris. Eyt. 340

Ulula. Cuv.
— acadica. (Temm.) 54
— aluco. K. u. Bl. 58
— barbata. K. u. Bl. 60
— cinerea. Bp. 60
— funerea. Schl. 57
— lapponica. Less. 60
— littura. Cuv. 59
— nebulosa. Cuv. 61
— nisoria. (Meyer.) 52
— Tengmalmi. Audub. 57
— uralensis. K. u. Bl. 59

Undina. K. u. Bl.
— mersa. K. u. Bl. 489

Upupa. L.
— bifasciata. Br. 103
— brachyrhynchos. Br. 103
— *epops. L. 103
— exilis Br. 103
— indica. Hodgs. 103
— macrorhyncha. Br. 103

Upupa maculigera. Rchb. 103
— major. A. Br. 103
— senegalensis. Sw. (?) 103
— vulgaris. Pall. 103

Uragus. K. u. Bl.
— sibiricus. K. u. Bl. 321

Uria. Briss.
— alga. Brünn. (J. Kl.) 610
— alle. Temm. 606
— arctica. Br. 607
— *arra. K. u. Bl. 611
— baltica. Brünn. (Ueb. Kl.) 607
— Brünnichi. Sab. 611
— columba. Cass. 608
— faeroensis. Br. 607
— Francsi. Leach. 611
— glacialis. Br. 608
— groenlandica. Gr. 607
— grylle. Lath. 607
— grylloïdes. Brünn. (Ueb. Kl.) 607
— *hringvia. Brünn. 610
— lacrymans. Valenc. 610
— lacteola. Lath. 607
— leucophthalma. Faber. 610
— leucopsis. Br. 610
— leucotis. Dub. 611
— lomvia. Brünn. 609
— Mandti. Leach. 608
— Meissneri. Br. 607
— minor. Briss. 606
— minor, nigra. Briss. 607
— minor, striata. Briss. (W. Kl.) 607
— norwegica. Br. 609
— pica. Faber. 611
— polaris. Br. 611
— rhingvia. Brünn. 610
— scapularis. Steph. 607
— squarbag. Brünn. (W. u. J. Kl.) 611
— troile. Brünn. 611
— *troile. Lath. 609
— troile. Thien. 611
— troile leucophthalmos. Schl. 610
— unicolor. Faber. 608

Urogallus. Briss.
— hybridus. Briss. 354
— maculatus. Br. 352
— major. Briss. 352
— minor. Briss. 353
Urogallus minor punctatus. Briss. 354

Utamania. Leach.
— baltica. Br. 612
— glacialis. Br. 612
— islandica. Br. 612
— microrhyhchos. Br. 612
— pica. Leach. 612
— torda. Leach. 612

Vanellus. L.
— bicornis. Br. 384
— *cristatus. M. u. W. 384
— flavipes. Savi. 386
— gavia. Leach. 384
— grallarius. Less. 386
— *gregarius. Vieill. 385
— griseus. Briss. 387
— helveticus. Vieill. 387
— Keptuschka. Temm. 385
— *leucurus. Glog. 386
— macrocercus. Heugl. 385
— melanogaster. Bechst. 387
— melanosomus. Sw. 383
— pallidus. Heugl. 385
— persicus. (Bonnat.) 383
— spinosus. (L.) 383
— squatarola. Bechst. 387
— varius. Briss. 387
— Villotai. Audouin. 386
— vulgaris. Bechst. 384

Viralva. Steph.
— leucoptera. Steph. 540
— nigra. Steph. 541

Vittiflora. Briss.
— albicollis. Vieill. 190
— assimilis. Br. 190
— aurita. Bp. Br. 190
— cinerea. Briss. 188
— grisea. Briss. Br. 188
— leucomela. Bp. 192
— leucomelaina. Br. 192
— leucopygia. Br. 195
— leucura. Bp. 195
— leucuros. Br. 195
— major. Br. 188
— maritima. Br. 188
— melanoleuca. Br. 192
— mirabilis. Br. 191

Vitiflora monacha. Br. (?) 191
— nigerrima. Br. 195
— oenanthe. Boie. 188
— paradoxa. Br. 191
— rufa. Briss. Br. 191
— rufescens. Briss. 190
— rufescens. Vieill. 191
— saltans. Br. 189
— saltatrix. Br. 189
— septentrionalis. Br. 188
— squalida. Br. 192
— stapazina. Br. 192

Vulpanser. K. u. Bl.
— rutila. K. u. Bl. 491
— tadorna. K. u. Bl. 490

Vultur. L.
— aegyptius. Briss. 5
— aegyptius. Temm. (J. Kl.) 3
— albicans. Meisn. 5
— albicilla. L. 32
— albicollis. A. Br. 1
— albus. Daud. 5
— alpinus. Br. 7
— alpinus. Briss. 1
— arabicus. Briss. 4
— arrianus. Lapeyr. 4
— aureus. Gesn. 7
— auricularis. Daud. 3
— baeticus. Aldrov. 7
— barbarus. Lath. 7
— barbatus. L. 7
— bengalensis. Gm. 4
— carunculatus. A. Smith. 6
— cinereus. Gm. 4
— fulvus. Bodd. 5
— fulvus. Briss. 1
— fulvus. Daud. 1
— fulvus. Rüpp. 2
— fulvus, Kolbei. Schl. 1
— fulvus occidentalis. Schl. 1
— fulvus orientalis. Schl. 1
— fulvus Rueppelli. Schl. 2
— fuscus. Gm. (J. Kl.) 5
— ginginianus. Daud. 5
— imperialis. Temm. 3
— Kolbei. Temm. (J. Kl.) 1
— Kolbei. Lath. 1
— Kolbei. Crezschm. 2

Vultur leporarius. Gesn. 4
— leucocephalos. Gm. 1
— leucocephalos. Briss. 5
— leucocephalos. Br. 5
— leucocephalos. M. u. W. 1
— magnificus. (v. Müller.) 2
— magnus. Gm. 7
— marmoratus. Br. (Cab. Journ.) 2
— meleagris. Pall. 5
— *monachus. L. 4
— niger. Briss. 4
— niger. Gm. 7
— niger. Licht. (?) 3
— nubicus. A. Smith. 3
— occidentalis. (Schl.) 1
— orientalis. (Schl.) 1
— percnopterus. Daud. 1
— percnopterus. L. 5
— persicus. Pall. 1
— pileatus. Burch. 6
— Rueppeli. Natt. 2
— stercorarius. Lapeyr. 5
— trincalos. Bechst. 1

Xanthornus. Pall.
— caucasicus. Pall. 298
— phoeniceus. Bp. 160

Xema. Leach.
— atricilla. Boie. 547
— Bonapartei. Bp. 550
— capistratum. Bp. 549
— collaris. Leach. 545
— gelastes. Leach. 555
— ichtyaëtos. Leach. 553
— Lambruschini. Bp. 555
— leucophthalmum. Leach. 546
— melanocephala. Boie. 551
— minutum. Boie. 552
— pileatum. Br. (?) 549
— ridibundum. Boie. 548
— Sabinei. Leach. 545

Xenus. Kaup.
— *cinereus. Kaup. 436

Xylopicus. Cab.
— minor. Cab. 88

Xylocota. Bp.
— Sabinei. Bp. 432

Xylota. Bp.
— Sabinei. Bp. 432
Ynx = Iÿnx. (Glog.)
Yunx. L. = Iÿnx. (Glog.)
Yunz. Sw. = Iÿnx. (Glog.)
Zapornia. Leach.
Zapornia minuta. Leach. 465
— pygmaea. Bp. 466
Zosterops. Vig. Horsf.
— frontalis. Rchb. 228
— javanica. Sw. 228
— montana. Salom. Müll. 228
— monticola. Temm. 228

Die im systematischen Verzeichnisse als Ueberschriften gebrauchten Namen sind hier mit einem * bezeichnet.

Verzeichniss

der

vorkommenden literarischen Abkürzungen.

Acerb. Bibl. Ital. — Biblioteca Italiania ossia Giornale di Letteratur,a Scienze et Arti. Milano 1816—1839.

Aldrov. Orn. — Aldrovandi, Ul. Ornithologiae hoc est de Avibus historiae libri XII. etc. Bononiae. 1846.

Ann Scienc. phys. — Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie. Lyon 1838 et suite.

Ann. Soc. Nat. — Annales des Sciences Naturelles etc. Paris, 1824 et suite.

Audub. B. Am. — J. J. Audubon, The Birds of America, from drawings made in the United States etc. New-York, 1844.

Audub. Orn. Biogr. — Audubon. J. J. Ornithological Biography: oran account of the habits of the Birds of the United States of Amerika. Edinburg 1834—40.

Bäd. — Bädeker, Die Eier der Europäischen Vögel. Leipzig und Iserlohn 1855.

Baird. u. Cass. — Baird, Cassin u. Lawrence. The birds of North-America, north of Mexico. Washington 1858.

Bechst. Orn. Tasch. — J. M. Bechstein, Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland. Leipzig, 1802—1812.

Bp. Cat. Parzud. — Ch. L. Bonaparte, Catalogue Parzudaki. Paris, 1856.

Bp. Consp. — Ch. L. Bonaparte, Conspectus generum avium Lugd. Bat., 1850—1856.

Bp. Faun. Ital. — Ch. L. Bonaparte, Inconografia della Fauna italica, per le quarto classi degli animali vertebrati. Roma, 1832—1842.

Bp. List. B. — Ch. L. Bonaparte, A geographical and comparative List of the Birds of Europe etc. London, 1838.

Bp. Rev. crit. — Bonaparte, Ch. L., Revue critique de l'ornithologie de Degland. (Compt. rend.)

Br. Beitr. — Ch. L. Brehm, Beiträge zur Vögelkunde. Neustadt 1820—1822.

Br. Lehrb. — Ch. L. Brehm, Lehrbuch der Naturgeschichte aller Vögel Europas. Jena, 1823.

Br. Nat. V. D. — Ch. L. Brehm, Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands. Ilmenau, 1831.

Br. Thierl. — A. E. Brehm, Illustrirtes Thierleben. Hildburghausen, 1864—1869.

Briss. Orn. — M. J. Brisson, Ornithologie, ou Méthode contenant la division des Oiseaux en ordres etc. Paris, 1760.

Brünn. Orn. bor. — M. T. Brünnich, Ornithologia borealis, sistens collectionem Avium etc. Hafniae, 1764.

Buff. pl. enl. — Buffon Planches enluminées d'Histoire naturelle, par. Martinet, exécutées pard'Aubenton le jeune. Paris, 1765.

Bull. Soc. Imp Mosc. — Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Moscou, 1829 et suite.

Burm. Th. Bras. — Burmeister, C. H. Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens. Band II. u. III. Berlin 1855—56.

Cab. Journ. — J. Cabanis, Journal für Ornithologie. Cassel 1853—1869. Leipzig 1870 und folgende.

Cara. Orn. Sard. — Cara, G. Elenco degli Uccelli che trovansi nell'isola Sardegna o d'ornitologia sarda. Torino 1842.

Compt. rend. — Comptes rendus des séances de l'Academie des Sciences. Paris 1835 et suite.

Cuv. Règne an. — G. Cuvier, Règne animal distribué d'après son organisation etc. 1re édit. Paris 1817. — 2de édit. Paris 1820.

Daud. Orn. — F. M. Daudin, Traité élémentaire et complet d'Ornithologie etc. Paris 1800.

De Filippi Arch. p. Zool. — Archivo per la Zoologia Modena. 1863.

Degl. u. G. — C. D. Degland und Z. Gerbe, Ornithologie européenne. Paris, 1867.

Dub. pl. col. — Dubois, Ch. F., Planches coloriées des Oiseaux de la Belgique et de leurs oefs. Bruxelles et Lipsic 1851—57.

Eversm. Add. Pall. — E. Eversmann, Addenda ad celeberrimi Pallasii Zoographiam Rosso-Assiaticam. Casani, 1835.

Eversm. Reise. — E. Eversmann, Reise von Orenburg nach Buchara etc. Berlin, 1822.

Eyt. Anat. — T. C. Eyton, Monograph of Anutidae or Duck tribe, including the Geese and Swans. London, 1838.

Eyt. Rarer. B. — F. C. Eyton, History of the rarer British Birds etc. London, 1836.

Faber. Prodr. Isl. Orn. — F. Faber, Prodromus der Isländischen Ornithologie. Kopenhagen, 1822.

Fabric. Faun. Groenl. — O. Fabricius, Fauna Groenlandica, systematice sistens animalia Groenlandiae etc. Hafniae et Lipziae, 1780

Flem. Phil. Zool. — Flemming, John. Philosophy of Zoology, or a general view of the structure, functions and classification of animals. Edinburgh, 1822.

Forsk. Desc. — Forskål, Pet., Descriptiones animalium, Avium, Amphibiorum etc., quc in itinere orientali abservavit. Hafniae 1775.

Fritsch. V. Eur. — Frisch, Ant. Naturgeschichte der Vögel Europas. Prag. 1854. f.

Georgi Reise. — Georgi, Joh. Gottl. Bemerkungen auf einer Reise im russischen Reiche. Petersburg 1775.

Gm. L. S. — J. E. Gmelin, Caroli a Linne Systema naturae, per regna tria naturae secundum classes etc. Lipsiae 1788—1793.

Gm. Reise. — S. G. Gmelin, Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Natur-Reiche etc. St. Petersburg, 1774—1784.

Gould. — Gould (John), The birds of Europe. London 1832—1837.

Gray. Gen. B. — J. E. Gray, The genera of Birds; comprising their generic charact. etc. London, 1844—1846.

Hartl. u. Finsch. — Dr. O. Finsch und Dr. G. Hartlaub, Baron Carl Claus von der Decken's Reisen in Ost-Afrika etc. Bd. IV. Die Vögel Ost-Afrikas. Leipzig und Heidelberg 1870.

Hartl. W. Afr. — Hartlaub, System der Ornithologie West-Afrika's. Bremen 1857.

Hasselq. It. Palaest. — Hasselquist, Fredr., Iter Palaestinum eller resa tie heliga landet, förrättad ifran aar 1749 tie 1752. Holmiae 1757.

Hempr. u. Ehr. Symb. phys. — Hemprich, Emil, et Ehrenberg, Chr., Gfr., Symbolae physicae seu icones et descriptiones Mamalium, Avium etc. Berolini 1828.

Heugl. N. O. Afr. — Th. von Heuglin, Ornithologie Nord-Ost.Afrika's. Cassel, 1869—1871.

Jard. Contrib. — Jardine, Will. Contributions to Ornithology. Edinburgh 1848—54.

Jard. Illustr. Orn. — Jardine, W. and Selby, Pr. J. Illustrations of Ornithology etc. Edinburgh and London, 1825—1843.

Jard. u. Selby. — Jardine, Will. and Selby, Pr. J. Illustrations of Ornithology etc. Edinburgh and London 1825—43.

Ibis. — The Ibis, A Magazine of general Ornithology. London 1853. etc.

Illig. Prodr. — J. K. W. Illiger, Prodromus systematis Mammalium et Avium etc. Berolini 1811.

Isis. — Isis, Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte etc. Leipzig 1817 und folgende Jahre.

K. u. Bl. — A. Keyserling und J. H. Blasius. Die Wirbelthiere Europa's. Braunschweig 1840.

Kittl. Kupf. — Kittlitz, F. H. v., Kupfertafeln zur Naturgeschichte der Vögel. Frankfurt a/M. 1832—33.

Kittl. Reise. — Kittlitz, F. H. v., Denkwürdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika etc. Gotha, 1858.

Koch. Baier. Zool. — K. L. Koch. System der Baierischen Zoologie. Nürnberg, 1816.

Kuhl. Beitr. — H. Kuhl, Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. Frankfurt a/M. 1820.

L. Faun. Suec. — K. von Linné, Fauna Suecica, sistens animalia Sueciae regni etc. Stockholmiae 1761.

L. S. XII. — K. von Linne, Systema naturae, sive Regna tria naturae systematice proposita etc. XIIte Ausgabe, Halle und Magdeburg, 1766.

Lath. Ind. Orn. — J. Latham, Index oroithologicus, sive systema Ornithologiae etc. Londoni, 1790; et Suppl. Londoni, 1802.

Lefeb. Abyss. — Lefebvere, Th. Voyage en Abyssini. 1849.

Leisl. Ann. — J. P. A. Leisler, in: Annalen der Wetterauischee Gesell schaft für die gesammte Naturkunde. Frankfurt, 1809—1814.

Less. Tr. d'Orn. — Lesson, R. Pr. Traité d'ornithologie au description des Oiseaux réunis dans les principales collections de France. Paris 1831.

Le Vaill. Expl. — Le Vaillant, Exploration scientifique de l'Algérie. Paris 1844—1858.

Le Vaill. Ois. d'Afr. — Le Vaillant, Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique. Paris 1799.

Licht. Doubl. — H. Lichtenstein. Verzeichniss der Doubletten des Zoologischee Museums etc. zu Berlin. Berlin, 1824.

M. u. W. — B. Meyer und J. Wolf, Taschenbuch der Deutschen Vogelkunde. Frankfurt 1810. Band III. 1822.

Macgil. Brit. B. — W. Macgillivray, History of British Birds etc. London, 1839—1841.

Malh. Picid. — Al. Malherbe, Monographie des Picidés, ou Histoire naturelle général et particulière des Oiseaux etc. Paris, 1859.

Mem. Acad. Torinc. — Memoirie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Torino, 1816 und folgende.

Mem. de l'Inst. — Memoires de l'Institut national des siences physiques et mathématique. Paris, 1798 et suite.

Mem. Soc. Linn. — Mémoires de la Société Linnéenne de Paris. Paris, 1822—1827.

Ménétr. Catal. — E. Ménétries, Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase etc. St. Petersbourg, 1832.

Meyer. Vögl. Liv. — B. Meyer. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Esthlands. Nürnberg, 1815.

Midd. Sib. Reise. — Middendorff, A. T. v., Reise im äussersten Norden und Osten Sibiriens. St. Petersburg, 1853.

Mühle. Griech. — H. G. von der Mühle, Beiträge zur Ornithologie Griechenlands. Leipzig. 1844.

Mus. Carls. — Sparrmann, Andr., Museum Carlsonianum in quo novas et selectas Aves coloribus ad vivum bevique descriptione illustratas. Holmiae 1786—1789.

Mus. Hein. — J. Cabanis, Museum ornithologicum Heineanum. Halberstadt, 1850—1860.

Mus. Senck. — Museum Senckenbergianum. Frankfurt a/M. 1833—1842.

N. — Naumannia, Archiv für Ornithologie vorzugsweise Europa's. Stuttgart, 1851–1858.

N. V. D. — J. A. Naumann's Naturgeschichte der Vögel Deutschland's etc. Leipzig 1822—1844. Band XIII. Stuttgart, 1860.

Nov. Com. Petrop. — Novi commentarii Academiae imper. Scientiarum Petropolitanae. Petropoli, 1750, 1776, et seq.

Nouv. Dict. — Nouveau Dictionaire d'Histroire naturelle, appliqué aux arts etc. Paris, 1816—1819.

O. d. Murs. Icon. Orn. — O. des Murs, Iconographie ornithologique. Paris 1845–1849.

Pall. It. I—III. — Pall, P. S., Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—74. Petersburg 1771—76.

Pall. Spicil. Zool. — P. S. Pallas. Spezilegia zoologica. 14 Hefte mit 58 Tafeln. Berlin 1767.

Pall. Zoogr. I—II. — P. S. Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica etc. Petropoli 1811—1831.

Penn. Arct. Zool. — T. Pennant, The Arctic Zoology etc. London, 1766 et. 1768.

Penn. Brit. Zool. — Pennant, Th., Zoologia britannica etc. London 1768. Augsburg 1771.

Peterm. Geogr. Mitth. — Petermann, D. A., Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt. Gotha, 1855 und folgende.

Phil. (of) Zool. — J. Flemming, Philosophy of Zoology; or a general View of the Structure etc. Edinburgh, 1822.

Proceed. Ac. Nat. — Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1846 and cont.

Proceed. Lin. Soc. — Proceedings of the Linnean Society. 1843 and cont.

Proceed. Zool. Soc. — Proceedings of the Zoological Society. London. (1830) 1833 and cont.

Retz. Faun. Suec. — A. J. Retzius, Fauna Sueciae, a Carolo Linnaeo inchoata. Lipsiae 1800.

Rev. et Mag. Zool. — M. E. F. Guérin-Méneville, Revue et Magasin de Zoologie. Paris 1849 et suite.

Rhea. — Rhea, Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Leipzig, 1846—1849.

Richards. Faun. Am. — J. Richardson, Fauna Boreali-americana. London, 1831.

Roux. Orn. Prov. — J. S. P. Roux, Ornithologie provençale etc. Marseille, 1825—1839.

Rüpp. Atl. — Rüppell, Ed., Atlas zur Reise im nördlichen Afrika. II. Abth. Vögel, bearbeitet von Ph. J. Cretzschmar. Frankfurt a/M. 1826.

Rüpp. Mus. Senk. — Rüppell, Ed., Museum Senkenbergianam. Frankfurt a/M. 1833—42.

Rüpp. N. W. — W. P. E. Rüppell, Neue Wirbelthiere, zu der Fauna von Abyssinien gehörig etc. Frankfurt 1835—1840.

Rüpp. S. Ueb. — W. P. E. Rüppell, Systematische Uebersicht der Vögel Nord-Ost-Afrika's. Frankfurt a/M., 1845.

Salvad. Catal. — Thom. Salvadori, Catalogo degli Uccelli di Sardegna, con note etc. Milano, 1864.

Savi. Orn. Tosc. — P. Savi, Ornithologia Toscana. ossia descrizione et storia degli Uccelli etc. Pisa, 1827—1831.

Savig. Ois. de l'Eg. — M. J. L. de Savigny, Observations sur le système des Oiseaux de l'E'gypte etc. Paris, 1808—1810.

Schinz. — Schinz, Europäische Fauna oder Verzeichniss der Wirbelthiere Europa's. Stuttgart, 1840.

Schl. u. Bp. Lox. — Ch. L. Bonaparte et H. Schlegel, Monographie des Loxiens etc. Leiden et Dusseldorf, 1850.

Schl. Mus. — H. Schlegel, Muséum d'Histoire naturelle des Pays-Bas. Leyde, 1862—1865.

Schl. Rev. — H. Schlegel. Revue critique des Oiseaux d'Europe. Leyde, 1844.

Scop. Ann. — J. A. Scopoli, Annus I. historico-naturalis, descriptiones Avium etc. Turriani, 1769.

Selby. Brit. Orn. — J. Selby, Illustrations of British Ornithology. Edieburgh, 1833.

Sélys. Faun. Belge. — M. E. de Sélys-Longchamps, Faune Belge, Indication méthodique etc. Bruxelles, 1842.

Sharpe u. Dresser. — Sharpe, R. B. and Dresser, H. E., A Histrory of the Birds of Europe. London 1871 and cont.

Shaw. Zool. — Shaw, G., General Zoology or systematic natural history with plates from the first authorities etc. London 1826.

Smith. South. Afr. — Smith, A. Illustrations of the Zoology of South Africa, consisting chiefly of figures and descriptions etc. London, 1849.

Sparrm. Mus. Carlson. — Sparrman, Andr. Museum Carlsonianum in quo novas et selectas Aves coloribus ad vivum brevique descriptione illustratas. Holmiae 1786—89.

Susem. Vög. Eur. — J. C. und E. Susemihl, Die Vögel Europa's. Darmstadt, 1846—1852.

Sw. Anim. in menag. — Swainson, Will., Animals in menageries. London, 1838.

Sw. Nat. Hist. — Swainson, W., On the natural history and classification of Birds. London, 1836—37.

Temm. Man. — C. J. Temminck, Manuel d'ornithologie, ou Tableau systematique des Oiseaux, que se trouvent en Europe. Amsterdam, 1820—1840.

Temm. pl. col. — C. J. Temminck et Laugier, Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux. Paris, 1820—1839.

Thien. — F. A. L. Thienemann, Systematische Darstellung der Forpfianzung der Vögel Europas. Leipzig, 1825—1838.

Trans. Lin. Soc. — Transactions of the Linnean Society of London. London, 1791 and contin.

Trans. Philos. Inst. — Transactions Philosophical Institute of Victoria. 1859.

Verhandl. Zool. bot. Ges. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 1850 und folg.

Vieill. An. d'orn. — Vieillot, L. P., Analyse d'une nouvelle Ornithologie élémentaire. Paris, 1816.

Vieill. Encycl. — Bonnaterre, Tableau encyclopédique des trois règnes de la nature; Ornithologie, continuée par Vieillot. Paris, 1790—1823.

Vieill. Faun. Franc. — Faune française. Les Oiseaux par L. P. Vieillot. Paris, 1830.

Vieill. Gal. Ois. — L. P. Vieillot, La Galerie des Oiseaux. Paris, 1825—1834.

Vieill. Ois. Am. — L. P. Vieillot, Histoire naturelle des Oiseaux de l'Amérique septentrionale etc. Paris, 1807.

Voy. Abyss. — Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839—43 par une commission scientifique. Paris.

Wagl. Syst. — J. Wagler, Systema Avium. Stuttgart und Tübingen, 1827.

Wieg. Arch. — Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte. Berlin 1835.

Willugb. Orn. — F. Willugby, Ornithologiae bibri III., in quibus Aves etc. Londini, 1676.

Wils. Am. Orn. — A. Wilson, American Ornithology. Philadelphia, 1808—1814.

Wils. u. Bp. Nat. Hist. — Wilson, Alex., and Bonaparte's American Ornithology or the natural Histori of the Birds of the United States. Edinbourgh, 1831.

Yarrel. Brit. B. — Yarrell, W., A. history of british Birds. London 1856.

Zool. Gart. — Der Zoologische Garten. Frankfurt a/M., 1850—(1871).

Verzeichniss der Autoren.

Acerbi, G.
Adams, A. L.
Agassiz, L.
Aldrovandi, Ul.
Alléon, Am.
Altum, B.
Antinori, Or.
Audubon, J. J.

Bädecker, F. W. J.
Bailly, J. B.
Baird, Spencer, F.
Baldamus, E.
Baldenstein, Th. C. von
Banks, Jos.
Barrère, Petr.
Barthélemy, de Lapommeraye.
Bartlett, A. D.
Barton, B. S.
Bartram, John.
Bechstein, J. M.
Becker, L.
Bell, J. G.
Bélon, Pierre.
Beneken,
Besecke, J. M. G.
Bewick, Th.
Blanford, W. F.
Blasius, H.
Blyth, E.
Boddaert, Pet.
Boie, F.
Boissonneau, A.
Boitard, P.
Bonelli, Fr. Andr.
Bonnet, Ch. de.
Bonnaterre,
Borkhausen, M. B.
Boutcille, Hipp.
Bp. = Bonaparte, Ch. L.
Brandt, J. Fr.
Bree, Ch. L.
Brehm, Chr. L.
Brehm, Alfr.
Brehm, Oskar.
Breme, de.
Brewer, Th. M.
Brisson, M. J.
Bruch, C.
Brünnich, M. F.
Bryant, H.
Buffon, G. L. Leclerc. Comte de.
Burchell, W. J.
Burmeister, H. C.

Cabanis, J.
Cabot, Sam.
Calwer, C. G.
Cantary.
Cara, Gaef.
Cassin, John.
Catesby, M.
Cetti.
Charlton, Hdw.
Children,
Clusius,
Cook, James.
Coues, Elliot,
Crespon, J.
Cretzschmar,
Cuvier, G. L.
Daubenton, L. J. M.
Daudin, Fr. M.
Degland, C. D.
Delessert, A.
Desfontaines.
Donavan, Edw.
Drapiez.
Drummont, H. M.
Dubois, Ch. F.
Dumont d'Urville.
Duméril, A. M. C.
Durazzo, C.

Edmonston, A.
Edwards, E.
Ehrenberg, C. G.
Eimbeck.
Elliot, D. G.
Erhard, E.
Ermann, A. F.
Esmark, L.
Eversmann, Ed.
Eyton, T. C.

Faber, Fr.
Fabricius, O.
Fairmaire, Edm.
Falk, V.
Filippi, F. de
Finsch, O.
Fischer, G. von Waldheim.
Fleischer,
Flemming, J.
Forskål, Pet.
Forster, J. R.
Franklin, B.
Fraser, L.

Frauenfeld, G. von
Frisch, J. L.

Gaillard, Olph.
Gambel, W.
Garnot.
Gebler, F.
Géné, G.
Geoffroy, St. Hilaire.
Georgi. Joh. G.
Gerbe, Z.
Gesner, C.
Giraud, Ch.
Gloger, Const. W.
Gmelin, Joh. Gr.
Gmelin, J. G.
Goebel, H.
Golowatsch.
Gosse, P. H.
Gould, J.
Grabra.
Gray, G. R.
Griffith, Edw.
Güldenstädt, Ant.
Guérin, Méneville.
Gundlach, J.
Gunnerus, J. E.
Gurney, J. H.

Hahn, C. W.
Hardwig, J. Edm.
Hardy, J.
Hartlaub, G.
Haworth.
Hasselquist, Fr.
Heckel.
Heine, F.
Heinecken, C.
Hemprich, Emil.
Hermann, A. L.
l'Herminier, F. J.
Heuglin, Th. von.
Hodgson, B. H.
Holböll, C.
Hollandre. Jos. Jacq.
A. v. Homeyer.
E. v. Homeyer.
Horaschuch, Chr. F.
Horsfield, Th.
Hutton, T.

Illiger, J. C. W.
Jacquinot.
Jamson, W.
Jardine, T. W.
Jaubert, J. B.
Jerdon, T. C.
Jenyns, Léon.
Jonston, J.

K. u. Bl. = Keyserling, A., Graf von, und Blasius, H.
Kaleniczenko, J.
Kalm, Pet.
Kaup, J. J.
Keulemanns, J. G.
Kjärbölling, N.
Klein, J. Ch.
Koch, K. L.
Kramer.
Krüper, Theob.
Kuhl, H.

Lacépede, B. Graf de
Lafresnaye, F. de.
Lamarmora, Alb.
Landbeck, Chr. L.
Langsdorff, G. H. von
Lapeyrouse, Picot de.
Lapommeraye, Barthélemy de.
Lark.
Latham, J. A.
Latreille, P. A.
Lawrence, G. N.
Layard, Edg. L.
Leach, W. E.
Lefebvre, Th.
Leisler.
Lembke, G.
Lepechin, Iwan.
Lesson, R. Pr.
Levaillant, Franc.
Lichtenstein, Heinr.
Liljeborg, W.
Lindermeyer, Ant.
Linné, C. von.
Löbenstein, B. von.
M. u. W. = Meyer, B. und Wolf, Joh.

Mühle, Graf v. d.
Maccland, J.
Macgillioray, W.
Macleay, A.
Malherbe, Alfr.
Malmgren, And. J.
Marcgraf, Georg.
Marmora, Alb. la.
Martens, G. v.
Max, Pr. = Prinz Maximilian von Wied.
Meisner, Fr.
Ménétriès, E.
Merrem, Blas.
Messerchmidt.
Meyer, B.
Michahelles
Middendorff, A. von.
Möhring, P. H. J.
Montagu, A.
Moqin-Tandon, Alfr.
Motschoulski, V.
Müller, Baron v.
Müller, Sal.
Mummery, H.
Murs, O. des.

Natterer, J.
Naumann, J. Andr.
Newton, Alfr.
Nilsson, S.
Nitzsch, C. L.
Nordmann, A. von.
Nozemann, Corn.
Nuttall, Thom.

Olafsen,
Orbingy, Alcide d'
Ord, G.
Otto, B. Chr.

Pässler, W.
Pallas, P. S.
Parzudaki, Emil.
Payraudeau.
Peale, T. R.
Pelzeln A. von.
Pennant, Th.
Perrault, Cl.

Poeppig, Ed.
Prevost, Flor.
Pucheran.

Rafinesque, C. S.
Rafles, Thom.
Ranzani, Cam.
Ray, J.
Rchb. = Reichenbach, H. G. L.
Reinhardt, J.
Rennie, J.
Retzius, A.
Richardson, John.
Risso, A.
Roux, P.
Rüppell, Ed.

Sabine, J.
Salvadori, Th.
Sander, H.
Saunders, H.
Savi, Paolo.
Savigny, M. J. Lelorgne de
Say.
Schembri, Ant.
Schilling, W.
Schimper, W.
Schinz, H. R.
Schlegel, H.
Schleep.
Schomburgk, R. H.
Schrank, Fr. von Paula.
Schwenkfeld,
Sclater, Ph. L.
Scopoli, J. A.
Scoresby, W.
Seiffert = Seyffertitz von.
Seba.
Selby, Fr.
Sely, de Longchamps.
Sepp, Chr.
Severtzow, Nic.
Shaw, G. S.
Sibbald, Rob.
Siebold, Ph. Fr. von.
Sibthrop, John.
Siemssen, A. Chr.
Smith, A.
Solander, Dan.
Sonnini, de Manoncourt.
Sparrman, Andr.
Spix, J. B. von
Stanley, Edw.
Steinmüller, J. R.
Steller, F. W.
Stephenson,
Strickland, H. E.
Suckow, C. A.
Sundahl.
Sundevall, C. J.
Susemihl, J. C. u. Ed.
Swainson, W.
Swinhoe, R.
Sykes, W. H.
Taczanowsky, L.
Temminck, C. J.
Tengmalm.
Thienemann, Fr. A.
Tickell, T. R.
Titius, D. J.
Tristram, H. B.
Tschusi, Vict. von.
Tyzenski.

Vaillant, Franc, Le.
Valenciennes.
Verany, J. B.
Verreaux, Ed. u. Jul.
Viéillot, L. P.
Vigors, N. A,
Vierthaler, R.
Voigt, Fr. S.

Wagler, Jos.
Wallace, Alfr.
Wallengren, H. D. J.
Webb, Barker, P.
Werner.
Willugby, Franc.
Wilson, Alex.
Wirsing.
Wright, M. von.
Würt. Pr. = Prinz Paul von Würtemberg.

Yarrell, W.

Zander, H. D. F.
Zetterstedt, J. W.

Gebauer-Schwetschke'sche Buchdruckerei in Halle.

Oswald Weigel, Antiquariat und Auktions-Institut, **Leipzig**
Königstrasse 1.

35

Drucksache.

Chas. W. Richmond, Esq.,

Smithsonian Institution.

Washington D. C.

U. S. A.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00293497 4
nhbird QL690.A1R45
Synonomik der europ?aischen Brutv?ogel u